

潮州志

志

物產志

藥物

礦物

印 翻 准 不 有 所 權 版

館 志 修 州 潮 者 行 發

號 七 路 生 民 頭 汕

局 務 印 文 藝 者 刷 印

號 五 五 路 平 至 頭 汕

潮州志

物產志三

特約編纂楊金書譔

翟肇莊譔

藥用植物

總纂饒宗頤鑑定

潮州民間藥用植物種類紛繁久爲鄉民及俚醫所採用以之治病療傷其效甚著此皆先民於長久歲月身驗積累所得未容忽視者也舊志物產門雖曾列舉藥物

海陽志曰藥品揭陽志曰竹藥

但摭拾舊文語焉不詳而流俗所傳多重實用命名常不一致茲所

紀錄皆親之野外採集就實物觀察考其科屬及名稱述其形態與生態歷時二載得二百五十種而表列之其漢名未詳者姑依日語譯出或代以俗名或權由譯者擬定皆註於附記欄中以待考至於治病效能則就調查所得述其概略著錄先後以俗名爲主依筆劃多寡爲次而以名稱索引附焉世之覽者作潮州本草雛型觀焉可也

名

稱

科屬

形態及生態

效用附記

人字草

漢名 雞眼草

學名 *Lespedeza Striata*,

H. ei A.

Mierolespedeza

stipulacea Makino

豆科

胡枝子屬

生於原野路旁之一年生草莖細小分枝甚多高十五至三十公分複葉由三小葉合成小葉長約一公分幅不及一公分橫裂之則沿兩側脈分離裂成人字形故俗稱人字草夏秋間開紅紫色之蝶形花結小莢果

莖葉煎服有清涼解熱之效

人面果

漢名 人面子

學名 *Spondias dulcis*

Forst

漆樹科

Spondias

屬

栽培於山地或庭園中高六七十公尺組織中有樹脂道分泌樹脂遇空氣則變黝色葉互生奇數羽狀複葉小葉長卵形花小花冠與萼同為五數夏秋結核果味甘酸有櫻果之香氣形圓似李具宿存萼其核兩邊如人面內有仁三枚

果實鹽漬後食之能消風健胃葉煮水洗滌有驅風之效

乞食碗

(又名六月雪)

漢名 松葉牡丹

學名 *Portulaca grandiflora*, Hook

馬齒莧科

馬齒莧屬

生於原野荒園畦畔路傍一年生草莖肉質肥厚帶赤色匍匐地上枝部有白色長毛葉傘狀肥厚帶紅色長約二公分枝部亦有白色長毛除嚴冬外四時有花花開於梢頭無花柄花冠紫紅色五瓣直徑一公分日中開放午後則閉合果實細小

全草搗爛貼於患處治各種腫物

土三七

(又名七星劍)

漢名 細葉費菜

學名 *Sedum Aizoon*, L.

景天科

景天屬

盆栽於庭園多年生草本莖圓滑肉質多汁高三十至六十公分淡綠色葉對生肥厚多汁長達九十公分許邊緣有稀疏鈍

葉揉碎擦患部治打撲傷及耳下腺炎

土半夏 (又名獨腳蓮)

漢名 琉球半夏

學名 *Typhonium divaricatum* Decne.

天南星科

Typhonium 屬

缺刻下生者為二出掌狀複葉上生者則漸變為單葉葉片如劍狀故俗又稱七星劍夏日開黃色花聚繖花序花被四數果實小種子有胚乳

地下莖和紅糝或酒搗爛貼於患處治毒蛇咬傷與惡性腫物

本品漢名譯自日語

土木鼈 (又名五爪龍)

漢名 木鼈子

學名 *Momordica cochinchinensis*, Spreng.

葫蘆科

苦瓜屬

生於原野之蔓性植物多年生草本攀緣莖節上有卷鬚用以纏繞他物單葉互生具長葉柄葉片五裂作掌狀長幅約十二公分夏秋開五瓣淡黃色花其基部有蛤狀苞葉花後結紅黃色瓠果外生多數軟刺內生種子三四十枚種子外形似鼈含有毒質

全草搗爛外用治惡瘡有消腫散結之效種子藥力更強

土菠菱

漢名 土荊芥

學名 *Chenopodium am-*

brasioides, L.

藜科

藜屬

生於水邊溼潤之地一年生草本植物高達一公尺有長圓錐形之紅色直根全株淡綠色莖柔軟有紅色縱稜葉互生柔弱不平呈披針狀基生葉全長達三十公分幅六公分邊緣微呈鋸齒狀頂生葉漸小有不快香氣甚烈夏日葉腋間簇生細小之花呈綠色

葉和食鹽揉爛塗擦患處治皮膚生癬及毒蟲咬傷又可作驅蟲劑

大呢草

漢名 大地錦草

學名 *Euphorbia Puli-*

fera, L.

大戟科

大戟屬

生於原野路旁荒地畦畔等處一年生草高達三十至四十公分直立或傾臥全體被剛毛帶紅色葉橢圓形長三公分幅約二公分四時有花從葉腋抽出短花軸成頭狀聚繖花序花小結小蒴果熟則紅色

全草煮服治痢疾及婦人乳房發生腫物又切碎晒乾後入釜炒之稱瘡茶煎服治瘡疾

大號鼠麴棉

漢名 野地黃菊

學名 *Erigeron linifolius*

Willd.

菊科

東菊屬

(又作地黃菊屬)

生於原野路傍之一年生草莖高達二公尺表面被粗毛葉披針形有不整齊粗鋸齒秋冬開花頭狀花序呈卵形長不及一公分全部悉為黃白色筒狀花冠總苞片細長三列末端紅色長短不一有冠毛結圓柱狀瘦果

莖葉搗碎貼局部治蛇咬傷或皮膚生毒瘡

山葡萄 (又名烏葡萄)

漢名 葇藍屬

Vitis Thunbergii,
S. et Z.

葡萄科

葡萄屬

生於山野蔓性多年生草莖赤褐色被綿狀毛節上卷鬚與葉對生常攀緣於灌木叢數上葉掌狀腹面綠色背面白色有毛有深缺刻葉片長七公分許幅約七公分有長柄夏日莖梢抽花穗複總狀花序花小黃綠色花冠五數頂端稍合常不開而脫落結漿果

莖葉和綠豆前服有清涼退熱去風火之效

山枇杷

漢名 天仙果

學名 *Ficus L.*

桑科

無花果屬

生於山野高三公尺呈灌木狀莖葉及果實有褐色剛毛單葉互生長十八公分至二十公分幅達九公分密生褐色剛毛花細小隱生於橢圓形花托中結橢圓形隱花果長約三公分

莖葉煎服治瘡疾及打撲傷

山苦瓜

漢名 雀瓜

學名 *Zehneria umbellata Thwait*

蘆薈科

Zehneria

屬

生於山野多年生蔓性草本全體粗糙卷鬚單條攀緣他物葉厚紙質互生呈三角形長六至七公分幅五至六公分中央裂片較他兩邊長大花單性大小蕊花同株夏天開淡黃色小花萼與花冠皆五裂花後結橢圓形漿果長四至五公分熟時色朱紅

莖葉煎服有解熱利尿之效果實可以生食又搾汁塗於皮膚有潤澤之效

三脚虎

漢名 臥地蒔繪秋

豆科

山莢豆屬

生於原野之多年生草莖帶紅色匍匐地面節上着地生根小葉心臟形有細托開紫紅色小蝶形花節莢扁平長一公分許

全草煎服有清涼退熱利尿之效又和

本品漢名譯自日語

學名 *Desmodium triflorum* DC.

酒炒後取出
搗爛封貼於
患處治打撲
傷

上樹蜈蚣

漢名 石韋
學名 *Polypodium lingua*, SW.

水龍骨科
水龍骨屬

附生於山野之岩石及樹幹上多年生草本根莖細長而匍匐上生暗褐色線狀之鱗片葉綠葉帶革質平滑多肉裸葉有帶形卵形或披針形大小長短不等通常長九至十四公分幅一至二公分實葉呈長披針形長十五至二十公分分子囊羣着生於裏面中部以上

葉揉汁塗於
火傷部有退
炎奇效煎服
治神經痛又
能退熱

上樹鼈

漢名 螺髈草
學名 *Drymoglossum subcordatum*, Fec.

水龍骨科
螺髈屬

附生於山野之岩石或樹幹上為蔓性之多年生草本莖呈根狀長一公尺餘被暗褐色之鱗片狀毛處處發生細根匍匐於樹石上葉有裸葉實葉兩種葉質皆多肉多汁而表面平滑裸葉卵圓形或圓形長不及二公分實葉狹長其數較少裏面着生子囊羣

葉揉汁塗抹
火燙患部有
退炎奇效和
烏糖茶油共
搗爛貼於局
部治無名腫
毒內服治腎
虛及黃疸

六角英

漢名 爵床

爵床科
爵床屬

生於原野路旁之一年生草高尺許全體有細毛莖傾臥性瘦長綠色有六稜橫切

全草與葉下
紅小消山虎

學名 *Justicia Procumbens*, L.

面成六角形故名

對生長三四公分幅一公分許夜日自葉腋抽出三四公分之穗狀花序開紫紅色之小唇形花上唇二裂下唇三裂小蕊二大蕊一結蒴果

共搗碎加酒外用以治各種腫物單味煎服有清涼退熱之效

六 菱 (又名芒莧)

漢名 葛

學名 *Pueraria thunbergiana*, Benth.

豆科

葛屬

栽培於園圃之多年生草全體被褐色茸毛莖蔓延地上或纏繞他物貯藏根呈紡錘形圓形或扁圓形大者直徑達四十分富含澱粉莖長九至十二公尺纏繞他物上葉大由三小葉組成厚紙質裏面帶白色葉脈裏面明顯小葉全邊作波形全長八至二十四公分幅六至二十一公分秋日葉腋抽出花軸長約二十五公分總狀花序花冠蝶形呈紫紅色兩體雄蕊結扁莢果長約九公分幅一公分餘

根供食用生食有清涼利尿退熱之效熟食作為菜蔬

五 鳳花 (又名綉球花或吐絲紅)

漢名 風鈴扶桑

學名 *Hibiscus schizopetalus*, L.

錦葵科

木槿屬

栽培於庭園之觀賞灌木高三公尺餘葉互生卵形而尖有銳頭之粗鋸齒四時開花紅色花柄細長萼合生有細長之花瓣五片小蕊多數花絲與大蕊合生成柔軟線狀較花瓣長柱頭五裂子房五室全花倒懸花片反卷

葉搗碎外用貼於各種腫物上能拔毒生肌

月 背 草 (又名苦草或埔荊芥)

唇形科

生於野外路旁溝壩之一年生草高達六

全草搗碎和

漢名 薺草

學名 *Mosla grosseserrata*

ta, Maxim.

薺草屬

十公分莖方形葉片略作稜形長三公分幅二公分單葉對生有柄有香氣略似紫蘇夏秋從葉腋分出小枝梢上開淡紅色小唇形花綴成穗狀

米汁冬天加酒夏天不加酒貼於患處治各種腫物揉碎擦局部治酸軟和打撲傷煎服治毒蛇咬傷

木仔 (舊志均稱拔仔)

漢名 番石榴

學名 *Psidium guajava*

Radd.

桃金娘科

番石榴屬

栽培於園圃或自生於山野溝壑之常綠灌木或小喬木莖葉有香氣幹淡褐平滑葉長九至十五公分幅四至六公分腹面平滑背面密布銀白色柔毛葉脈甚顯初夏開五瓣白色花多雄蕊一花柱果實為漿果球形或倒卵形

果實味美可食有健脾之效小兒食傷將果實燒炭研末和飯湯飲服根煎服有抑制性慾之效又葉和白糖煎服治暑熱

木棉

漢名 木棉

學名 *Ceiba pentandra*

Gaertn.

木棉科

木棉屬

生於山野之落葉喬木幼植物之幹下部密布圓錐狀突起掌狀複葉由五小葉構成葉柄長十二至十五公分小葉革質平滑長十二至十五公分花橙紅色五瓣徑九至十二公分萼杯狀二裂或三裂多體

金花煎服治赤痢根煎服作強壯劑

水柘榴

漢名 丁香參

學名 *Ludwigia prostrata*

Rob.

柳葉菜科

柳葉菜屬

雄蕊花柱一全花肉質組織黏滑蒴果長約十二公分種皮有絲光綿毛

生於原野水邊溼地之多年生草高六十至九十公分全體平滑秋後則帶紅色葉互生披針形長約六至九公分夏秋開黃色花具四花瓣呈倒卵形萼筒狀先端四裂蒴果方柱狀呈紅綠色長約三公分先端留宿存萼種子微細而多數

全草煮水洗療治皮膚病莖葉和鹽搗爛貼於患處治牙痛及手上腫物

水芋 (又名鴨仔芋)

漢名 雨久花

學名 *Monocharia Vaginalis*

Presl var

Korakoun Solms.

雨久花科

雨久花屬

生於池沼水田之一年生草高約三十公分全體滑澤呈淡綠色葉通常長卵形有尖頭具長葉柄組織疏鬆略膨大內充空氣便於浮水夏秋開碧紫色小花花蓋六片皆同色頗豔麗小蕊六枚其一特大而呈紫色花柱一枚成短總狀花序結橢圓形蒴果

莖葉加油鹽煮食可以救荒全草煎服有消暑氣之效

水荖

漢名 三白草

學名 *Saururus Loureiri*

Decne.

胡椒科

三白草屬

生於原野之水邊多年生草本高六十至一百公分有地下莖葉橢圓形長十至十五公分幅三至七公分有顯明葉脈五行基腳心臟形葉柄基部抱莖而生夏季莖梢有二三葉其下部變為白色作招引昆蟲之目標并由葉腋抽出總狀花序開淡

地下莖種水荖根煎服有利尿消腫治脚氣之效

水槿花

漢名 水槿

學名 *Hibiscus syriacus*

L.

錦葵科

木槿屬

黃色無花被之小花具一小苞六小蕊四
花柱結小球形蒴果

栽培於庭園或作藩籬半落葉灌木高三
公尺許單葉互生多具三淺裂片或三深
裂片邊緣有不整齊粗齒牙長三至八公
分幅二至六公分有長柄夏秋開重瓣白
色花徑四至五公分花冠五數有線狀副
萼五至六片正萼杯狀五裂小蕊多數柱
頭五裂結蒴果

花煎服作解
熱劑日常可
代茶用根皮
煮水洗目有
明亮之效葉
煮水洗髮能
增加黑色

水鏡草

漢名 金銀蓮花

學名 *Nymphoides indi-*

cum O. Kuntze.

(*Limnan themum*

indicum Griseb.)

龍胆科

苔菜屬

生於池塘多年生草本根生水底莖細長
輕鬆呈蔓狀沈浸水中葉圓心臟形長十
五六公分幅十二三公分浮於水面表面
光滑綠色背面粗糙如砂紙呈暗紫色現
綠色之葉脈有與莖相似之短葉柄夏秋
簇生數花於節上花冠五裂白色筒狀部
呈黃色瓣面生毛狀突起小蕊五大蕊一
柱頭二裂結卵圓形蒴果

全草搗爛封
貼患處治各
種化膿性之
皮膚病

水蘆

漢名 蘆

學名 *Phragmites com-*

munis, Trin.

禾本科

蘆屬

生於沼澤水邊之多年生草本植物莖高
約二公尺與竹略似葉細長有尖端花穗
圓錐形呈鼠色花後結實藉白毛以助散
布

地下莖俗稱
水蘆根煎服
有滑痰清涼
解熱之效

天文草

漢名 擬千日菊
學名 *Spilanthes Acmella*
Murr.

菊科

千日菊屬

生於原野一年生草本高達七十公分莖生細毛葉卵形對生頭狀花序作圓錐形或球形冬季開黃色管狀花冠先端四裂或五裂其未開放時作紅色至開放時則呈黃色結扁球形瘦果不具冠毛

莖葉煎服有

消除腫毒防

治瘡疾之效

全草搗碎貼

於局部治毒

蛇咬傷又花

序浸酒含漱

可治齒痛

本品漢名
譯自日語

天生薯 (又名頭痛子)

漢名 黃獨
學名 *Dioscorea Sativa*,
L.

薯蕷科

薯蕷屬

生於山野或雜草叢中多年生之纏繞植物有長葉柄葉闊大呈心臟形普通長幅約十五公分大者二十五公分有深心之葉腳夏秋葉腋綴小花穗狀花序雌雄異株花色淡黃其生於葉腋之珠芽稱零餘子圓而多疣直徑約三公分有球狀之地下莖此植物全形似薯蕷惟莖為左旋

將零餘子切片貼於頭部之顳額窩上有止痛之效

天葵

漢名 洋紫蘇
學名 *Labiatae Clumei*,
Benth.

唇形科

紫蘇屬

栽培於庭園之多年生草高約六十五公分莖方形帶細毛葉對生呈廣卵形葉中有紅紫色斑紋夏日開淡紫色唇形花下唇成舟狀上唇反卷三裂小蕊四枚大蕊一枚結微細之卵形瘦果

莖葉煎服治咳嗽搗爛貼於患處治足部瘡毒

午時蘭

鴨跖草科

栽培於庭園或自生於山野宿根性草本

全草煎服有

漢名 紫鴨跖草

學名 *Tradescantia Virginica*, L.

紫鴨跖草屬

全草呈紫色高達三十公分葉披針形長九至十五公分幅約二公分夏秋抽花莖高三十至五十公分梢上漸開多數之紫色花冠三瓣小蕊六花絲有多數茸毛

清肺止咳之效

井底芼

漢名 井口邊草

學名 *Pteris Serrulata* L. F.

水龍骨科

蕨屬

生於溝壑井壁石砌等陰溼地多年生草根莖短細而斜臥被赤褐色細毛簇生複葉複葉具長柄全長達四十公分有裸葉與實葉之別裸葉各部短而邊緣有微鋸齒實葉之頂生小葉特別伸長子囊羣沿葉背邊緣作綫形着生其包被即爲葉緣之反折者

全草煮水飲服治痢疾又有清涼退熱之效

毛將軍

漢名 山煙草

學名 *Solanum Verbascifolium*, L.

茄科

茄屬

生於山野類垣等處多年生草本呈灌木狀高達二公尺全體多毛單葉互生長達十八至二十一公分幅達九公分花色白五瓣小蕊五大蕊一萼合片五裂果實球形直徑約三公分

葉煮水洗身或和薑酒揉碎擦患處能驅風消腫

本品漢名譯自日語

瓜只玉

漢名 圓葉佛甲草

學名 *Sedum Makinoi*, Maxim.

景天科

景天屬

生於溼地路傍荒園多年生草本高十五至二十公分莖傾臥叢生着地生根葉小長二至三公分幅約一公分倒卵形而多肉呈淡綠色互生或對生夏日開小黃色花花被五數小蕊十大蕊五而基部合生心皮與花瓣同數

全草搗爛貼於患處治擦傷或火傷

仙瑚

漢名 青珊瑚

學名 *Euphorbia Tirucalli*, L.

大戟科

大戟屬

本地多栽培為觀賞植物全株高達三四公尺呈灌木狀盆栽者高數十公分枝條深綠色圓滑多肉依叉狀分枝法而生長葉生枝頭上作長橢圓形或長倒卵形有時呈小綫形全緣受傷則創口流出白色乳汁此汁有強烈刺激性不可接觸於眼之粘膜以免引起紅腫從枝條之各節處開花花微細單性無花被結小蒴果

枝條搗爛罨貼患處治跌撲損傷及疥瘡

叮咚苳

漢名 海金沙

學名 *Lygodium Japonicum* SW.

海金沙科

海金沙屬

生於山野叢藪中之多年生纏繞性蕨類植物長一二公尺纏繞於他物上全體滑澤無毛葉為紙質之羽狀複葉孢子囊在葉之裂片背面沿中脈逐個排列而生各被以胞膜其一端具彈性環略似帽狀熟則散出沙狀之黃褐色孢子即藥用之海金沙也

莖葉煎服主治赤痢胞子和糖煎服有解熱利尿之效又莖葉煮酒番患部能消散鬱血

生傷只 (又名草決明)

漢名 羊角豆

學名 *Cassia occidentalis* L.

豆科

決明屬

生於山野或栽培於庭園以供藥用莖直立高一公尺餘葉互生偶數羽狀複葉小葉長數公分作橢圓形有尖頭夏秋葉腋出花梗著生數花花冠黃色五瓣小蕊十枚結扁平莢果長十公分餘

全草煎服治眼病和杭菊桑葉豬肝煎服治肝風兼有明目之效

冬瓜

漢名 冬瓜

學名 *Benincasa cerifera*,

Savi.

葫蘆科

冬瓜屬

栽培於園圃之一年生蔓草全體被細長白毛攀緣莖有卷鬚葉掌狀五裂雌雄同株而異花花冠黃色五裂甚深漿果綠色橢圓形長達六十公分表面有毛

果肉和蜜生食或煮水飲服能消暑滑便清涼利尿治痢疾種子晒乾去皮內服有消食之效

田鴨舌

漢名 黃瓜菜

學名 *Lactuca*

Thunbergiana,

Maxim.

菊科

萵苣屬

亦作黃瓜

菜屬

生於山野田園等地之雜草高達三十公分至四十公分葉形細長邊緣有不規則之缺刻具長葉柄與葉片無明瞭界限基葉無柄葉基抱莖而生春夏開花頭狀花序由數個之黃色舌狀花冠構成徑約一公分果實有白色冠毛全草汁液有苦味本植物與剪刀股(俗稱鴨舌草)相似惟花序較多花冠較小而葉片狹長

全草煎服有清血毒之效和紅糖煮水作清涼飲

田橫榔

漢名 台灣公草母草

學名 *Lindernia pedunculata* Wettst.

玄參科

公草母草

屬(亦稱

瓜草屬)

生於原野路旁畦畔等處一年生草本高達二十五公分有多數分枝葉對生長二至三公分邊緣有鋸齒幾無葉柄周年開花白色或淡紫色為筒狀之唇形花冠結線狀瘦果有較長宿萼

全草和食鹽搗爛填入蛙牙孔隙有止痛之效煎服能利尿封貼於局部治毒蛇咬傷

本品漢名譯自日語

白虎跋

漢名 虎杖

學名 *Polygonum cuspidatum*, S. et Z.

蓼科
蓼屬

生於原野路旁較濕之地多年生蔓性草本莖高自三十至一八〇公分斜生或傾臥地上呈紫紅色汁液有酸味葉卵形而尖基部成截形長達九公分幅六公分邊緣呈微細波狀夏秋自葉腋抽穗狀花序開五數之白色小花果實具宿存萼

莖葉搗碎貼於患部治小瘡根煎服有通經之效

白花無忌草

漢名 鱧腸

學名 *Eclipta alba*, Hassk.

菊科
鱧腸屬

生於原野路旁水邊之一年生草高達四十公分葉腋對生分出小枝葉質稍厚呈披針形長約五公分邊緣有鋸齒表面生毛茸夏秋開小頭狀花小白色花後結黑色小瘦果

莖葉煮服治胃病及喘症又有涼血消炎止血解熱毒之效

白花蛇舌草

漢名 二葉葎

學名 *Oldenlandia diffusa*, Roxb.

茜草科
二葉葎屬

生於原野路旁畦畔等地一年生草本莖帶褐色長十至三十公分橫臥地上向四方展開葉對生莖長達二公分夏秋開白色四裂之鐘狀小花有花梗結小球形蒴果具四枚針狀宿萼

莖葉榨汁飲服治盲腸炎有特效又可治一切腸病

白花馬了餃

漢名 白馬鞭

學名 *Polygonum barbatum*, L.

蓼科
蓼屬

生於原野稍溼之地多年生草高九十公分左右莖大節長全體披細毛葉披針形長十二至十五公分托葉密生黃褐色長毛夏日抽花穗花白色

全草搗碎外用治腫物及指趾末端之惡性化膿