

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百八十二



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷一百八十一

周王朱橚撰

癰疽門
總論

岐伯問於岐伯曰癰疽何以別之岐伯答曰榮衛
留於絡之中則血凝而不流氣壅遏而不通故生
癰疽成則肉腐為膿然不能陷於肌膚骨髓不為焦

林五服不為佳按故命曰癰竟帝曰何為疽岐伯答曰

欽定四庫全書

普濟方

一

熱毒熾盛下陷肌膚骨髓皆焦枯內連五臟血氣痼竭
當其病下筋骨良肉無餘故命曰疽疽者其上支已夭
堅如牛領癰者其上皮薄已澤此其候也黃帝曰善然
五臟不調則致癰久患消渴之流亦多發癰疽之疾岐
伯曰喜怒不測飲食不節陰氣不足陽氣有餘榮衛不
行血氣不通而熱相搏乃發為癰疽凡服乳石之人常
須小勞怡悅神思夫乳石之氣隨開而行遇閉而止止
則血脉凝澁瘡疣生焉或不遂志欲加之以怫鬱憂憤

蓄積貪恣驕狠飢飽勞逸負恃之變遂致血氣夭結固而為病論云夫陰陽蘊結臟腑為之積聚血氣凝澁榮衛為之壅滯陽滯於陰則生癰陰滯於陽則生疽癰疽之生有內有外內則生胃腹腑臟之中外則生膚肉筋骨之表凡此二毒發無定處而有常名夫壅滯之本者始於血老不作汗肉陳不脫垢蒸氣不能外達留積遂成內熱所為也夫癰疽生膿水之成非天降非地出蓋積微所成也凡癰疽癰腫纔萌之時並須以湯水注射

之欲治此疾先須辨識定其淺深究其根源療之必愈
熱發於皮膚之間是以浮腫根小至過二三寸者為癰
也六腑積熱騰出外肉之間其發暴盛腫皮光軟侵展
廣大為癰也五臟風毒積熱攻熈於肌骨風毒猛暴初
出一頭如瘡癰形白焦枯觸之應心者疽也癰起於六
腑浮達易理若燎原之火外潰膚肉疽生於五臟沉澁
難治若陶室之燧內消骨髓癰則易治唯難將息而遲
瘡疽則難療易得瘡復癰與癰初生並宜灸之為其氣

本浮達以火導其熱令速暢也疽則宜烙不宜灸為其
氣深須達其源也又已盛是膿慎勿可灸則須針烙方
能瘥也凡瘡癰生於外皆由內熱所致當要服藥以下
之終須外療以求瘥服藥所以助療法也夫治癰疽須
以湯液疏其內針烙疏其外然則癰疽有虛有實虛則
補之實則瀉之有實熱者易治虛寒虛邪熱多者難愈
腫起堅硬膿稠者為實腫下軟慢膿稀者為虛蓋病者
多為方法而無次叙臨時倉皇何能辨於此疾淺深是

以斃也凡癰疽瘰癧不問虛實寒熱皆由氣鬱而成經云氣宿於經絡與血俱澁而不行壅結為癰不言熱之所作而後癰者此乃因喜怒憂思有所鬱而成也此屬內因又有熱被風冷搏之血脉凝滯不行熱氣壅結而成亦有陰虛陽氣湊襲寒化熱熱盛則肉腐為膿此屬外因寒熱風濕所傷而成也又服丹石及炙燂酒麪溫床厚被所致或盡力房室精虛氣竭所致者此屬不內外因所傷而成之也如是但陰陽不平有所壅結皆成

癰疽而此二毒發無定處當脉別之洪浮滑數則為陽
微沉緩澁則為陰陰則熱治陽則冷治○癰疽之疾二
十餘証燥發石發巖發蜂窠發蓮子發椒眼發連珠發
竟體發有腸癰內發腦發背發眉發顙頤發肺癰腎癰
疔癰臍癰臀發腿發外有手發足發穿當發鬚癰爪瓠
發大率隨病淺深分證內外便行施治不可遲緩毋致
孔洪方為妙手凡癰疽始作便有發熱惡寒或有痛處
脉浮而緊是欲為癰疽非傷寒之候也經言五臟不調

致疽六腑不和生癰一曰癰疽急者二三日殺人緩者
十餘日殺人二曰癰疽急者十餘日殺人緩者一月死
三曰緩疽急者一年殺人緩者數年死四曰水疽所發多
在手足數年猶可療疽有數十種若如此千般發癰之
疾所發緩地不殺人所發若在險地宜令即外消一為
腦戶二為舌本三為玄癰四為候節五為胡脉六為五
臟擊八為兩乳九為心鳩尾十為兩手魚十一為腸屈
之間十二為小道之後十三為九孔十四為兩膈腸十

五為神主之舍

一本云主客之舍

凡十五處不可傷而況於癰

乎若癰發此地遇良醫能不及大膿者不救致大膿害

及矣黃帝曰願聞癰疽之形與其期日岐伯曰癰疽之

極十八腫又癰疽發咽名曰猛疽猛疽不療則血化為

膿為膿不瀉塞咽半日死其化膿者瀉已則含豕膏無

冷食三日而已一云無食發於股肱名曰股脫疽其狀

不甚變而癰腫膿搏骨不急療三十日死

髀內曰股股外曰髀膝上

股下骨稱曰股肱也

發於脇名曰改訾訾者女子之疾也久之其

狀大癰膿其中乃有生肉大如赤小豆療之方剉連翹
草及根各一斤以水一斗六升煮令竭取三升即強飲
厚衣坐釜上令汗出至足已發於尻者名曰兌疽其狀
赤堅大急療之不療三十日死發於脛者名曰兔嚙其
狀赤至骨急療之不療害人發於足上下者名曰淫其
狀大如癰不急療百日死又發於眉及臍者名曰疵疽
其狀赤黑急療之此令人汗出至足不害五臟癰發四
五日逆炳之上灸百壯石子當碎出也不出可益壯又

石癰者始發皮際相親著不赤頭不甚堅微痛熱熱漸自歇便堅如石故謂之石癰難消又不可得自熱縱愈皆百餘日也又發癰兩頭牽而傍推無根者又不痛結筋非癰也發癰狀如蛇雖極大此肉瘤非癰也腫一寸至三寸癰也三寸至五寸癰也五寸至一尺癰疽也一尺至三尺名曰竟體疽腫成膿九孔皆出諸氣憤鬱不遂志欲者多發此疾癰及疽血瘤鼠乳石癰結筋癰瘰皆不可就針角針角少不及禍者又發於腋下堅赤者

名曰米疽療之用砭石欲細而長踈啟之塗以豕膏六

日已勿裏其癰堅而不潰者為馬刀挾纓急療之

太素經曰

頸前曰纓

發於股陰者名曰赤弛不急療六日死在兩股之

內不可療一云六十日死發於膝者名曰疵疽其狀大

癰色不變寒熱而堅勿石石之死湏其柔色異乃石之

者生

冷不熨之柔乃破之準例破之也

又諸癰腫之發於節而相應者

不可療

太素經云膿入節開故不可療也

又發於陽者百日死又發於

陰者三十日死

丈夫陽器曰陽婦人陰器曰陰

又發於踝者名曰走緩

疽其狀肉色不變數石其輸數而止其寒熱不死

冷石熨其

所由之

又發於足傍者名曰癰疽其狀不大初從小指發

急療之去其黑不消輒益不療百日死

傍云足外側也

又發胷

者名曰井疽狀如大豆三四日起不早療下入腹入腹

不療十日死

大素經云寒熱不去十日死

又發於足指者名曰脫疽

其狀赤黑死不療不赤黑可療療不衰急斬去之得活

不去者死又發於膺者名曰疔疽其狀如穀實瓜萐常

苦寒熱急療之去其寒熱不療十日死死後出膿又發

於頸者名曰夭疽其狀大而赤黑不急療則熱氣下入

淵腋前傷任脉內薰肝肺十餘日死太素經云項之前曰頸也凡五

臟六腑膜中府隱隱而痛者肺疽也上肉微起者肺癰

也中府在雲門下一寸六分乳肋間動脉疾手陷中是臣闕隱隱而痛者心疽也

心上肉微起者心癰也臣闕一穴在鳩尾下一寸是期門隱隱而痛

者肝疽也上肉微起者肝癰也期門二穴在第二肋傍一寸半直上兩腋旁

章門隱隱而痛者脾疽也上肉微起者脾癰也章門在季肋端

一名長手一名肋宛京門隱隱而痛者腎疽也上肉微起者腎癰

也京門二穴在期下五分是中管隱隱而痛者胃疽也中管一穴在名太倉最上

管下一寸天樞隱隱而痛者大腸疽也上肉微起者腸癰也

天樞二穴在臍兩傍各二寸中是丹田隱隱而痛者三焦疽也上肉微起

者三焦癰也丹田一名石門一名精室一名命門一穴在臍下二寸關元隱隱而

痛者小腸疽也上肉微起者腸癰也關元一名液門在臍下三寸右

驗其所患依據此審定癰疽淺深病從何臟腑發先

曾食乳石又驗其氣虛實參詳而療之。背面九處不

可患瘡第一入髮際為玉枕亦為舌本第二項頸節第