

欽定四庫全書

子部
類經卷二十二



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

類經卷二十一

鍼束類

東晉時脈病

胃脘

明 張介賓 撰

十椎及上紀素問氣穴論○天突

穴諸書不載惟氣府論

在第十椎節下間與

下紀者關元也中脘胃

欽定四庫全書

類經

邪繫陰陽左右如此其病前後痛瀉胃脇痛而不得息

不得卧上氣短氣偏痛脉滿起斜出尻脉絡胃脇支心

貫鬲上肩加天突斜下肩交十椎下

此詳言上文背與心相控而痛者悉

由任督二脉之為病也蓋任在前督在後背為陽腹為陰故為前後痛瀉等病其在下者斜出尻脉在工者絡胃脇支心貫鬲上肩如天突左右斜下肩交十椎下所以當刺天突中樞胃脘關元等穴

○病在少腹有積刺皮髓以下至少腹而止

素問長刺節論○髓

字徧考韻篇皆無全元起本作髓字於義亦未為得新校正云當作皮髓髓字誤也其說近理釋義云髓骨端也此言皮髓以下者蓋謂足厥陰之章門期門二穴皆在橫皮肋骨之端也及下至小腹而止者如足陽明之

天樞歸來足太陰之府舍衝門足少陰之刺俠脊兩傍

四椎間

此足太陽之厥陰俞手心主脉氣所及也按脉要精微論曰心為牡藏小腸為之使故曰少腹

當有形也然則厥陰俞刺兩髀髀季脇肋間導腹中氣能主少腹之疾無疑

熱下已

腰骨曰髀兩髀髀者謂腰骨兩旁之居髀也季脇肋間京門也皆足少陽經穴導引也

中熱氣下入少腹則病已○病在少腹腹痛不得大小矣○髀音格又丘亞切

便病名曰疝得之寒刺少腹兩股間刺腰髀骨間刺而

多之盡炁病已

小腹間痛而二便不行者為疝病乃寒氣之所致當刺少腹者去肝腎之寒也

刺兩股間者去陽明太陰之邪也刺腰髀間者凡腰中在後在側之成片大骨皆曰髀骨在後者足太陽之所

行在側者足少陽之所行凡此諸經皆非寒疝但察邪之所在者多取其穴而刺之俟其少腹盡熱則病已矣

○髀苦瓦切吳居永切熱也

○氣滿胃中喘息取足太陰大指之端去爪甲如薤葉

靈樞熱病篇○足大指之端隱白穴也○薤音械似韭而無實寒則留之熱則疾之氣

下乃止內寒者氣至遲故宜久留其鍼內熱者氣至速故宜疾去其鍼總候其氣下不喘乃可止鍼也

○心疝暴痛取足太陰厥陰盡刺去其血絡心疝者如脈要精微

論曰診得心脈而急病名心疝少腹當有形也取足太陰厥陰盡刺去其血絡者以二經皆聚於少腹去其絡

血即邪所以散其邪也

○中熱而喘取足少陰膈中血絡靈樞雜病篇○中熱而喘熱在中工二焦

也取足少陰者壯水以制火也○小腹滿大上絡即足太陽委中穴取之可以寫火

走胃至心淅淅身時寒熱小便不利取足厥陰淅淅寒肅貌肝

經之脉抵小腹挾胃其支者從肝別貫膈故○腹滿大為病如此當取足厥陰經以刺之○淅音昔

便不利腹大亦上走胃噎喘息喝喝然取足少陰腎開竅於

二陰其經脉從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨故其為病如此當取足少陰經以刺之喝喝喘急貌○噎音益

○腹滿食不化腹嚮嚮然不能大便取足太陰脾失其職則食

不能化腹滿而鳴氣滯於中大○氣逆上刺膺中陷者便不調當取足太陰經以刺之

與下胃動脈

膈中陷者足陽明之屋翳也下胃動脈手太陰之中府也蓋在中曰胃胃之旁即謂

之下

耳 ○腹痛刺臍左右動脈已刺按之立已不已刺氣

街已刺按之立已

臍之左右動脈如足少陰之育俞足陽明之天樞皆主腹痛氣街即足陽

明之氣街也

○腸中不便取三里盛寫之虛補之

靈樞四時氣篇○小腸不便者不能

化物大腸不便者不能傳道大腸小腸皆屬於胃故當取足陽明之三里穴邪氣盛則寫之正氣虛則補之

○腹中常鳴氣上衝胃喘不能久立邪在大腸刺育之

原巨虛上廉三里

九鍼十二原篇曰育之原出於腓即任脈之下氣海也巨虛上廉三里

皆足陽明經穴按本輪篇曰大腸屬上廉此以邪在大腸故當刺巨虛上廉若下文之邪在小腸者則當取巨

虛下廉也○小腹控臑引腰脊上衝心邪在小腸者連臑系

屬於脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃燠肝散

於育結於臍控引也臑陰九也小腸連於小腹若其邪盛則厥逆自下上衝心肺燠於肝胃引於

腰脊下及育臍臑系之間也育義詳疾病類六十七○臑音高故取之育原以散之刺

太陰以予之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其

所過之經以調之取育原以散之散臍腹之結也刺以太陰以予之補肺經之虛也取厥陰以

下之寫肝經之實也取巨虛下廉以去之求小腸之○
所屬也按其所以過之經謂察其邪之所在以調之也○

善嘔嘔有苦長太息心中憺憺恐人將捕之邪在膽逆

在胃膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦故曰嘔膽

憺憺心虛貌邪

在膽逆在胃木乘土也膽液泄則苦胃氣逆則嘔故嘔苦者謂之嘔膽

取三里以下胃氣

逆則刺少陽血絡以閉膽逆却調其虛實以去其邪

三里

足陽明經穴故可下胃氣之逆又刺足少陽血絡以平其木則膽液不泄故曰以閉膽逆然必調其虛實或補或寫皆可以去其邪也 ○飲食不下膈塞不通邪在胃腕在上腕

則刺抑而下之在下腕則散而去之

上腕下腕俱任脉穴即胃腕也刺抑

而下之謂刺上腕以散其停積之寒滯也鍼藥皆然

○小腹

痛腫不得小便邪在三焦約取之太陽大絡視其絡脉

與厥陰小絡結而血者腫上及胃脘取三里約邪在三焦

下輸出於委陽並足太陽之正入絡膀胱約下焦也太陽大絡飛陽穴也又必視其別絡及厥陰小絡結而血

者盡取去之以足厥陰之經亦抵小腹也若小○飧泄

補三陰之上補陰陵泉皆久留之熱行乃止謂三陰之上

穴脾肝腎之會也陰陵泉足太陰脾經穴補而久留之則陽氣至而熱行熱行則泄止矣

○脹取三陽飧泄取三陰靈樞九鍼十二原篇○脹腹

者當取足之三陽即胃膽膀胱三經也○飧泄者當取足之三陰即脾肝腎三經也○飧音孫

○腹暴滿按之不下取太陽經絡者胃之募也

素問通評虛實

論○太陽經絡謂手太陽經之絡即任脉之中脘胃之募也中脘為手太陽少陽足陽明脉所生故云太陽經

絡者○少陰俞去脊椎三寸傍五用員利鍼

少陰俞即募音募

為胃關故亦當取之係足太陽經穴去脊兩旁各一寸五分共為三寸兩傍各五痛也刺當用第六之員利鍼

○霍亂刺俞傍五

邪在中焦則既吐且瀉藏氣反覆神志繚亂故曰霍亂俞傍即上文少陰

俞之傍志室穴也亦各刺五痛

足陽明及上傍三

足陽明言胃俞也再及其上之傍乃脾俞

之外則意舍也當各刺三痛

上膈下膈蟲癰之刺靈樞工

附膈篇全○四

證治按

黃帝曰氣為上膈者食飲入而還出余已知之矣蟲為

下膈下膈者食晬時乃出余未得其意願卒聞之

此言膈證

有上下之分而復有因氣因蟲之異也因於氣則病在上故食飲一入即時還出因於蟲則病在下故食入晬時而復出晬時周時也○愚按上膈下膈即膈食證也此在本經自有正條奈何後世俱以脉之關格認為膈證既不知有上下之辨亦不知有岐伯曰喜怒不適食

蟲氣之分其謬甚矣○晬音醉

飲不節寒溫不時則寒汁流於腸中流於腸中則蟲寒

蟲寒則積聚守於下管則腸胃充郭衛氣不營邪氣居

之

凡傷胃氣則陽虛而寒汁流於腸中蟲寒不行則聚於下管而腸胃充滿也衛氣脾氣也脾氣不能營運

故邪得聚而居之人食則蟲上食蟲上食則下管虛下
○管腕同郭廓同

管虛則邪氣勝之積聚以留留則癰成癰成則下管約

蟲寒聞食則喜而上求之上則邪氣居之而乘虛留聚
以致癰於下腕要約不行故食入晬時復出也癰壅同

如論疾診尺篇曰目其癰在管內者即而痛深其癰在
窠微癰者義亦猶此

外者則癰外而痛浮癰上皮熱管之內外即言下腕也
邪伏於中故熱見於皮

肉之上黃帝曰刺之奈何岐伯曰微按其癰視氣所行察其

氣所必由先淺刺其傍稍內益深還而刺之毋過三行
以刺之也

先淺刺其傍氣所及之處稍納其鍼而漸深之以泄其
流行之邪然後還刺其所病之正穴以拔其積聚之本

但宜至再至三察其沉浮以為深淺已刺必熨令熱入而止不可過也

中日使熱內邪氣益衰大癰乃潰

邪沉者深刺之邪浮者淺刺之刺後必熨

以火而日使之熱則氣溫於伍以參禁以除其內恬憺

無為乃能行氣

三相參為參五相伍為伍九食息起居必參伍宜否守其禁以除內之再傷又

必恬憺無為以養其氣則正氣乃行而邪氣庶乎可散蓋隔證最為難愈故當切戒如此○恬音甜憺音淡

後以鹹苦化穀乃下矣

鹹從火化可以溫胃故皆能下穀也

苦味詳按見運氣類十七少陰司天條下○愚按上文云氣為上膈者食飲入而還出夫氣有虛實實而氣壅則食無所容虛而氣寒則食不得化皆令食入即出也至若蟲為下膈者蟲上食則下脘虛其寒汁流於腸中

而後致癰滯不行則亦因陽氣之虛於下故食入周時復出也然余嘗治一中年之婦患此證者因怒因勞皆能舉發發時必在黃昏既痛且吐先吐清涎乃及午食午食盡乃及蚤食循次而盡方得稍息日日如是百藥不效及相延視則脉弦而大余曰此下膈證也夫弦為中虛大為陰不足蓋其命門氣衰則食至下焦不能傳化故直至日夕陽衰之時則逆而還出耳乃用八味參杞之屬大補陰中之陽隨手而應自後隨觸隨發用輒隨效乃囑其加意慎重調至年餘始愈可見下膈一證有食入周日復出而不止晬時者有不因蟲癰而下焦不通者矣此篇特言蟲癰者蓋亦下膈之一證耳學者當因是而推廣之

刺腰痛

四十

足太陽脉令人腰痛引項脊尻背如重狀

素問刺腰痛篇全○足太陽

陽之脉下項循肩膊內挾脊抵腰中故令人腰刺其郄

中太陽正經出血春無見血

郄中委中也一名血郄太陽正經崑崙也太陽合腎

水水王於冬而衰於春故刺太陽經者春無見血○郄隙同

○少陽令人腰痛如以

鍼刺其皮中循循然不可以俛仰不可以顧

少陽之氣應風木陽

分受之故如以鍼刺其皮中循循然遲滯貌謂其舉動不便也足少陽之脉起於目銳眥上抵頭角下耳後循

頸下胛中循脇裏下行身足之側故身刺少陽成骨之不可以俛仰頭不可以回顧○俛俯同

端出血成骨在膝外廉之骨獨起者夏無見血

膝外側之高骨

獨起者乃胛骨之上端所以成立其身故曰成骨其端則陽關穴也少陽合肝木木王於春而衰於夏故刺少