

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷二十一



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

經方醫案卷

明醫新錄

世真
本屬
胃
胃
胃

明
薛已
訂

陽脾胃而作須看時令

食利小便亦有升提

泄腸胃虛滑不禁者

宜收澁之

主方

陳皮

錢一

甘草

炙五分

白朮

錢二

白茯苓

白芍藥

炒各一錢

五分已上三味

乃泄瀉必用者

若傷食瀉黃或食積加神麴麥芽山查

錢各一

黃連

炒七分

若腹中穿狹再加厚朴枳實以消停滯

愚按前症若飲食已消而泄瀉未止此脾胃之氣傷也宜用五味異功散若泄瀉而腹中重墜此脾胃之

氣下陷也宜用補中益氣湯若服尅滯之劑而腹中
穿狹此脾氣虛痞也宜用六君子湯若脇脹少食善
怒瀉青此脾虛肝所乘也宜六君子加柴胡升麻木
香若少食體倦善噫泄黃此脾虛色陷也宜用六君
子加升麻柴胡大凡諸症若脾脈弦長者肝木乘脾
土也當補脾平肝若脾脈沈弦者寒水侮脾土也
當溫中補腎夫黃連枳實雖消停滯開痞悶若人脾
胃充實暴患實痞宜暫用之若人屢患屢服或脾胃

虛痞者而用之則脾胃反傷而諸症蜂起矣故東垣先生云脾胃實者用黃連枳實瀉之虛者用白朮陳皮補之須分病之虛實人之南北而治之後倣此

若小便赤澁短少加猪苓澤瀉

各一錢

以分利之夏月加

茵陳

七分

山梔仁

炒四分

愚按前症若津液偏滲於大腸大便瀉而小便少者宜用此藥分利若陰陽已分而小便短少者此脾肺氣虛而不能生水也宜用補中益氣湯加麥門五味陰火

上炎而小便赤少者此肺氣受傷而不能生水也用
六味地黃丸加麥門五味腎經陰虛陽無所生而小
便短少者用滋腎丸腎氣丸腎經陽虛陰無所化而
小便短少者用益氣湯六味丸若誤用滲泄分利復
傷陽氣陰無所生而小便不利或目睛凸出腹脹如
鼓或腿膝腫硬或皮膚斷裂者先用滋腎丸益氣湯
每見元氣虛而復用澤瀉猪苓之類因損真陰以致
前症益甚者急投金匱加減腎氣丸多有復生者若

反復牽牛大黃峻劑而通之是速其危也

若口渴引飲加乾薑

一錢五分

人參麥門冬

各一錢

升麻

四分烏

梅肉

五箇

愚按前症若胃氣傷而內亡津液者用七味白朮散
胃氣弱而津液少者用補中益氣湯氣血俱虛而津
液少者用十全大補湯腎虛津液短少者用六味地
黃丸腎水不足而虛火上炎者用加減八味丸若腎
水不足之人患泄瀉或服分利之濟過多而患口渴

者若不用前藥以固其本源則肺腎復傷多變小便不利肚腹水腫等危症矣○憲副屠九峯先瀉而口渴尺脈數而無力略用解酒毒利小便之劑不應余曰此腎陰虧損虛火熾盛宜急壯水之主不然必發疽而不能收斂也不信別服降火化痰之劑果患疽而歿

若夏秋之間濕熱大行暴注水瀉加黃連蒼朮澤瀉

各一

錢

黃疸小便赤加茵陳

一錢

山梔木通

各五分

愚按東垣云若值秋燥行令濕熱少退體重節痛口
舌乾燥飲食無味二便不調不欲飲食或食不化兼
灑淅惡寒悽慘面惡此肺之脾胃虛而陽氣不伸也
用升陽益胃湯治之前症若濕熱內作脾胃不能通
調而致者宜用此藥分利之濕熱已去脾胃虛弱而
致者宜用六君子當歸調補之濕熱已去脾氣下陷
而致者宜用補中益氣湯升舉之其黃疸若小便不
利四肢沈重渴不欲飲此濕勝於熱用大茵陳湯大

便自利茵陳梔子黃連湯若往來寒熱身黃者宜用
小柴胡加梔子若因勞傷形體飲食失節而身黃者
用小半夏湯蓋黃疸為內傷不足之症宜調補脾胃
元氣為主若妄用驅逐復傷元氣多致不起

若久瀉脾胃虛弱飲食難化加黃芪炙人參各二錢神麴

麥芽各一錢二分木香煨乾薑炙各五分

愚按前症或作嘔或飲食少思屬脾胃虛弱用四君
子加半夏木香或兼作嘔或腹作痛屬脾胃虛寒用

六君子加炮薑木香若麥芽善損腎神麴善化胎消
腎不宜輕用大抵此症多由泛用消食利水之劑損
其真陰元氣不能自主持遂成久泄若非補中益氣
湯四神丸滋其本源後必胸痞腹脹小便淋瀝多致
不起

若久泄腸胃虛滑不禁加肉豆蔻訶子皮赤石脂

各一錢

木香

煨

乾薑

炙各五分

愚按東垣先生云中焦氣弱脾胃受寒冷大便滑瀉

腹中雷鳴或因誤下未傳寒中復遇時寒四肢厥逆
心胃絞痛冷汗不止此腎之脾胃虛也用沈香溫胃
丸治之竊謂前症若脾胃虛寒下陷者用補中益氣
湯加木香肉豆蔻補骨脂若脾氣虛寒不禁者用六
君子湯加炮薑肉桂若命門火衰而脾土虛寒者用
八味丸若脾腎氣血俱虛者用十全大補湯送四神
丸若大便滑利小便閉澀或肢體漸腫喘嗽唾痰為
脾腎氣血俱虛宜用十全大補湯送四神丸若大便

滑利小便閉澀或肢體漸腫喘嗽唾痰為脾腎虧損
宜用金匱加減腎氣丸

若飲酒便泄此酒積熱瀉也加黃連

炒茵陳乾薑各一錢

木香

五分

愚按前症若酒濕未散脾氣未虛宜用此藥分利濕
熱若濕熱已去中氣被傷宜用六君子調補中氣若
誤服剋伐分利之劑胸膈漸滿小便短少或腿足與
腹漸腫者急用加減金匱腎氣丸調補脾胃多有生

者夫酒性大熱乃無形之物無形元氣受傷當用葛
花解醒湯分消其濕往往反服大熱酒癥丸重瀉有
形陰血使陽毒大旺元氣消亡折人長命金匱要畧
云酒疸下之久而為黑疸每見善飲服酒癥丸者多
患疸症不悟其因反服分利化痰以致變症而死者
多矣詳見奇效方○秀水卜封君善飲腹痛便泄服分利
化痰等劑不應其脈滑數皮膚錯甲余謂此酒毒致
腸癰而潰敗也辭不治不信仍服前劑果便膿而歿

○光祿柴黼菴善飲泄瀉腹脹吐痰作嘔口乾余謂脾胃氣虛先用六君子加神麴痰嘔已止再用補中益氣加茯苓半夏瀉脹亦愈○舊僚錢可久素善飲面赤痰盛大便不實余以為腸胃濕痰壅滯用二陳苓連山梔枳實甘葛澤瀉升麻一劑吐痰甚多大便始實此後日以黃連三錢炮湯飲之而安

若寒月溏泄清冷腹痛傷生冷飲食加神麴麥芽炒乾

薑炙各一錢 縮砂 益智 木香 各七分

愚按前症若脾腎虛寒宜用四神丸若脾腎虛脫用六君薑桂如不應急補命門火以生脾土○一儒者小腹急痛溏泄清冷大便欲去不去余謂此命門火衰而脾土虛寒也用八味丸月餘而愈向後飲食失宜前症仍作小腹重墜此脾氣下陷也用補中益氣湯而痊

痢疾

痢是濕熱及食積治者別赤白青黃黑五色以屬五臟