

救偏瑣言卷之三

起脹證治準

痘之根透則爲起。囊綻則爲脹。起居先而脹繼之者也。痘初放點其粒如菽。連及五朝前後表裏得以無邪。痘瘡不至偏陷。縱步而出。根透囊綻。菽而至於如痘。是謂起脹。毒其盡行於肌表矣。以毒達於外。痘故得以起脹也。其象眼封鼻塞。氣尊血附。頂白根紅。白而且肥。紅而能淡。光壯如珠。身體溫和。神清氣爽。飲食二便如常。是起脹之順者也。不須服藥。

起脹時若表邪未盡。至毒不能盡行肌表。向來痰唾稠粘。

或鼻流清涕。或面赤多淚。或面青聲重。或翁翁發熱。或
淅淅惡寒。或毫竅直豎。至此猶未霍然。痘必未能起脹。
仍必疏肌達表。而兼升發。古人言一見紅點。便忌升麻。
乾葛。不可拘也。

起脹時。若有宿食未消。致毒阻塞于內。向來胸膈不寬。按
之。眉愁。口中噤腐酸臭。轉矢氣極臭。至此猶未跳脫。痘
必應至不至。仍以寬中化食。而兼升發。古人言治雜痘。
一寸。痘子落後一丈。不可訓也。

起脹時。表裏無邪。雖無阻礙。氣虛血弱。痘雖起脹。而少光
壯。淡白而不蒼老。眠不甚封。鼻不甚寒。腳雖不塌。頂不

能綻。體靜溫和者。稍稍解毒中。卽當漸補氣血。溫中保脾。如保元湯加芎歸。木香姜蠶。白芷。山查。量用鮮薑一二味。以豫防漿後泄瀉倒陷之患。

起脹時有氣血虛劇。不惟溫而且冷。不但靜而且倦。不惟白而更嫩。不但不老而且皺薄。頂陷而兼腳癰。重語聲輕。眼不能封。鼻不能塞。淹淹不振。而不起脹者。卽當大劑保元湯。加芎歸鹿茸。以峻補氣血。或丁香桂附以振作元陽。參芪太重。必須濟以山查。以此味能行參芪之滯。不減參芪之力。此用藥相濟之法。不可不知。桂附量視緩急。參芪鹿茸遲則殆無及矣。此偏於不及者。大畧

治法也。

起脹時至若毒火猛烈更有伏火伏毒鬱于皮毛痛如膚
刺衣衾難動期雖起脹竟累日壅遏者有毒參陽位面
目癰腫而痘不腫者有毒滯于頂根起而囊不鬆者有
身之內通塞不均衝突處則重頂甚則湧泡遏鬱處或
平或陷甚至連顆囊亦板實者亦有窠粒周圍貼抱一
圈狀如珠殼者有毒擬皮肉痘雖粗大板而平者此等
梟毒在于氣分不拘痘色紅與白紫與黯必用蕩滌之
劑佐以青皮赤芍荆芥牛旁木通蟬蛻用山查兩許
煎湯代水以治之重以棗蟲透發庶氣不爲毒鉤氣得

以暢達而痘起脹矣。古人言氣不可虧，不可法也。

起脹時有諸痘未漿，并有未及放白數點。先已黃熟者，有半爲熱毒燔灼，半爲伏毒錮閉。一則鋪紅肆溢，一則痘若水珠者，有通身或紫黯，或紫艷，或焮紅，或礬紅，或晦色，或間硃砂癰點，或紫背浮萍，或失血空竅者。此等熱毒在于血分，不拘痘之日期，亦必以蕩滌爲主，佐以桃仁、赤芍、紫草、地丁、丹皮、荆芥、木通、猪尾膏、地龍以散其凝結之毒。庶血不爲毒瘀，得以通達而痘自起脹矣。古人言補血之功難，須當養于平素之說，不可泥也。

假令毒火發見于外，熱如火熾，煩渴不已，口熱如爐，不拘

在氣在血均以石膏苓連犀角。或四聖散金汁等類以制其陽光烈火。庶氣血兩不受灸。痘其得以起脹而榮。濯矣。古人言疹愛清涼。痘要溫。不得以此痘律也。

起脹時有根起而囊少脹。起脹而或少克。克而色或少潤。潤而熱有未和。是毒火未得宣暢。概以疏透清解。隔無事于蕩滌。亦不必過以寒涼。尤不宜妄用辛熱。亦不當便用溫補。但以連翹牛旁生地丹皮紅花山查甘草荆芥穗之類。稍以白芷姜蠶桑蟲占米以催漿。搗麝火雖不熾。清之則熱得以和平。色得以滋潤。行漿而漿得以洋溢。毒雖不盛。鮮之則囊得以鬆泛。毒得以化漿。至收

結而不爲餘毒纏擾清解之法常規原以此期痘至五六日大都起脹起脹則毒在外毒既在外而清之解之則毒無寒凝之慮痘方起脹則漿未及行而裏未虛乘未虛而清之解之則痘無內虛倒陷之患而孰知過與不及不可以常理論也歟

攻毒總訣

問痘如何有用攻伏毒伏火豈堪容毒火鬆透稠無害毒火深藏稀亦凶細究神情暨見症察形驗色皎如星上焦衝突如泉湧舌刺唇焦與炙同下迫小腸澀是血大腸逼迫苦難禁拂箭皮毛痛似剝啼號不已虛中宮胸堂壅

過躁如嘔。日夜無眠。擾不寧。痰一因之迷上竅。氣雄煩悶。
叩無聲。靜不靜。分躁不躁。愁容可掬。畏人親。骨節煩疼。癢
似杖。筋抽脉惕。狀如驚。徧體炎炎。駭熱深。更呀四體。有
如水。通身汗湧。令人畏。尤怪身焦。首似蒸。毒湧肌肉。周身
板。掀腫如吹。痘却平。擁突如桃。名疔瘡。痘瘡未見。毒先行。
痘未脹時。面預腫。額額未起。眼先封。赤眼胞下。遶紅絲。
倒豎睜毛。人未知。徧軀晦滯。如蒙垢。口舌無皮。穢氣噴。兩
頰嫩紅。無點粒。發始牙爭。舌不寧。報點歪斜。黑陷硬。一齊
湧出。細如針。紫背浮萍。癰似蚤。犯一稀稠。總不論。貫珠
攢簇。又堪嗟。蟹爪遊蠶。蠶上沙。燕蟾二窩。并鳥跡。壹錢鼠

跡及螺疔。雁行珠殼。蛇皮類。履底環珠。總象形。其在部
位亦多名。覆釜蒙頭。兩截分鎖。項纏腰雙鎖口。託腮攢背。
與攢胸。披肩囊腹。咽關屬。抱鬚蒙眊。及鎖唇。鱗坐囊毬。暨
抱膝。隨地逢之。莫覩輕色。有紫艷。有深紅。紫滯乾紅。又
不同。紫類雖冠花。是艷深。其無異絳桃紅。滯色猶如花木
筆。乾如紙色。有礬紅。若比青蓮滯更惡。椒皮乾色惡。無倫

有頂平平。若烙炮。有頂如煤類。火燒。有頂陷下。根紅腫。
有頂尖圓。色紫焦。痘色頗佳。多惡症。痘稀色白。見確標。飛
漿。透見黃如蠟。發泡。看來似葶桃。有白有紫。有色黑。或粗
或細。毒感鼻。那般痘色。那般形。見症神情。總毒伏。毒伏

于內血受瘀毒伏于內氣受蠱毒輕本受氣血制慘彼氣
血亦歸毒是痘生成必內潰除却蕩滌無生路縱使不能
一一蘇舍此千中無一復前人列于不治條後人糊模傍
矩獲亦有識者謂實病懊歎嬰兒是天命天假千慮之一
得殺身惡毒容稍滅惡毒驅兮氣血暢氣血融通痘自放
氣領血載功自全頂白根紅自光壯即使貫珠堆聚額亦
得鬆擡無敢抗氣煦血化漿自成不藉參芪保元神成痂
落靨無侵蝕胃自開強脾自實此痘不拘兒厚薄不拘未
病先病弱不拘眼大便已瀉不因眼大便閉結不拘成漿
宜保脾不拘痘後須調理尋常之法治尋常不可將來抵

惡酌梟毒不驅是縱虎驅之不盡防竊發若使反以補爲良可歎適以資盜糧有慮兒虛且傍穩坐視匍匐將入井從來有病則病受始終細細宜詳究犯此尤當及早圖更須絕頂方駐足但憑漿後胃日強夜卧日高猶未足落痲體快與身涼咲口歡容無稍楚方是梟毒盡無餘纔得修文偃却武

申明鼻衄

痘瘡鼻衄與雜症鼻衄不同雜症不過迫于肺經浮遊之火清之立鮮縱有爲積熱所致勢亦猖獗者有之要無內潰之慘痘乃先天毒火不衄則已衄則烈毒內亂五臟沸

騰致血妄行空竅點點皆毒血也。非等閒邪火可例。勢必
蕩滌而佐以涼解。庶可治其虐蝕。不則毒血內瘀。毒瘀于
內。其有不潰者乎。內至于潰。其有得生者乎。若僅以犀角
地黃之劑而希止之。是猶揚湯點沸。非鍋底抽薪之法也。
是症甚多。以下附毒之驗。總難筆記。各附其一。以證其概。

附一治驗

余一孫女。四歲。戊子暮春。一晚大熱如炮。躁亂不寧。不
逾時而痢如注。血紫成條。育意亂心慌之象。是夜卽以
涼血攻毒飲。減紅花紫草。加石膏。伍參地丁。連投三劑。
次日午刻見瘡。不紅不紫。如膚色。椒皮。窠囊不起。第二

朝衄止。熱亦減半。呌喊不已。躁亂如初。暫減石膏。用大
桑螵同猪尾膏盞許。和于藥內。日服二大劑。服及七朝。
漸起漸紅。大便日去七八次。九朝漿行。漸入佳境。藥餌
遂鮮。十朝晚身復大熱。呌喊仍不絕口。滿面搔破。猶幸
鮮血淋漓。急用胭脂調入化毒丹貼之。前方重以_五錢。
生地石膏俱兩餘。三劑後。十三朝始定。收結而痂
尚燥。寢食僅得其半。以忍冬鮮毒湯減紅花加大黃生
地。十六朝收功。

申明舌刺咽乾

舌胎如刺。咽乾如炙。傷寒雜症見之。亦陽盛陰虧之象。然

扶陰抑陽。其厄可解。痘瘡若見。總以烈毒肆虐。非僅燔炙而已也。輕則乾焦。重則焦黑。亦必潰而後已。總係咽喉之毒。所以咽啞水噎。並爲逆症。舌刺如煤者。不治。欲解其圍。非蕩滌不可。即使攻之。亦必早圖。乃克有濟。不當日之於泛常也。

附一治驗

徽州程季老。一公郎三歲。丙戌殘冬。一日大熱煩渴。口熱如爐。舌胎卽芒刺而黑。則其咽乾可知。見點于肌肉之間。隱隱若麻。乾紅晦滯。彷彿乎逆。幸在初朝。以清涼攻毒飲。加蜜炙麻黃二分。以隆冬也。減犀角二劑。細碎。

者悉退。顆粒分明。又二劑色亦稍轉。四朝淚流如膽汁。唇漸堆結如煤。謂之鉄嘴。大便晝夜約去十餘次。一方服至六朝起脹。八朝行漿。胃氣未開。神情未快。十二朝鉄嘴鬆褪。寢食漸安。首尾一方收結成痂。以忍冬鮮毒湯至十六朝收功。

申明溺血

痘瘡失血。列于不治。總以烈毒內攻也。况出自小腸乎。故五淋惟血尤重。痘瘡犯此可知。涼血清毒。固是症之首務。而無斬關之劑。以驅逐之。縱極清極涼。僅足以緩其流。難以澄其源也。