

欽定四庫全書

子部
仁端錄卷十三



詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

仁端錄卷十三

齊肅

痘瘡痛澤損破門

諸痛為實諸痒為虛實者邪氣實也虛者正氣虛也痘

瘡先痛後痒者常候也先以藥水化太盛鬱而痛後以

毒後服解火漸微散而痒大活宜活血開鬱若肉如刀

明 徐謙 撰

陳葵 刪定

割膚如錐刺此又脾傷肉敗痛之變也若爬搔破損皮脫肉坑者此又毒壅倒陷痒之變也

初出而痛發未盡也和解之

毒欲外出肌腠急而痛用九味順氣湯合活血散

皮肉厚外寒相搏而痛用桂枝葛根湯

既出稠密而痛者毒盛淤也用犀角消毒飲四物湯加連翹防風牛蒡荆芥丹皮

起脹而痛者氣血充正欲化毒也用涼血芍藥湯

養漿而痛者一曰氣滯用保元湯加木香山查一曰血熱用升麻湯加連翹牛蒡紅花麥冬

痂疤痛以重手按之又不疼者虛也用八味湯加減

胃氣自虛津液內竭血失其榮氣灼為燥所以發痒補其氣血和中托裏此其治也大抵初出形色紅皦起發而皮嫩水多者其後多致痒塌大法當補氣以燥其濕如蚊虱吮血而肉痒是血失其榮之一驗

一種表裏皆虛而痒用白芍紅花白朮肉蓯蟬退蒺藜

一種血虛以致肝木易於生風而痒急以補血藥預防之

七日而大痒抓破者九日死矣所以發痒而精神爽快欲人撫摩痒處而即止者縱抓破而自知其悞者吉若搔之愈痒悶亂不寧搖頭扭頸手足舞亂禁之不止挖肉成坑如湯泡灼如剥鮮魚毒氣倒陷正氣外脫毒壅不解禍不旋踵

初見紅點遍身作痒者此毒氣欲出皮膚閉密火氣遊

移往來故也與傷寒太陽症身痒者同論宜察之使邪
氣得洩也用桂枝葛根湯加麻黃牛蒡或消風化毒湯
根窠不紅用助陽湯加紫草起脹作痒能食便秘者此
邪氣內實正氣外虛也用四聖解毒湯作痒瀉泄者此
正氣內虛邪氣外實也用調元湯托裏湯服後痒止者
吉不止者凶

三四日紅黑焦枯氣血凝滯而作痒者宜疎風解毒
凡痘始終忌痒漿期尤甚此表虛也須忌抓破正面洩

氣他處無大害膿厚者可治無膿者不救多血而淋漓者却又無妨血盛而痒不止者用保元湯加蟬退白芍木香紅花首烏大力子

發散太速肌肉空虛不勝其毒宜大補氣血則痒自止未破用奪痒法已破用敗草散

能食壯實無他症而痒者用四聖化毒湯

能食便堅抓破處復灌成漿無痘處添出贈痘雖盡痒破無妨用十全大補湯與苦參丸間服外塗百花膏合

滅癥救苦散

吐瀉少食氣血虛弱而痒者用十全大補湯加首烏虛甚加鹿角膠或木香異攻散參歸化毒湯內托散去肉桂加白芷當歸木香外敷敗草散天水散

臬痒用益脾散震澤湯外浴痒法避痒法

抓破無膿白乾如豆殼者凶

氣血則為麻為痒為陷血虛則為乾為燥為痛痘色白者必至於灰慘平伏痒塌此皆氣虛而不起脹血虛而

不榮華也補氣血藥中有熱者加清利解毒之品白可轉紅矣若單補氣而不補血則燥痒愈盛矣

紅痘皮色嬌嫩失於早治膿期發痒用消風化毒湯外用茵陳薰法破者用白龍散

泄瀉而痒乃脾虛也用參朮白朮散加殭蠶白芷外用薰法

精神虛弱小便利大便頻至夜痒甚者脾與氣血俱虛也用參苓內托散四君子湯加黃芪肉桂蟬脫白芷肉

菓或木香散

不能啖食而痒用蟬脫膏

頂平皮薄色淡搔痒損壞者乃脾胃弱肌肉虛欲變倒陷也用十全大補湯加荊芥防風外用茵陳薰法如得空處出贈痘破處復灌漿能食便調者可救否則不治一云漿滿而破損者可治未滿而破損者難治若瘡破復灌隨漿隨灌其痂青白綠色堆如雞屎者終必咬牙寒戰十五六朝發喘渴三七日外死矣

黑陷不起在漿期最忌寒涼解毒以傷脾胃用內托散煎下無價散

凡肝經痘初熱時兩手如掐物狀多水泡而作痒宜先平肝用瀉青丸去大黃加甘草青皮柴胡若失於早治後作痒用保元湯加防風白芷

膿期血當化水水則成膿若未成膿則毒未化搔痒不寧此惡候也與傷寒陽明症皮中如虫行者同論乃虛風外搏邪氣內搖痒而不止為泄風是也須視乾濕紅

白瘡狀風藥佐之通用十全大補湯加防風大力子
卧房不密客冒風寒或一肢痒者用荆芥燒烟薰之

痘乾而痒宜養血潤燥用四物湯合消風化毒湯及薰
法

痘濕而痒宜養血去濕用四君子合消風化毒湯奪命
丹及薰法

色淡白而痒用內托四君子湯

色紅紫而痒其症煩渴便秘抓破血流乃氣虛血熱毒

盛也血之味醎熱則腌皮肉而痒也用四物湯加人參
黃芪丹皮連翹蟬退白芷甘草及三味消毒飲加紫草
連翹

血流者用敗草散蕎麥麴炒黃土摻之乾則蜜水調滑
石末以潤之

能食便秘用加味四聖解毒湯外用槐柳浴法

所云抓破有血可治者蓋指未灌漿時言也若成膿後
安得有血故不可以血之有無定吉凶也

八九日氣血虛而痒者用保元湯加川芎當歸蟬退白芷
陽瘡出血用當歸活血湯

將靨時其膿已成其痘將回邪氣解散正氣漸復榮衛
和暢新血作痒順症也與癰疽將愈而痒者同論但勿
令拆破

痂後有如萬蟻所攢亦即一時而已須稍耐之不必治
或用奪法

凡痘當將靨已靨因痒拆破者名壞症如靨疼口渴便

秘赤乃火症也。屬厚者單解火毒，屬薄者大補兼降火。
遍身抓破者，不問前後，皆服蟬化散。外用敗荷葉、茵陳
薰之。

潰爛粘衣席者，用十全大補湯奪命丹，外用敗草散。

抓破於無關轄處，或手足者，猶可救。若於顴臉氣窩正
面，為臟腑精華所聚之處者，凶。

若於鼻面眉目抓破一處者，此肺有熱也。用甘桔湯加
牛蒡，痒即止者吉。

若滿面抓破而面上瘡痕隱然點點有起發之勢此猶可治急用內托散加蟬脫

日子多餘毒未盡而痒者血滯也用四物湯加連翹牛蒡

痂後疤紅而痒必致再發

觸犯穢氣食毒物而變灰黑白色發痒者初標時用通氣飲漿痂時用正氣飲未破者用荊芥薰之已破者用內托散薰辟穢散敷敗草散