

203

外科證治集卷之五

心部三

金壇王肯堂宇泰甫輯

瘦樵程永培校

痘瘡

中

起發證治

萬痘瘡之證熱三日出三日後乃起發此常論也
 然先出者先起後出者後起痘疎毒輕氣稟厚者自見
 出易發易屬痘密毒重氣稟薄者自難出難發難歷
 未可拘定日數時師不知虛實補瀉之理但於起發
 之初便用補藥果內氣不足少食者用之允當若內

幼科證治準繩集之五

心部三

金壇王肯堂宇泰甫輯

瘦樵程永培校

痘瘡

中

起發證治

萬痘瘡之證熱三日出三日後方起發此常論也蓋
先出者先起後出者後起痘疎毒輕氣稟厚者自易
出易發易厲痘密毒重氣稟薄者自難出難發難厲
未可拘定日數時師不知虛實補瀉之理但於起發
之初便用補脾果內氣不足少食者用之允當若內

實便秘能食之人寧不黨邪爲惡乎非徒無益而反害之 痘瘡之出有輕有重觀其形狀卽可知之如一發便出盡者必重也瘡夾疹者半輕半重也出稀者輕裏外微紅者輕外黑裏赤微重也外白裏黑者至重也瘡端裏黑點如鍼孔者勢劇也青乾紫陷昏睡汗出煩躁熱渴腹脹啼喘大小便不通者困也善用藥者能使輕者易安重者不致大困斯可謂之十全矣 凡痘瘡疎則無毒密則有毒痘疎毒少者邪不勝正其氣和其勢順不須服藥痘疎密佈散邪正相持其氣病其勢險此宜抑邪扶正使邪氣亟奪不

爲正氣之賊痘稠密無縫正不勝邪其氣乖其勢逆
善治者什可救其二三不善治者束手待斃而已故
順者不必治逆者不可治險者貴治此以下專言險
逆者之證治也 痘子輕者作三四次出大小不一
等其起發亦先後循次大小分明不相連串顆粒尖
圓根窠紅活光壯肥澤此表無病飲食如常小大便
清潤此裏無病表裏無病大吉之兆不須服藥 凡
痘密者多難起頂但欲皮厚有膿漿色以燈影之苟
非皮薄水泡光潤雖平亦無傷

凡痘子出得稀疎者自然易發易靨不可妄治若瘡

稠密常患其發不能透宜細視之但紅活不甚長大者氣不足也用四君子湯合勻氣散加燒人尿治之如炊腫色帶紅紫者血熱也用四物湯失血合消毒

飲

見形

加燒人尿治之如不潤澤而乾者此血弱也

用活血散加消毒飲與之如不起發不紅活平瘡灰

白者此氣血俱虛也用十全大補湯

汗

加燒人尿

莠子與之如有青乾者內服快癩湯

見形

加燒人尿

合奪命丹

見形

與之外用四聖散

痘疔

合臘脂塗法

或用胡荽酒

俱見形

或用水楊湯浴法務求光壯紅活

而後已如中間有成水泡者防其癢癩宜先補脾胃

疎風瀉火使肌肉實不作癢可也十全大補湯汗加
防風大力子主之

瘡子起發只以出勻爲期不可拘定日數瘡出以漸
其發亦以漸謂之適中若已一齊湧出便皮肉虛腫
一齊歛發者此表氣虛毒氣奔潰而出表虛不能收
歛必生癢癩或成潰爛急宜救表十宣散調無價散
活血散合消毒飲相間服之若出已盡當起不起或
起不透此裏氣虛毒氣留伏壅遏而不出必增煩躁
腹滿喘促或後爲癰毒急宜救裏十全大補湯合勻
氣散或參苓白朮散調無價散服之 痘至四五停

痘瘡

幼科五

三

備荷堂

住不甚起者少後力宜助之用生黃耆叁伍錢人參貳叁錢當歸鹿茸壹貳錢煎服或磨入木香少許兒大者倍之俟漿滿足而止

十宣散 見形

活血散 卽芎歸湯

當歸

川芎 各等分

右爲細末每服壹錢紅花湯調服

消毒飲 見形

十全大補湯 汗

勻氣散 見形

參苓白朮散 湯

無價散 倒麝

參耆四聖散 治痘瘡已出六七日不能長不生膿

或癢塌

當歸

芍藥炒

黃耆

川芎各伍分

白朮

茯苓

紫草如無紅花代之

木通

防風各叁分

糯米貳百粒

右水煎母同服

胎元散 痘不起發不紅潤是血氣俱虛

胎元焙乾為末加麝香少許酒調服叁伍分

獨參湯 治陽氣虛弱痘瘡不起發不紅活或膿清

痘瘡

幼科五

不滿或結痂遲緩或痘痕色白或嫩軟不固或膿水不乾或時作癢或畏風寒

用好人參壹兩生薑伍片大棗伍枚水二鍾煎八分徐徐溫服嬰兒乳母亦服

乾枯灰白紅紫青黯丹如將出成就之際却色淡不正者屬血虛宜用補血藥當歸川芎白芍酒洗之類或加紅花如將成就之際却色紫不正者屬熱宜用涼藥解毒升麻芩連桔梗連翹之類甚者用犀角屑

如用後項諸藥色仍不正者宜兼用二法治之

痘瘡之毒必氣以响之血以濡之而後可得成熟也

故於起發之時光壯者氣有餘也肥澤者血有餘也
氣血有餘表裏俱和不須服藥如形長大而色枯燥
者此氣至而血不榮也宜四物湯失血加人參麥門

冬色紅潤而形平陷者此血至而氣不充也宜四君

子湯

不能食

加黃耆官桂川芎形平陷色枯萎者此氣

血俱不足也宜十全大補湯

汗

合無價散

倒麝

主之

色灰白者氣虛也四君子湯加黃耆當歸官桂色紅
紫者血熱也四物湯加紅花地骨皮牡丹皮

凡痘瘡起發遲滯頂平色灰白者氣虛也其人平日

食少脾胃不足人

參白朮散

渴

去葛根加桂十全大

補湯汗去地黃加木香主之如曾有吐瀉以致氣弱

者四君子湯不能食合益黃散脾主之瀉未止者四君

子湯吞肉苳蔻丸泄利甚者陳氏木香散主之泄利

若紅紫色焮腫者血熱也四物湯失血合消毒飲見

形加紅花外用臙脂塗法見形解之乾枯者血虛也

四物湯加人參麥門冬地骨皮外用臙脂塗法水楊

湯浴法灰白另立門在下卷

起發之時根窠紅活形色潤澤者此血隨氣行灌注

諸瘡自然紅活肥澤不須服藥如雖起發乾枯無水

謂之不肥澤帶青紫黯色謂之不紅活其變為黑陷

乃血虛也四物湯

失血

加入參及麥門冬紫草紅花

間進調無價散

倒鑿

或吞服奪命丹

見形

外用燕脂

塗法

見形

水楊湯

水楊柳五筋淨洗春冬用枝秋夏用枝葉判斷用

長流水一大釜煎六七沸先將三分中一分置浴盆

內以手試不甚熱亦不可太溫先服宜用湯藥然

後浴洗漸漸添湯以痘起發光壯爲度不拘次數

祛邪湯

痘號天花最忌諸穢臭惡血五六朝間痘

本美麗鼎峻而一時失防或觸於腥血或感於穢

臭倏忽更變外宜祛邪湯浴之而內服玉樞正氣丹可也

雞毛

拔細軟者

升麻

荆芥

木通

紫蘇

荔枝殼

水楊條

右用水煎濃去查洗浴

玉樞正氣丹

玉樞正氣神功捷生地紅花併甘桔參耆須倍橘紅扛蟬蛻防風義愛覓寅谷相朝嫩桃杪五箇和一薑甘草列煎濃投酒服須與不覺痘自還元吉

頂陷起發之時不徐不疾以漸長大尖圓磊落光壯
堅實根脚紅活此氣充足載血而行透徹諸瘡自然
尖圓光壯不須服藥如雖紅活頂平中陷不成尖圓
色嫩皮薄不能堅厚其變為癢塌為留伏壅遏乃氣
虛也四君子湯不能食合勻氣散見形加黃耆官桂或
人參白朮散渴加黃耆官桂防風或調元湯大法加
官桂防風白芷荆芥穗或十全大補湯汗去地黃加
防風白芷或十宣散見形皆可選用若瘡皮薄色嬌
淫淫如濕者此氣不勝血宜補氣涼血四君子湯四
物湯去川芎地黃加黃耆官桂防風荆芥穗如浮囊

虛起殼中無水者此氣不依血血不附氣其變爲癢
癩爲癰腫十全大補湯去白朮加大力子連翹防風
燒人尿 痘瘡起發尖圓爲貴如四圍起中心平陷

者此有二種有血化成水四圍高起心中畧低凹者
俗呼爲茱萸豆此中氣不足發未透徹故耳能食者
至養漿之時盡充滿而起矣不能食者宜扶中氣人
參白朮散主之有四圍沸起中心落陷無水猶是死
肉其形如錢宜急攻之若待漸變黑點不可爲矣此
名鬼痘四君子湯合九味順氣散加燒人尿或紫草
飲出不快或紫草飲子連進服之外更用臙脂塗法見形

出齊後痘有小孔自頂直至脚不黑不白與痘色相同名爲蛀痘皆因表虛而腠理不密成此證也失於早治大泄元氣不起不發禍不旋踵急用保元湯下生糯米川芎肉桂丁香其孔自密甚爲捷徑連進二三服必待孔閉而痘自起孔若黑色則爲丁矣頂陷色白皮薄晶光者氣虛也大下保元倍加酒炒黃耆肉桂川芎丁香茯苓皮人乳好酒進之

九味順氣散

又名勻氣散

白朮

白茯苓

青皮

白芷

陳皮

烏藥

痘瘡起發

幼科五

人參各伍分

甘草炙貳分半

木香壹分半

右剉細水一盞煎七分去渣溫服

紫草飲子

紫草茸

人參

白芍藥

蟬蛻

甘草

穿山甲

土拌炒各等分

右剉細用水一盞煎五分作三四次溫服

內托散 治痘瘡毒根在裏頂陷灰白色不起發根

窠不紅內托毒化立驗

人參

甘草

肉桂

白芷

白芍藥

川芎

各壹兩