

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷五十一



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

醫治準繩卷之二十一

傷寒

傷寒
為瘧

傷本者秋必為瘧

瘧凡傷寒地瘧前熱未除其脈陰陽俱盛重於陰者變為溫

明 王肯堂 撰

欽定四庫全書

證治準繩

一

變為溫瘧也寒熱往來口苦胸脇滿者小柴胡湯加芍藥少加桂枝主之若熱多者倍用柴胡寒多者倍用桂枝若熱甚而煩渴人參白虎湯少加薄桂主之若單熱無寒者不用桂也但有寒必少佐之如熱多者小柴胡湯合白虎湯主之痰多而熱者小柴胡合二陳湯主之若食少胃弱者加白朮心下痞加枳實黃連脈虛者必倍人參口渴者去半夏加括蕒根主之若邪熱蘊結於裏大便秘實脈滑大力者以大柴胡湯下之若變瘧

已正宜於雜病中求之

一歲長幼疾狀相似為疫

春應暖反寒夏應熱反涼秋應涼反熱冬應寒反溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者為時行疫病也 按說文民皆疾為疫從疒役聲今省作殳爾釋名厲礪也病氣流行中人如磨礪傷物也疫役也多有鬼行役役不住也後人有溫疫寒疫時氣大頭傷寒等名其實皆疫也俗謂之瘟病即溫病之訛而

名實淆矣 按傷寒例云傷寒病熱未已再遇風寒濕而各變為一病也何至於溫既曰再遇溫熱變為溫毒矣又曰再遇溫氣變為溫疫是獨溫之再遇而有二病之異且疫者特感非時之氣衆人病一般也如冬應寒而反大溫人感冬溫而病則所謂溫疫如春夏應溫熱而反大寒人感暴寒而病則所謂寒疫也何待再遇於異氣耶茲云再遇溫氣變為溫疫是傷寒再遇異氣而變病也再遇異氣而變病未必衆人病相似安可以疫

言傷寒例云陽氣濡弱陰脈弦緊此溫疫之脈也活人書注此脈於冬溫條下是以溫疫冬溫合為一病殊不知冬溫特感非時之氣耳溫疫是傷寒再遇於異氣也豈可合為一病耶此理未明故書此以俟明哲愚謂感溫熱而為溫毒感溫氣而為溫疫此乃有微甚之分但疫字疑誤恐當作疾字若作疫字則冬溫又何一家長幼病相似也一家病相似方可言疫況此傷寒病熱未已再遇溫氣而病何至於一家傳染病相似哉

溫疫陽脈濡弱陰脈弦緊者更遇溫氣變為溫疫以此

冬傷於寒發為溫病脈之變證方治如說

成此前熱未已又感溫氣

者也溫熱相合變為溫疫

丹衆人病一般者天行時疫也有宜補宜散宜降

大黃 黃芩 黃連 人參 桔梗 防風

滑石 香附 蒼朮 人中黃

右麴糊為丸每服五七十九分氣血痰作湯使送下

氣虛者四君子湯送下血虛者四物湯送下痰多者

二陳湯送下熱甚者用童便和前藥同送下

本糞清臘月截淡竹去青皮浸滲取汁治天行熱狂熱
疾中毒并惡瘡草毒取汁浸皂角甘蔗治天行熱疾

丹解一切災病用粉草五兩細切微炒量病人吃得多
少酒取無灰酒一處研去滓溫服須臾大瀉毒亦隨出
雖十分渴亦不可飲水飲水難救

柴胡石膏湯 治時行溫疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞
咽乾心胸煩滿寒熱往來痰實咳嗽涕唾稠粘

柴胡

石膏煨

赤芍藥

前胡

乾葛

各十五兩

升麻

二十兩

黃芩

桑皮

各三十兩半

荊芥穗

三十兩

右咬咀每服五錢水一盞生薑三片豆豉十餘粒同

煎七分去滓熱服小兒分三次更量大小加減不拘

時候

右三方熱多裏多者宜之

按溫疫之治與傷寒陽證相同然經所謂溫疫者即

溫病也宜參溫病條處之

寒疫活人云一歲之中病無長幼率相似此則時行之
氣俗謂之天行是也老君神明散務成子螢火丸聖散
子敗毒散不拘日數淺深吐下隨證施行所以聖散子
不問陰陽表裏也

老君神明散

白朮 一錢

桔梗 二錢
半

附子 炮去
黑皮

細辛 各一
兩

烏頭 四兩
炮
去皮尖

右五味為麤末縫絹袋盛帶之居閭里皆無病若有

疫癘者溫酒服方寸匕覆取汗得吐則瘥若經三四日抄三寸匕以水一碗煮令大沸分三服

聖散子 蘇內翰序全文見活人書時毒流行用聖散子者一切不問陰陽之感連服取瘥不可與傷寒比也若疾疫之行平旦輒煮一釜不問老幼良賤各一盞即時氣不入

草豆蔻

十箇麴裏煨去皮

猪苓

去皮

石菖蒲

茯苓

良薑

獨活

去蘆

附子

炮製去皮臍

麻黃

去根

厚朴

去皮薑製

藁本 芍藥

枳殼剉炒
去穢 澤瀉

細辛

防風去叉
蘆

白朮

藿香

半夏

吳茱萸湯洗

蒼朮

甘草各半
兩 柴胡各半
兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎取八分去滓熱服餘渣再煎空心服之

右二方治疫寒多表多者宜之

按寒疫之證必與傷寒陰證同乃可用前熱藥至謂不問陰陽表裏無不取効決無此理後世以過信蘇

長公故施聖散子殺人如麻者屢矣嗟乎可不慎哉
吳寒疫乃天之暴寒為病也凡四時之中天令或有暴
風寒之作人感冒而即病者名曰寒疫也其證與正傷
寒同但暴寒為輕耳治法若初作頭疼憎寒拘急或嘔
逆惡心中脘痞悶或飲食停滯不化或腹中作痛未發
熱者宜藿香正氣散增損一二味主之若已發熱者宜
用十味芎蘇散汗之若身痛骨節疼而發熱者宜人參
羌活散加蔥白葛根生薑以汗之或神朮湯亦可若有

自汗不宜再汗之宜九味羌活湯主之若熱不解或變別證宜從正傷寒條內治之也

龐病源載從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而人有壯熱病者此屬春時陽氣發外冬時伏寒變為溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒皆為時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦微其病與溫病暑病相

似但治有殊耳其治法初用摩膏火灸唯二日法鍼用
崔文行解散汗出愈不解三日復發汗若大汗而更不
解者勿復發汗也四日服藜蘆丸微吐愈若用藜蘆丸
不吐者服赤小豆瓜蒂散吐之已解視病尚未了者
復一法鍼之當解不解者六日熱已入胃乃與雞子湯
下之愈百無不如意但當諦視節度與病耳食不消病
亦如時行俱發熱頭痛食病當速下之時病當待六七
日下之時病始得一日在皮二日在膚三日在肌四日

在胸五日入胃乃可下也熱在胃而下外之熱乘虛而入胃然要當復下之不得下多致胃爛發斑者赤斑出五死一生劇者黑斑出十死一生人有強弱相倍也病者過日不時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣若得病無熱但狂言煩燥不安精神言語不與人相主當者治法在可水五苓散證中 此巢氏載若時行寒疫之法云與溫病暑病相似但治有殊者據溫病無摩膏火灸又有冬溫瘡豆更有四時藏府陰陽毒又夏至後有五種

熱病時令盛暑用藥稍寒故治有殊也

崔文行解散 治時氣不和傷寒發熱

桔梗

細辛

各四兩

白朮

八兩

烏頭

一斤

細末傷寒服一錢五銖匕不覺復小增之以知為度

若時氣不和只服一錢五銖匕辟惡欲省病一服了

去此時行寒疫通用之無病預服以辟寒為佳皆酒

調下

藜蘆散

辟溫疫

即千金赤散