

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷六十六



北京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

大定四年八月

薛氏醫案

明薛己訂

問書

明薛己訂

喉間內清或
鼻外患瘡

賦有熱或乳母七情之

與症之輕重經之所主

經風熱也用柴胡梔子

大定四年八月

薛氏醫案

一

散右腮色赤者肝經有熱也用瀉白散額間色赤者心
與小腸經熱也用導赤散若兼青色風熱相搏也用加
味逍遙散鼻間色黃脾胃間有熱也用瀉黃散若兼青
色木乘土位也用加味逍遙散兼赤色心傳土位也用
柴胡梔子散頰間色赤腎經有熱也用杞黃丸凡此積
熱內蘊二便不通者當疏利之風邪外客而發寒熱者
當發散之外感風邪大便閉結煩渴痰盛者當內疏外
解若因乳母膏粱積熱者母服東垣清胃散若因乳母

志怒肝火者母服逍遙散稟賦陰虛者兒服地黃丸大概當用輕和之劑以治其本切不可用峻利之藥以傷真氣也

一小兒喉間腫痛驚悸飲水服驚風降火之藥益甚仍欲攻風痰余曰驚悸飲水心經虛症也蓋胃為五臟之本先用五味異功散以補胃加桔梗甘草以消毒諸症頓退後用牛蒡子湯加柴胡而愈

一小兒喉間腫痛左腮色青赤此心肝二經之熱也用

柴胡清肝散而愈後因驚服至寶丹吐痰發搐手足指
冷此肝木虛而肺金乘之用補中益氣湯以補脾肺六
味地黃丸以滋肝腎而痊

一小兒發熱飲冷大便黃色手足並熱不能吮乳視口
內無患捫其喉間則哭此喉內作痛乃脾胃實熱也用
瀉黃清胃二散各一劑母子並服而愈後因乳母飲酒
兒躁不安口內流涎仍用前二散而愈

一小兒喉間腫痛口角流涎手足並熱用瀉黃清胃二

散母子服之而愈後因母大怒兒憎寒發熱仍復流涎
用柴胡清肝散加漏蘆母子服之而愈

一小兒喉間腫痛發熱咳嗽大便秘結此肺與大腸有
熱也先用牛蒡子湯加硝黃一服大便秘通乃去硝黃
再劑頓愈審其母有肝火發熱用柴胡清肝散母子並
服而痊

一小兒嗜膏粱之味喉間腫痛痰涎壅盛服已豆九前
症益甚口鼻出血唇舌生瘡大便不實余用犀角地黃

湯解膏粱之熱用東垣安胃散解巴豆之毒又用甘桔湯而愈

一小兒喉腫作渴大便乾實右腮赤色此肺與大腸經實熱也用柴胡飲子一服而愈後因飲食停滯服峻厲之藥喉間仍腫腹中脹痛此脾氣復傷也用異功散加升麻當歸而痊

一小兒因母忿怒患前症兼咬牙呵欠余謂肝經虛熱之症子用甘桔湯加柴胡山梔牛蒡子母服加味道遙

散而愈

一小兒肌體瘦弱嗜土炭煤灰後鼻間不利略服清熱之劑肌體愈瘦食少熱甚善驚善怒小便良久變白鼻中出息肉二寸許耳下頸間結小核隱於筋肉之間余謂肝脾虛羸之變症不信乃內清肺火外用腐蝕喉間亦腐余先用五味異功散加升麻柴胡蕪荑為主更用四味肥兒丸為佐脾氣漸健夕用九味蘆薈丸為主以五味異功散為佐而愈

一女子六歲喉間腫痛鼻中息肉寒熱往來小便頻數
良久變白此肝疳之症先用加味逍遙散加炒黑焦龍
膽草熱痒漸退乃去龍膽草佐以四味肥兒丸而愈

一女子七歲鼻生息肉搽攻毒之藥成瘡腫痛外以黃
連甘草黃柏末傅之以解藥毒更以加味逍遙散清肝
火佐以四味肥兒丸而愈

一女子鼻中及下部常出息肉屢用毒藥蝕之各挺出
一條三寸許先與龍膽草湯為主以加味逍遙散為主

而愈

一小兒額間赤足心熱喉中常痛服清胃敗毒之藥余謂稟腎水不足而心火熾甚也當用地黃丸壯水之主以制陽光不悟口舌赤裂小便如淋而歿

一女子十四歲患前症雜用清熱敗毒等藥前症益甚更患陰挺詳見下疳瘡

牛蒡子湯 治風熱上壅咽喉腫痛或生乳蛾

牛蒡子炒 玄參 升麻 桔梗炒 犀角 鱗黃 芩

木通 甘草 各等分

右每服一二錢水煎服

拔萃桔梗湯 治熱腫喉痺

桔梗 炒 甘草 炒 連翹 梔子 炒 薄荷 黃芩 各等分

右為末每服一二錢水煎服

柴胡飲 解肌熱積熱或汗後餘熱脉洪實弦數大便

堅實者

黃芩 七分 甘草 四分 大黃 八分 芍藥 炒七分 柴胡 人參 各五分

分
當歸一錢

右每服一錢薑水煎

東垣人參安胃散治脾胃虛熱口舌生瘡或傷熱乳食

嘔吐瀉痢

人參一錢黃芪炒二錢生甘草炙甘草各五分白茯苓

四分陳皮三分黃連炒二分白芍藥酒炒七分

右為末每服二錢水煎

三因玉鑰是治風熱喉閉及纏喉風

焰硝一兩半 鵬硝兩半 片腦一字 白殭蠶一錢

右研勻用五分吹入喉中立愈

九味蘆薈丸治肝經積熱咽喉口舌生瘡或牙齦蝕爛
兩目生翳耳中出水或肝積癰瘕下疳陰腫或莖出
白津拗中結核或小水良久變白大便不調肢體消
瘦等症

胡黃連 宣黃連 蘆薈 木香 白蕪荑炒青

皮 白雷丸 鶴虱草各一兩 麝香三錢

右各另為末米糊丸麻子大每服五分空心米湯下
仍量兒大小用

甘桔湯治風熱上攻咽喉疼痛及喉痺妨悶

桔梗一兩甘草炒二兩

右每服二錢水煎

濟生犀角地黄湯治膏粱積毒脾胃有熱咽喉腫痛或

口舌生瘡

犀角 牡丹皮 各一兩 生地黃 八錢 赤芍藥 七錢

右每服一二錢水煎

五味異功散

方見敗毒之藥

六味地黃丸

方見作渴不止

柴胡清肝散

方見脇癰即柴胡梔子散

補中益氣湯

方見肌肉不生

瀉黃散

方見頭面瘡

腮癰

附耳症

腮屬足陽明胃經其生癰者多因兒食甘甜味脾

胃積熱所致亦有乳母鬱怒兒受其患者若因熱積於
內二便不通者用涼膈散風邪相搏二便如常者用漏
蘆湯胃經風熱或兼咽喉腫痛用升麻防風湯若稟賦
陰虛火動頰間或兩耳內生瘡或出膿不止者宜用地
黃丸若因乳母肝火乘脾用加味逍遙散脾經鬱熱用
加味歸脾湯膏粱積熱用東垣清胃散脾胃風熱用清
咽利膈湯仍叅口瘡治之

一小兒腮腫肉色不變大便不實屬胃經虛熱用五味