

重
脾

或加

山藥

方於可用

炒仁

中

冷種

每服

墜下

故也

視已成

取自然汁

痛處用細

硬換膏再貼

乾薑四兩用

開水送下久服

痰疾 ○中痰

新編

鑄記書棧印

李鴻章

重訂驗方新編卷四

金匱關氏校錄石印

脾胃

○惡心吞酸

此脾胃虛冷也吳萸四錢滾水泡去苦味水煎食遠服有人患此多年一服即愈

或加乾羌一錢亦可忌夜食並忌生冷食物

又方核桃嚼爛姜湯送下

○胃口虛脹手足厥冷

山藥半炒半生研細米湯下二錢日二次忌鐵器

○涼藥服多嘔惡食

前三方及後鯽魚橘皮二

方均可用

○冷水多服

沙子炒焦再加水煮澄清飲之即消

又方食生蒜頭二三枚亦效或服

炒仁一二錢亦可

○胃脘冷滯

有人胃中冷滯多年不愈後遇名醫疹之曰此尸症也用死人棺

中枕黃水服之即愈

○脾胃虛冷不思飲食

鯽魚和荳豉胡椒老姜陳皮煮熟空心服

脾家

冷積食後胸滿兼治一切痰氣 橘皮一斤(柑橙皮勿用)甘草食鹽各四兩水五碗慢火熬乾焙為末

每服二三錢白滾水沖服有人得此疾百藥不效偶服橘皮散似屬相宜遂連日服之一日忽覺一物

墜下大驚自汗如雨須臾腹痛遺下數塊如鐵彈子臭不可聞從此胸次霍然其病頓愈蓋脾之冷積

故也

○胸胃積滯

有人食白煮雞蛋過多胸胃積滯數年不愈後用大蒜半斤煮食吐出一團開

視已成小雞連服數次吐出十餘團而愈

○胃寒嘔吐黃水並治痰飲吐水

暖胃膏生姜一斤搗

取自然汁碗許入牛皮膠乳香末沒藥末各五錢同煎膠化離火將藥作三四大膏藥以一張貼胃脘

痛處用絢紉捆三個時辰然後取週歲小孩所穿之鞋一雙銅鑼上烘極熱在膏上輪流熨之熨至膏

硬換膏再貼再紉三時再熨至愈為止後用紫油厚朴三斤用老姜二斤切片同煮一時去姜不用

乾薑四兩用甘草二兩同煮一時去甘草不用將二味炒乾為細末黑棗煮湯去皮核為丸每服二錢

開水送下久服斷根此方名慰胃丸功能溫中降氣暖胃消痰大有奇效此林屋山人經驗之方也

痰疾

○中痰氣絕

方見卷十二急救門

○下痰

治一切風痰眩暈癲癎久不愈者白礬一兩

細茶葉五錢為末煉蜜為丸梧子大食鹽薑湯下五丸

入服痰自大便出

○茯苓丸治痰症手臂

痛癢並治婦人產後發喘四肢浮腫生肌夏二兩茯苓

枳殼去瓢麝炒五錢風化硝二錢五分如一

時水易成但以朴硝撒在竹盤中少時盛水置當風處即乾刮取用亦可共為細末生薑汁煮糊為丸如梧子大每服三十丸薑湯送下有人為痰所苦夜間咳嗽如人抽搐兩手發戰不能舉物服此隨愈

○痰氣結胸

真淨銀珠五錢明礬一兩同研用罈年盛火瓦器盛藥鎔化急刮搥丸每服一錢好

茶入薑汁少許服之心上隱隱有聲結胸自散不動臟腑不傷真氣明礬化痰銀珠破積故也 又方

梨汁一盅薑汁白蜜各半鍾薄荷三錢研細末和水煮十餘滾服降痰如奔馬 又方照哮喘第一方

治之極效

○痰飲吐水

凡食冷物過度或氣虛脾弱不能消化飲食入胃皆變成水嘔吐無時名

曰痰飲好赤石脂一斤研末每服二錢酒送下至多服三錢服至一斤則終身不吐痰水又不下痢此

藥能補五臟令人肥健有人痰飲百藥不效服此立刻而愈 又方暖胃膏尉胃丸二方見前脾胃門

極效

○痰癲癲狂

狂病有因傷寒而得之者此一時之狂也照仲景張公傷寒門治之用白虎湯

以瀉火矣更有終年狂病而不愈者或持刀殺人罵官不認父母妻子見水則喜見食則怒此乃心氣

之虛而熱邪乘之痰氣侵之遂成狂矣此等欲瀉火而火在心不可瀉也欲消痰而痰在心之中不易

消也惟有補脾胃之氣則心自養不必祛痰痰自化不必瀉火火自無矣方為化狂丹高麗參三錢白

朮茯神各一兩甘草菖蒲各一錢半夏免絲子各三錢附子一分水煎服一劑狂定二劑病痊此方妙

在補心脾胃之三經而化其痰不去瀉火蓋瀉火則心氣愈傷而痰涎愈盛狂將何止乎尤妙在附子

一分引補心消痰之劑直入心中而氣尤易補而痰尤易消又何用瀉火之多事乎此所以奏功如神

也

又方真鬱金七兩白礬三兩薄荷水為丸硃砂為衣如梧子大每早服一次開水下有婦人癲癲

十餘年服至四五十日心間如有物脫去再服數十日而愈以鬱金入心去惡血白礬化頑痰珠砂安神故也愈後酒用天王補心丹加減調治方免後患 又方絲綿一尺燒灰開水下兌酒服更妙

癰瘻不止 食鹽燒紅河水煎服過片時用手指入喉抵住舌根使作嘔吐嘔出熱痰數次即愈

羊癲風 菜葉放口中青草亦可立時蘇醒仍照前煎橄欖膏服之可斷根 ○痰迷謔語方 鮮豬

心一具辰砂一錢甘遂二錢二味合研為末藏豬心中外用牛糞煨熟取出藥末和作二丸將豬心煮

汁和丸吞下即愈

三消渴而飲水不止為上消飲水多而作瀉為下消多食易飢為中消 ○消渴飲水不止 三消湯真

台黨白朮當歸茯苓生地各一錢黃柏知母黃連麥冬天花粉黃芩各七分甘草五分水煎服神效三

消皆治 ○天池膏 天花粉黃連真台黨知母白朮五味各三兩麥冬六兩生地汁藕汁各二兩人乳

牛乳各一碗生薑汁二碗先將天花粉七味切片用淘米水十六碗桑柴火慢熬汁即盡五六碗滌清

入生地等汁慢慢煎熬加白蜜一斤煎去沫熬如膏收入磁罐用水浸三日去火毒每用二三匙白滾

水送下甚效三消通治 ○免絲丸 免絲子酒浸選淨焙乾十兩茯苓蓮肉各三兩五味子一兩共為

末另研真山藥末六兩酒煮搗數百杵丸如梧子大每服五十九空心米湯下三消皆治 又方葦葢

煮汁並作粥食更妙 又方好梨日日食之多食必效或多食蘿蔔更妙 又方苦練樹根新白皮五

錢切片瓦上焙乾入麝香少許水煎空心服之有人口渴不止遇道人傳此方下蟲三四條而愈愈後

人必困頓用黨參二兩煎水飲之 又方如一日飲水至一石者浮萍搗汁服之 又方如飲水多而

小便不通者葵花根五兩煮湯清早服之 ○多年消渴飲水百藥不效 每日食好梨二三個或食

蘿蔔亦可均極神效 又方白芍甘草等分為末每服一錢開水送下日三服七日而愈有人渴飲九

年時發時止服此斷根

○飲水不止小便如膏 茴香炒苦楝子炒各一錢研末空心酒調服

○

飲水不止小便時流以上各方可以通治

雞蛋三個要頭窠生者去殼攪融用燒酒四兩澆開沖服

服後即蓋被睡下睡醒禁風三日即愈有人一日飲水數桶上飲下流服此而止神效非常

○久病消渴不止並治泄瀉口渴 七味白朮散白朮高麗參真茯苓霍香葉乾葛各一錢炙草五分水煎當

茶飲另用木香三分磨汁兌服屢試神效

○消食易飢以上消渴各方可以通治 好梨日日飲之

多日自愈

又方肉苁蓉山茱萸五味子為末蜜丸梧子大每服二十九鹽水下

○腹中易飢食下

片刻即吐

此蛇積也用醋泡大蒜汁飲數碗吐出一蛇即愈不吐再服數碗自愈

又方雄黃五錢

調水服數次即愈

飲食積滯與痞門參看

○食積外治法

凡飲食停滯胸膈滿脹或大便不通或大便泄瀉或年老

或體虛難以攻擊內消者用亂髮一團剪斷酒麴一個小者二三個亦可葱白七個老姜三錢胡椒七

粒以雞蛋一個破殼傾入碗中將各藥搗勻和入調勻用隔夜燈油煎成一餅貼病人心坎下胃脘處

先用燈油於胃脘處順擦七次再貼如嫌太熱用紙隔貼亦可用布帶束住冷則煎熱再貼約一二時

似覺鬆動即便取去其病立愈此法極穩而效屢試如神若治小兒藥料可以稍減 又方紫蘇熨法

見傷寒門亦極效

○飲食凝滯攻衝作痛或有形或無形

方見各項氣痛門

○飲食過多脹滿

不安 用鹽擦牙溫水漱下二三次如湯沃雪也

○魚肉積滯

狗糞燒存性為末酒服二錢日三

服其積自大便出 又方山查炭研末為丸每服四錢數次即愈

○食魚積滯

紅曲三合煮爛連

渣服積從大便出連服三次即愈 生魚積滯取水中石子數十枚燒紅投冷水中七次即熱飲之

三五次其積從大便出

又方生羌汁和紫蘇汁飲之即消

○食犬積滯

山豆肉杏仁去皮共各

二十四粒煎濃湯飲自化 ○食牛腹脹 乾稻草一把煎濃湯熱飲自消 ○食鴨積滯 淘米水

煎熱飲一盞即消 ○鴨蛋積滯 治法與上同 ○雞蛋積滯 飲好醋即消或飲荳豉水亦消

○食整煮雞蛋積滯 腹中如有雞子鳴者多食大蒜即可吐出 ○食鹽蛋積滯 肉豆蔻一個煨

去油煎服連服數個自消 ○食索粉涼粉積滯 杏仁五十粒去皮尖蒸熟搗碎滾開水冲服即消

○食瓜菓腹脹作痛 肉桂研末飯和丸菜荳大每服五分滾水下 又方食鹽湯即愈 ○食西瓜

瓜並諸瓜過傷 瓜皮煎湯解之諸瓜皆同 ○食荔枝腹脹 荔枝殼煎水服即消 ○食菱肉腹

脹 取生薑汁飲立消 ○食荳不消 生蘿蔔煎飲之即消 ○食麵不消 生薑汁冲好酒熱服

自化 又方生蘿蔔取汁炖服極神效凡食麪用醋斷不作脹 ○糯米積滯 神麪炒為末加木香

末鹽開水下數日口中必聞酒香其積即散 ○飯食凝滯腹痛 飯搓成團加鹽少許燒枯煎水飲

即消 ○食茶成癖 花椒芝麻等分為末以蒸麪餅為丸如梧子大每服十丸茶送下百日立效

○食積痞塊 木賊五錢研末每服五分開水空心調服年近者一料立散年遠者二料即效

噎隔 此症有氣隔血隔酒隔痰隔虫隔數種惟氣隔及老年人隔食者難治得法亦可愈也 ○噎隔

諸方凡患隔食鼓脹愈後必戒殺放生方免復發至要至要 牛涎丸專治隔食糯米粉以老牛口涎

拌和為小丸煮熟食之神效或牛涎和水服亦妙以水洗盡老牛口用鹽塗之少頃涎自出愈後戒食

牛肉 又方牛皮草煎水服其效如神無論何項噎隔皆治 又方豬肺管四兩鮮藕四兩如無鮮藕

乾藕節亦可獲羅底一個麵舖所用羅麵之黃絲羅底要黃的黑白者不用以上三味新瓦上培枯研

細末用生薑一兩搗爛取汁白沙糖一兩冲服初服必吐吐後再服服至三次即不吐矣服後忌食各

色荳一月此方活人甚多神效莫測珍之寶之並忌食荳腐荳芽菜一月又方小兒胎髮一個以陰陽

瓦焙焦存性研細末陳酒送下極效 又方淨牛乳以當面取者為佳少加白糖時時燒熱飲之凡患
噎隔大便燥結者服此必效 又方逢日食時自初虧起用白乾麵二斤水調揉熟向日和成丸如桂
圓核大以日色復圓為止即將麵丸於是日晒乾收好按一歲一丸空心煮食平淡而有奇功麵圓外
實內虛尤為奇異不可輕忽多製可以濟人價廉功大不見日則不效 又方生藕汁生薑汁梨汁蘿
蔔汁甘蔗汁蜂蜜白菓汁竹瀝各一盞和勻飯上蒸熟隨意飲之 又方韭汁梨汁薑汁人乳各一盞
飯上蒸熟服之三日後再服極效 又方此症胸前必有二小骨漸漸交合則不能食而死取生鵝血
對口乘熱灌之其骨自化飲食可進永戒食鵝牛二物一僧患噎食病臨死語其徒云胸中有物作梗
死後必為剖出其徒剖得一骨後殺鵝血偶滴骨上骨即消化其徒亦患此病因飲鵝血而愈屢試如
神 ○傷寒噎食 核桃五十枚於砂鍋內水浸核桃高一指深煎四五滾取水飲之 ○噎食初愈
飲食宜少 凡噎食初愈飲食不可驟進須先以米湯飲二日再以清清稀粥服一二日再以濃粥服
一二日每次只可一小碗後七日後方可食乾飯每食不過一小碗日漸遞加切勿食飽緣胃氣初復
驟然飽食反致傷胃則不可救矣即病人要食生氣亦須聽之愈後忌鹽醬五十日仍請名醫調理
反胃嘔吐凡患嘔吐以上噎隔各方可以通治生薑一大塊直切薄片勿令斷層層擦鹽以線紮緊外
用草紙七層包之水泡濕慢火煨熟取起搗爛和米煎服立止 又方生薑汁一盞煎滾聽用蜂蜜四
兩煉熟聽用每服用薑汁一匙蜜二匙白湯調服每日五六次效 又方柿餅拌乾飯蒸熟連食八日
不飲滴水極重者八日必愈屢試屢驗萬無一失 又方藕二枝陰乾三四日去其頭二三段吞汁吞
渣一日一段二日服完即愈 又方甘蔗汁一升入生薑汁二合溫熱作五次服甚效 又方用老姜
一大塊挖孔納紅棗一枚紅棗去核內包砂仁一顆外用黃泥包裹煨透去泥與姜棗只取砂仁嚼食

數顆數次即愈極效或將薑棗砂仁煎湯服之亦效胃寒者最宜 又方蚯蚓糞一兩木香三錢大青

七錢為末每服五錢無銀水調下忌煎炒酒醋椒薑熱物一二服即愈其效如神因熱而嘔泄者最宜

○上吐下瀉此尋常吐瀉也如因暑熱吐瀉不止急煎藿香十五霍亂門治之樟木煎水服立止屢試

如神並治霍亂亦效 又方韭菜搗汁隔水燉熱微溫服極效 又方陳鹽梅一個瓦上焙乾加生薑

一大片同煎服極神效 又方小兒吐瀉不止用舊鐵釘有銹者煮水飲入口即止 一二日一吐

氣味變酸 有人飲食一二日之後一齊吐出氣味變酸百藥不效用豬板油十兩熬去渣白蜜八兩

煉淨二味再入銅鍋內熬數滾入生薑自然汁三兩和勻成膏取起不時挑服含化初服一次尚吐連

服三次全愈 ○一二日一吐或三四日一吐飲食不飽吐物不化 此名胃囊症生於胃旁其形

如囊凡有飲食必入此囊雖食飽而肚仍飢餓因此物間隔於上飲食不能入腹故也初起一二日一

吐吐出食物並無氣味肉食則化米食不化久則三四日一吐若至五六日一吐則難治矣用製附子

五錢雲苓一兩每日煎服二次服至三日吐出食物必變氣味再服三日則吐一半再服三日則不吐

矣不吐之後用六味地黃湯見內外備用諸方加油當歸火麻仁研末煉蜜為丸每早服五錢晚服芝

蔘五錢服至數日後胃囊必從大便而出重者形如牛皮輕則如紙此病人多不知諸書不載方係仙

傳萬金難得寶之寶之 ○朝食暮吐暮食朝吐 此腎虛也用熟地二兩山萸肉三兩水五碗煎至

一碗加肉桂一錢研末兌入空心服一日一劑十日必愈愈後服六味地黃丸一二料方可斷根 ○

飢餓嘔吐 凡人飢餓每有蟪虫上胃物食必吐若誤用翻胃之藥其吐更甚宜用川椒煎湯服即安

乾吐不出 此極惡之症用甘蔗汁加生薑汁和勻溫熱服 ○酒後乾吐 甘蔗汁飲數次極

味地黄丸一二料不致再發。見食即吐。此胃經吐也。紅棗二個去核胡椒二粒打碎入棗內紙

包煨過煎湯服外用米一盃炒黑煮熱酒藥一個共研勻貼心窩。食後少頃即吐。此胃脘有虫也。

白馬尿飲一二升極效。或查卷五虫疾方治之。嘔物不化。此大腸嘔也。黃糖酒藥即酒餅陳壁

土共煎湯服外用酒藥二個半生半煨細茶三錢艾葉二錢共搗爛茶炒貼心窩。嘔吐清水。此

胆經嘔也。生姜一塊切開中挖一孔甘草研末五分入姜內紙裹合住煨熟取姜內甘草入姜一片煎

湯服外用蜡樹根去粗皮瓦上霜路旁陳茅草皂角反共搗碎茶炒貼心窩。欲嘔而不嘔此小腸

經嘔也。楓樹皮甘草煎服外用燕子泥樟樹皮共搗碎有熱用茶炒無熱用酒炒貼心窩。又方車前

草燈心桔木葉煎湯服。又方如嘔後小便不利者楓樹漿作膏用皂角反摻上貼臍眼用燈火在喉

下燒三次。口吐白沫欲嘔而不出此膀胱經嘔也。菜菔糯米鹽共炒搗碎加黃糖水煎服。又方

蚯蚓胡椒艾葉皂角反共研碎清油炒貼心窩。又方如嘔後氣不散者用艾葉搗碎醋炒貼心窩神

效。欲嘔而不嘔面發紅眼流淚。此三焦嘔也。生藕洗淨搗汁如無以藕節代乳汁乾柿蒂鳳凰

穀煎服神效。又方桑樹皮茶葉四季葱共搗爛炒熱貼心窩如二便不通加皂角反黃糖水調貼肚

臍。又方黃豆研童便和勻貼心窩。又方上不嘔下不瀉如霍亂者用糯米菜豆鹽胡椒灶心土共

為末以刀燒紅將藥放刀上陰陽水冲服外用米酒糟皂角反同炒貼心窩如不愈用針刺中指出血

即愈。聞藥即吐百藥不效。取家中灶心土藥店買者不真則不效水為丸塞兩鼻孔即不吐矣。

極效。嘔吐不能服藥必有蛇在胸膈。川椒十粒炒煎服或於嘔吐藥中加川椒飲之。又方陳

鹽梅二個和滑石末共搗作餅紙包火上煨枯開水泡服甚效。脾胃虛弱食不消化湯飲不下粟

米半升磨成粉為丸梧子大每用七粒煮熟入鹽少許空心食或加醋吞服。又方真糯米去白研

末五更安五分於掌心飭之即睡三日必效。又方有人服涼藥過多漸至嘔吐旬日之後進口即吐竟致粒米不下湯水亦吐已七日矣請醫診視脈不散亂尚有神氣雖因寒涼而阻隔但絕食以來大便不通小便短濇即用製大黃只殼各一錢煎湯服之竟不吐出亦不思食次日復進一劑下咽一時後大小便通利而思食矣誠哉藥之對症其效如此。○嘔吐痰水 見痰疾門

呃逆 ○偶然呃逆 紙撚通鼻取嚏即止 ○氣熱呃逆 柿蒂煎水飲即止 ○陰寒呃逆 乳香

硫黃陳艾各二錢為細末用好酒一鍾煎數滾乘熱氣使病人用鼻嗅之外用生姜擦胸前最效 又

方雄黃二錢燒酒一盞煎七分急令病人嗅其熱氣即止 又方川椒去子及閉口者炒四兩麝香為

丸如桐子大每服十九醋湯送下食遠服神效 ○體虛常呃逆二三聲 公丁香三十七粒白蓮子

去心二十七個二味同煮爛去渣加煨姜一片糯米半升煮粥食即止 ○呃逆日久不愈一連四五

十聲者 用生姜搗汁一合加蜜一匙溫熱服

重訂驗方新編卷五

金匱關氏校繕石印

肚腹 ○腹痛辨症腹痛各症應與傷寒門參看 臍眼上痛者食痛也臍眼下痛熱手按之不痛或其

痛多急或痛如刀割或吐或瀉或痛甚而覺有冷氣皆寒痛也手按之更痛冷物慰之不痛 或自下

而痛上或時痛時止腹滿堅結皆熱痛也時發時止痛在一處而不移者或有塊硬起者虫痛痞痛也

又聞煎炒食物香氣則痛痛時口吐清水或口渴者亦虫痛也 ○陰症腹痛 男女交合之後或外

受風寒或內食生冷等物以致肚腹疼痛腎囊俗名卵胞內縮亦有不縮者手足灣屈紫黑重則牙緊

氣絕謂之陰症傷寒治法見卷十四傷寒門 ○寒症腹痛參看陰症傷寒各方 或炒鹽熨之或炒葱

薑熨之或用熱灰熨之或用滾水一壺隔布熨之均止痛妙法也 又方龍眼連殼燒存性研末兌酒

服屢試屢驗

○肚腹畏寒

肚腹容易受寒動輒疼痛不已其致寒中三陰命在頃刻遲則難救此

下部虛損真陽不足命門火弱故也非大加

熱不可有人服

貼附桂膏又加厚棉圍腰數層遇寒仍不濟事

一老醫以製附子五錢乾羌一錢上肉桂五分研末兌服水煎連服十餘劑雖天寒肚腹亦不畏冷再

加補中益氣等藥調理全愈附子走而不守得乾姜守而不走如不信單用附子一味熬濃汁滴紙上

水必散開加乾姜熬之滴紙上則水不散矣用炮姜則不效此秘傳也

○熱症腹痛 服六一散最

妙或用銅鐵冷物熨之或服痧藥亦可若痛甚者或嘔或瀉者照卷十五霍亂痧症各方治之又上吐

下瀉而腹痛者如作霍亂痧症治之不效須照噎隔反胃門內上吐下瀉方治之

○虫瀉腹痛 虫

痛如有塊硬起者用手在硬處久久揉擦揉至一日其虫即死從大便而出或查瘡瘡門各方治之

大人小兒腹中疳疾虫疾作痛及男婦痞塊癥瘕各項肚腹脹痛 方見瘡疾門 ○治疝古方 薏

仁一兩用東方壁土炒黃色入水煮爛放砂盆內研成膏每用無灰酒調服二錢即消

○食滯腹痛

方見飲食積滯門 ○身受寒熱心腹疼痛上下關格不通大便閉塞小便短澀渾身綳緊手足腰膝僵

硬不省人事 照卷十一內外備用諸方門土尉法治之最妙

○忽然肚脹如鼓

此症肚腹猝脹

漸大如鼓此寒極也遲則不救急用武營烏鎗藥二錢爆竹藥功緩不效以頂好燒酒煎滾沖服得吐

瀉即生非陡然脹大者不可誤用 ○腹中緊脹腹硬如石痛如刀割見後瘡疾門 白糖煮酒飲數

次即愈

○肚腹麻木

此風襲也多煮葱頭食之並用葱姜炒熱熨之自愈

○忽然肚黑

凡肚

皮忽然青黑色此乃血氣失養風寒得以乘之所變怪形真危惡之敗症也若不速治難救急用大青

研細末每服一錢半以好酒調下黑退即愈否則終危此起死回生之方也大青多生溪溝旁葉似大

麻葉藥店多假生草藥店有之又有小青葉細性味相同功力稍緩 又方鉛粉和鹽炒焦敷之亦效

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

○肚腹脹大亮如水晶 柚子皮燒灰冲服神效 柚子兩廣最多他省頗少以橘紅代之亦可

方取癩蝦蟆六隻將四足紮住以蝦蟆肚皮在人肚腹光亮之處輕輕摩擦幾次再取一癩蝦蟆照前

摩擦用至六隻即愈但蝦蟆眉內有蟾酥須防其迸出射入傷眼宜用紬帕遮住病人兩眼蝦蟆用過

之後即放水中使吐毒氣以救其命是為至要 ○臍眼出膿 此症先流臭水久則出膿不腫不痛

多年不愈用韭菜葉扁柏葉二味共搥取汁一酒盃加童便一茶盃蒸熱服外用蘆甘石要能浮水者

用好醋泡一晝夜瓦上焙乾研末敷如不見效當請名醫治之不可忽也 ○臍中出水 龍骨醋泡

焙枯研敷或用赤石脂研末敷均效或照上臍中出膿方治之更妙 ○臍眼出血 方見諸血門

○肚腹堅硬臍眼出虫 方見瘡疾門 ○肚腹左右生癰 即腸癰也須照腸癰方治之 ○肚臍

生癰肚臍腫大如瓜臍眼高突者是紅赤者照癰毒各方治之不紅不熱者照陰疽各方治之 ○少

腹疽生臍下一寸五分氣海穴或生二寸關元穴或生三寸丹田穴皆由七情火鬱而生也分別紅白

陰陽治之 ○小腸疽生小腹內按之如掌堅硬而熱微痛小便多出汗畏寒皮色如常或現微腫脈

緊實而有力者是也服犀黃丸見陰疽門即愈此林屋山人秘法也 ○臍下二三寸關元丹田二穴

冷結膀胱小腹有形作痛手足厥冷 此厥陰傷寒重症宜用仲景當歸四逆湯治之桂枝當歸各二

錢芍藥三錢細辛三分通草一錢五分甘草八分大棗二枚水煎服神效其人有久寒者加吳茱萸四分

生薑一錢酒一小盃兌服 ○腸胃中瘕不可忍 此大鬱結不散所致用柴胡枳子炒花粉各三錢

白芍一兩甘草二錢煎服即愈

瘕積 ○凡腹內瘀血凝結疼痛時發時止謂之瘕積又有形者為癥無形者為瘕又久瘕不愈亦成瘕
積方見瘕疾門 ○治瘕諸方 消瘕膏治積年惡瘕至重貼至兩張即消屢試神驗蜜陀僧六兩阿

魏五錢羌活紅花子各一兩穿山甲三錢香油一斤半大候照常熬膏法膏成時下麝香一錢用布照痞大小攤貼凡患痞癰處肌膚定無毛毫須看準以筆圈記用膏貼之內用水紅花子研末三錢燒酒二斤泡之時飲一盃痞消乃止水紅花子即紅蓼花子以自取為真藥店多假用之不效 又方臭椿樹皮在上中者佳要一大束去粗皮止用白皮二斤切碎入鍋內水熬瀝去渣用文武火熬成膏薄攤布上先以生姜搓出垢膩後以膏藥在錫茶壺烘熱貼痞塊上其初微痛半日後即不痛俟其自落一張即好永不再發貼膏時微撒麝香少許於膏上然後貼之貼上膏藥週圍破壞出水即驗此方已驗多人即脹滿腹硬過膈者貼一二張即愈真神方也珍之重之孕婦忌用 又方雄黃白礬各一兩為末麪糊調膏攤布上貼之候大便秘脹滿而極多者即愈此秘法也 腹中陡然堅如鐵石痛如刀割晝夜呼號 牛膝三兩好燒酒十兩泡之緊緊封好熬成二兩飲之吐出惡物神效 腹中堅如鐵石膈內出水變作虫行之狀繞身作咬痛癢難忍掃撥不盡 蒼朮煎濃湯洗之並用蒼朮二錢麝香二釐滾水調服 婦人血蟲 馬鞭草及劉寄奴草煎湯服或為末服此治血蟲神藥也 髮癥好飲清油者是喉中如有蟲上下亦是 白馬尿飲一二碗即化或以雄黃末服之即吐出也 又方有人腰痛牽心發則氣絕一名醫視之云是髮癥以油灌之吐出一蟲掛壁上滴盡血水乃一髮也 〇米癥好食生米者是 雞糞要白色者佳白米各三錢同炒焦為末煎水服吐出米汁即愈 〇肉癥常喜食肉者是 白馬尿飲二三碗當吐肉出不吐難治 〇蛇癥 人好吃蟲致成蛇癥

用舊梳舊篦一件各破作兩分以一分燒研為末以一分煎水調末服即下出此孫真人千金方也 〇蟲癥 一人噎隔飲食不下華陀見之云是蛇癥用醋泡大蒜汁陳者佳飲二三碗並多食大蒜後吐一大蛇而愈 又方蜈蚣一條瓦上焙枯研末酒服甚效 〇龜鼈癥腹中如有龜鼈疼痛堅硬或動或不

動者用殭蠶末一錢白馬尿一二碗調服並敷痛處神效 又方白母雞一隻先餓一日用豬油炒飯與食取其糞焙乾為末水調服一錢日服三次數日必愈 ○蛟龍瘡 春秋二時蛟龍虺蛇蜚蜴之

類遺精入於菜中人偶食之得病發則似癰面色青黃肚腹脹滿痛不可忍用糯米糖時時服之服至數斤後吐出小虫即愈若吐虵虫勿服 又方明雄朴硝各五錢滾水調服泄瀉即愈 ○腹脹面黃

有人腹脹面黃百藥不效遇一名醫云是石虵極難醫治取死人棺中枕簣水與服吐出虵虫堅如石者數升而愈

蟲疾

○寸白蟲疾

此症面色黃瘦飲食少進發時腹痛口吐清水用尖檳榔一兩廣木香五錢研極

細末大人每服五錢小人每服三錢開水調下其虫即從大便而出先用煎炒香味令病人聞之然後服藥無不神驗也服藥須在月初乃效病重者二三服即愈 又方連翹老葱頭搗汁麻油調服或炒葱頭食能化虫為水 又方榧子七個日服二次服至七日虫化為水 蟬虫上出口鼻 川椒閉口者不用研末沖水服即愈並用川椒含口更妙

蟲脹附浮腫

○蟲脹辨症

手指按之下陷不起者水蠱也隨手即起者氣蠱也週身老黑色皮內有

紫黑斑點者血蠱也身大熱如火者難治身發寒熱如瘧者難治四肢發黑者難治腹脹脉大命絕者難治唇口黑脾絕者難治缺盆平心絕者難治手足心平腎絕者難治肚臍翻突肺絕者難治背平肝絕者難治陰莖腫爛者難治瀉後身有青筋起者難治大便滑泄者難治週身有破皮者難治先起於四肢後歸於腹者難治先起於腹後散於四肢者易治 ○治水蠱法手按之下陷不起者是雄豬肚

一個去淨內垢老絲瓜筋半條土狗子又名螺蛸十個小黑公牛糞一泡紫背浮萍一兩以上各藥共裝肚內以蘇線縫好放新砂鍋內加水用桑柴火煮爛去淨浮油煮好去藥將肚溫水洗盡竹刀切片

仍入原湯中再加赤茯苓皮大腹皮生薑皮廣陳皮生桑白皮各三錢甘遂麝香煨綿大戟麝香煨羌
花各二錢醋炒用文武火再熬數滾原汁約有一大碗將藥去淨豬肚與汁分作二次或三次服下聽
其自利其水由大小便出其盡立消服此之日務須照法嚴忌鹽醬一百二十天為要每日用真秋石可
代鹽此治水蠱第一神方不可輕忽 ○水蠱小便不通小便通者亦可治 大田螺四個去殼大蒜
五個去皮車前子三錢研末共為餅貼臍中以帶縛定水從小便出漸消終身戒食田螺 又方商陸
根葱白搗填臍中小便利腫自消 ○日滿開鹽法 鯽魚二斤食鹽三斤用黃泥包用白炭火煨一

週時去泥將魚同鹽研細用此鹽用完再食生鹽方保週身經絡堅固永不復發 ○治氣蠱法按之
隨手即起者是 雄豬肚一個去臟內裝大癩蝦蟆一個大砂仁一兩研老絲瓜筋半條破爛敗鼓皮

手大一塊紫背浮萍一兩炙焦以麻線縫好入新砂鍋內加水用桑柴火煮爛去淨浮油照治水蠱素

法煮好去藥將肚洗盡竹刀切片仍入原湯中再加真紫油厚朴台烏藥各五錢雞心檳榔大腹皮真沉

香枳殼醋炒各三錢羌花醋炒綿大戟麝香煨上梅片研細甘遂麝香煨各二錢用文武火再熬數滾

原汁約有一大碗將藥去淨豬肚與湯分作二三次服沉香梅片二味不宜見火臨服時和肚內食

之服後以大使下白沫為驗其蠱即消嚴禁鹽醬一百二十天日滿開鹽亦照前方服之此治氣蠱第

一神方不可輕忽 又方雞內金一副沉香砂仁各三錢陳香櫟五錢去核共為末每服一錢五分薑

湯下神效 又方大癩蝦蟆一個砂仁不拘多少為末將砂仁裝蟬內令滿縫口黃泥封固炭火煨紅

取出候冷將蟬研末作三服陳皮香附湯送下若於五月五日製備更效並治小兒疳疾亦靈 又方

蘿蔔子一名菜服子二兩研末再以生蘿蔔搗爛和子絞取汁將砂仁二兩浸汁內一宿撈起晒乾再

浸再晒七次為度每服一錢為末米飲調下神效 又方薑汁炒遠志五錢水煎服下氣通即愈 ○

治血蠱法週身老黑色皮內有紫黑斑點者是雄豬肚一個去臟蕒草一兩雄雞屎四兩炒焦紫背

浮萍一兩老絲瓜筋半條各藥共裝肚內用麻線縫好照前水蠱煮法煮好去藥將肚切片仍入原湯

再加螞蝗燒枯存性乾漆三錢煨令煙盡炒蟲虫查藥物備要便知真花蕊石研真血竭各三錢紅花

降香各五錢甘遂麝包裏煨綿大戟麝包裏煨花醋炒各二錢照前文武火煮好去藥食肚與湯分作

二三次服服後以大使下黑水數次為驗其蠱自消嚴禁鹽醬一百二十天滿日開鹽亦照前方服之

此治血蠱第一神方不可輕忽方內螞蝗必不可少俟病愈後照服螞蝗法解之見解救諸毒門○

各積鼓脹 輕粉二錢巴豆四錢去殼衣研去油七次生硫黃一錢共研成餅先以新綿一片敷臍上

次以藥餅當臍按之外用布抵緊如人行五六里自瀉下候三五度除去藥餅以溫粥食之久患者隔

日方去藥餅愈後忌飲涼水此方治水蠱如神其餘蠱脹功力稍緩又方凡水鼓氣鼓多食野水鴨

最妙又方取蓋屋稻草煎湯傾入盆內先坐盆上薰之待湯溫方洗其腹小便隨下黃水薰洗數次

永不再發又方西瓜一個切去頂若是滿攪挖去穰三成以蒜糊填滿將原頂蓋上放新砂鍋內再

用新砂鍋合上蒸熟瓜蒜與湯作二三次食盡全消不忌鹽醬又方蘿蔔一枚週圍鑽七孔入巴豆

七粒入土種之待其結子取子又種待蘿蔔成仍鑽七孔入巴豆七粒再種如此三次至第四次將開

花時連根拔起陰乾收盡磁器內遇蠱脹者取一枚搥碎煎湯食之重者二枚立愈有心人宜預種之

○食物積滯腹脹如鼓○方見解救諸毒門食犬馬肉腹脹方內○肚腹脹滿飲食如常乃濕熱

生虫之象照虫疾各方治之○十種水腫一清水先從左右肋腫起根在肝大戟為君二赤水先

從古根腫起根在心葶藶子為君三黃水從腰腹腫起根在脾甘遂炒為君四白水從腳腫起根在肺

桑白皮為君五黑水從腎囊腫起根在腎連翹為君六玄水從面腫起根在外腎羌花醋炒為君七風水從

桑白皮為君五黑水從腎囊腫起根在腎連翹為君六玄水從面腫起根在外腎羌花醋炒為君七風水從

四肢腫起根在骨澤瀉為君八石水從腎腫起根在膀胱藁本為君九膏水從小腹腫起根在小腸巴豆去油皮為君十氣水或盛或衰起根在腹紅飯豈為君右十般腫病各有根源看十種病根除將君藥加倍用餘九味即以上各藥等分研末蜜丸梧子大用赤茯苓煎湯吞三丸不拘時每日三丸愈後再用肉桂乾姜肉苳蔻赤茯苓羌活醋煮川芎桔梗各等分為末每服三錢空心開水下每日早午晚各一次百發百中極神效 又方七星魚又名柴魚加葱與冬瓜皮煮食立消 又方青頭雄鴨煮湯飲之或粥煮食之厚蓋被睡臥取汗上腫者方宜汗即愈 通身浮腫 取活癩蝦蟆一隻以巴豆七粒用紙包好納入口中用繩吊在有風無日之處陰乾剖開去紙將頭足分為五起肝腸亦分為五起配勻收入磁瓶勿使洩氣臨用取出焙枯研末沖酒服從頭吃起病從頭消從前兩足吃起病從兩手消從兩後足吃起病從兩足消或不必分開亦可輕者一二日消盡重者五日全消終身忌食蝦蟆此治浮腫秘傳第一神方也珍之寶之忌鹽醬一百二十日各種蠱脹亦可治 又方活鯉魚一條重七八兩去鱗將肚剖開去腸淨入好綠礬五分松蘿茶三錢男子用蒜八瓣婦人用蒜七瓣共入魚腹內放磁器中蒸熟令病人吃魚連茶蒜食更妙從頭吃起病從頭上消從尾上喫起即從腳上消其效無比 又方一童子年十一手足臂腿及指頭面遍身浮腫數日後漸至沉重氣喘不眠用黃皮柑子一個同甜酒釀二斤煮至將乾去柑肉核取柑連酒食之二次全愈此林屋山人經驗方也 病後浮腫 老鴨加真川厚朴二錢蒸食連食三隻即愈神效體虛者勿服 又方蝦蟆又名田雞水雞五隻或用七隻男單女雙去皮並去頭與腸雜不去肝先入碗內蒸熟再入瓦罐內加水半小碗煮融加陳酒一盃再煮先飲湯後食蝦蟆不用鹽醬連食數次必愈永戒食蝦蟆有人病後腿膝皆腫至夜更其服此而愈