

欽定四庫全書

子部

小兒衛生總微論方卷五



南京中医药大学图书馆版权所有

火定白蘆全書

急得生坐微汗卷五

急得生坐微汗卷五

急得生坐微汗卷五

急得生坐微汗卷五

欲發

葛細半合依  
竹瀝法旋取  
熱取汁

研硃砂半兩  
研飛牛黃一錢

相拌得所石臼中杵三

二百下成膏圓雞頭子大每服一丸煎人參湯化下  
量大小增減用無時

琥珀丹治如前

琥珀一兩令研白僵蠶去絲嘴炒半兩臘月牛膽製天南星一兩

天麻一兩

附子半兩

香白芷半兩已上先為細末

硃砂一兩研水飛

龍腦研一錢

右拌勻煉蜜圓如雞頭子大每服一圓煎人參薄荷  
湯化下量大小增減用無時

生葛飲子治熱極不已欲發驚癇

生葛汁一竹瀝一牛黃如杏仁  
合許別研

右相和每服半合量大小與之無時

鈎藤飲子治發熱時時戴眼口吐涎沫欲發癇搐

鈎藤半兩蟬七枚去翅足微炒人參一分去蘆黃芩一大黃分

右簷末每服一大錢水一盞煎至六分入竹瀝半合再慢煎數沸下牛黃一小豆許細研入之攪勻放溫量大小與服得微汗為妙乳母忌蒜麵炙燙之物

治小兒心胸積熱毛焦睡中狂語欲發驚

朱砂半兩研水飛牛黃六分

右同研如粉每服一錢摩犀角水調服量大小與之無時

治小兒熱盛夜後狂語欲發驚以竹瀝一歲兒連夜飲二合少少頻與兒大以意加之無時

參苓散治小兒忽作驚狀目上視手足強未可服驚藥宜先與此服之

人參去蘆 茯苓去黑皮 各半兩 甘草一分 炙

右為末每服一錢溫湯調下食空服

茯神散治小兒煩熱心悸手足搖動欲發驚癇

茯神

去心內木

龍齒

研細

牛黃

別研

犀角屑

各半兩

寒水石

一兩

石膏研飛 一兩 川大黃一錢

右為麩末每服一錢水一盞煎至五分去滓入竹瀝半合更煎一兩沸量大小與服無時

又治方如前

茯神去心內木龍齒研升麻 甘草炙各半兩寒水石 石

膏研麥門冬去心

右為末每服一錢水一盞煎至五分去滓入竹瀝半合更煎一二沸量大小與服無時

辰砂金箔散治小兒心鬲邪熱神志不寧悸惕煩渴睡卧不穩弄舌齧齒痰寢欬逆咽嗌不利欲發驚癇

辰砂七錢研桔梗去蘆人參去蘆三錢白茯苓去皮三錢蛤粉

八牙硝枯三錢研甘草二錢半膾子半字金箔二片

右為細末百日已下兒用半字至一字薄荷水調膏塗舌上令自嚥百日上兒或大便澀者蜜湯調一字與服一歲上者半錢咽喉腫痛口舌生瘡者以少許摻病處噙津必效

牛黃散清心涼禹截驚癇欲發已發

牛黃半兩  
細研硃砂一分研射香一分研  
飛  
別研  
蝎稍一分天竺

黃研一分鈎藤一分

右同拌研勻每用一字新汲水調下無時

雌黃圓治眼直惡聲嚼舌吐沫欲發驚癇

雌黃一兩水飛研黃丹一兩微炒研射香一錢研

右同研細用牛乳半升熬成膏和劑圓菉豆大每服  
三圓溫水下日三如無牛乳用羊乳亦得

急風膏利胸鬲清心神截欲發已發驚癇

硃砂半兩水飛研天漿子十四個虫去壳為末研取膩粉一錢青

黛一分研乾全蝎十四枚為末

右拌研勻細入龍腦細末半錢再同研勻用軟飯劑

成膏圓皂子大每服一粒煎人參荆芥湯化下無時  
消驚膏治小兒風熱涎盛截除驚癇安鎮心神定寧搐  
搦利禹脫去壅滯

龍腦

半錢硃砂研水飛

天南星

白附子

生天麻末

蝎

稍

末半夏湯洗淨生為

水銀

結砂子各一錢

膩粉

各一錢

右同勻細用石腦油盞內重湯煮過搜和藥末為劑  
圓如黑豆大每服一二圓薄荷湯化下更量大小加  
減服無時

神效朱砂圓治小兒溫狀驚風積熱一切壅滯能化痰  
清神利萬消驚截搐

朱砂研細水飛各一連六金箔片乾蝎十个全者天麻

一分白附子

炮半夏

湯洗七次去滑焙乾

一分白僵蠶炒去殼一分

右同為細末研勻煮棗肉和如小豆大每服二圓煎

荆芥薄荷湯化下無時

剪刀股圓治小兒驚風欲發未見的証但先服一圓無

不消退用之常驗

五靈脂

去砂石

乾蝎

緊小龍腦

別研

乾蟾

淨洗去

五藏

四

足慢火炙令黃色一分

牛黃

別研細

蛇黃

火煅醋淬

七次白

殭蠶

直者去蟲嘴畢微炒用

天竺黃

別研半兩

朱砂

研一錢水飛

射香

別研半錢

## 治風癇方

蟻娘散治小兒風癇發搐

右順手研令極細糊圓櫻桃大每服一圓金銀薄荷湯以前刀股研化服之三歲下者只半圓無時

乾蟷娘三分天麻半兩防葵兩蝎稍一錢靈仙半兩微炒

天麻兩防葵兩蝎稍分歲靈仙洗焙

已上先川芷硝各一分二  
為末  
川芷硝  
天竺黃味同研細

右同拌勻為散每服一字或半錢乳香湯調下量大  
小加減與服無時

麻黃蝎稍散治如前

麻黃去根節半兩蝎稍筒十四

右將二味碎之用薄荷葉裹遍外更用紙裹了於水  
蘸濕慢火中煨紙及葉乾透取出為末每服半錢金

銀薄荷湯調下無時

芎犀散治風癇多困不省

川芎 犀角屑

獨活去蘆各半兩

蝎稍

人參

去蘆天

麻各半兩

右為細末每服半錢溫酒調下無時

葱湯圓治風癇發搐疾感壅熱

天南星

炮裂為末抄一錢

蝎稍

一分微炒半夏一分湯洗七次

寒水石

煅熟為末

朱砂

半錢水飛

殭蠶

炒去絲嘴一分

右為細末麵糊圓菉豆大燒葱白泡湯送下三五  
圓量大小加減無時

人參化風膏治風癇發搐涕欬無時

天麻一兩酒浸全蝎十四個殭蠶去蟲嘴微炒人參去蘆川芎

白附子各半兩羌活去蘆獨活去蘆防風去蘆并叉枝各一分

右為細末煉蜜圓如皂子大每服一圓荆芥湯化下  
量大小與之無時

治小兒風癇

以鼈甲去裙襡炙黃杵末每服一錢乳汁調服之或  
以蜜和圓如小豆大服之亦可無時

雞蘇散治小兒風癇

雞蘇 木賊 荆芥

右各等分為細末以茶清調下半錢或一字無時

皂莢煎圓治如前

肥嫩不艸皂角

十鉗去皮稜以水二大碗按汁號至渾無味將汁熬成膏別頓

號

丹

不拘多少於熨斗內簇熟炭火煅至炭過吹去其灰

右研號丹為細末量其所用入皂莢膏和劑圓菉豆  
大每服五七圓溫湯送下乳食前

榴梅散治如前

以大石榴一枚割頂去子剝作甕入全蝎五个在內  
却以頂蓋之紙筋搘黃泥封裹了先用微火炙乾漸  
加大火煅通赤良久去火放冷去泥取其中焦者細  
研為散每服半錢乳調下搐者服之便定不會服者  
灌之兒稍大用防風湯調下無時