

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷七十



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

薛氏醫案

不

痘疹發於命門或至天

明 薛己 訂

血穢伏於命門或至天

陽因而發之狀類傷寒

煩悶乍涼乍熱咳嗽嚏

噴足稍冷耳冷尻冷多睡睡驚耳後有紅絲赤脉此其
候也五臟各具一証肝藏水疱肺藏膿疱心藏斑脾藏
疹歸腎變黑蓋以太陽起於右腎之下煎熒左腎足太
陽膀胱寒水夾脊上流上頭下額逆手太陽丙火不得
傳道逆於面上故顯是諸症蓋壬癸寒水尅丙丁熱火
故也凡瘡疹初起一發便出盡者必重瘡夾疹者半輕
半重稀少者輕裏外微紅者輕外黑裏赤者微重外白
裏黑者大重瘡端裏黑點如針孔者勢劇也青乾紫陷

睡昏汗出不止煩躁熱渴腹脹啼喘大小便不通者困也

痘疹正狀

痘瘡正病蒸熱一日稍涼現癰一日至三日足心齊漸大如珠結成膿窠飽滿漸至蒼蠟色自初紅癰為始計七日當成靨結痂此則言其大略也人有虛實之不同病有淺深之各異脾胃充實血氣調和皆依期而愈若調治失宜虧損脾胃或寒暄失度必致遷延大抵形勢既正而無他症不必用藥此先哲之格言也鄭氏云凡

瘡痘欲出先發熱輕者三日次五日遠者不過七日此約法也一日太陽傳膀胱二日陽明傳胃三日少陽傳膽四日太陰傳脾五日太陰傳腎六日厥陰傳肝七日還經五臟六腑傳遍故七日而止也又有因傷寒至七日以後或已汗或未汗或吐下後熱不除此毒氣盛而未發熱毒入胃發於皮膚成斑者狀如蚊蟲所嚙赤者十生一死黑者十死一生及有胃熱發黃者狀如橘色下利者死又有成隱疹者或白泡者此皆傷寒熱毒不

除多變此疾故發癰不可用表汗藥也

痘瘡輕重

輕者作兩三次出大小不等頭面稀少胸前眼中皆無根窠紅活肥滿光澤形似水珠不渴瀉不煩躁○重者一齊出密如蠶種頂陷如茱萸樣或平頭灰白色渴瀉煩躁頭溫足冷身熱不除治之如法十全八九

輕變重所犯者七

不忌口味不慎飲食致傷脾胃○先曾泄瀉裏虛毒氣

不能發出○冒風寒所謂春夏之氣為順秋冬之氣為逆大忌感冒風寒損表○犯房室○餌涼藥宜用滋補血氣壯脾之藥不宜清涼宣利之劑裏寒則毒氣不能攻出○穢氣相觸血氣聞香則順聞臭則逆順則易出易靨逆則難愈○生人輒至恐外人由生產房室或臨喪而來或帶醉或食腥氣因此穢惡之觸皆為害也

重變輕所慎者五

謹避風寒及房內有風亦宜避之惟夏不忌如遇狂風

輒寒亦宜避之。○常和煖寒則添衣熱則減去務得中和毋令太過不及。○節飲食忌柿橘西瓜菱角水蜜等冷物恐內傷胃氣尤忌肥肉油膩恐泄瀉忌鹹物恐作渴忌酒葱蒜魚羊等腥物恐致瘡痒務使脾胃充實其瘡易出易靨也。○大便稠飲食調和不致泄瀉一日二日一次為調日行二三次為利三四日不行為秘。○依方調理避風寒節飲食詳症用藥庶不致輕變為重矣

不治五症

咳嗽聲啞飲食挫喉○腹脹氣促悶亂不寧○渴瀉不止
咬牙寒戰○瘡嫩易破痒塌不止○紫黑灰色頂陷
喘渴

紅日一

一日先退熱放標者必輕又放標後一日身

癍

涼稀密已定仍熱煩躁尚未盡有兩三次出

標

熱方定紅現者吉或隱或現者凶

現日二

二日如粟米大稀而紅滿者吉二日頂陷灰

之

白色者次之

圖

三日

三日尖滿如珠者吉灰白色者次之

瘡

初發

三日必出定已後身反發熱悶亂煩渴者凶
有兩三次出大小不一等先出者先灌漿後

綻

如珠

出者後灌漿如水珠光澤根窠紅活者吉不

灌

根活

渴瀉悶煩者不必服藥微渴微痒不瀉者不

膿

妨亦不須服藥若一齊並出稠密灰白色頂

之

陷煩躁渴瀉者急宜治之

圖

收靨

倒

○

④

已

④

之圖

陷

○

④

○

靨

④

④

④

瘡已飽滿如膿窠將收漸至蒼蠟色有等無膿有黃
白色自放標一日為始至七日收靨至十日收完此
為正病有遷延八九日方靨至十四五日方完亦有
之但不瀉渴悶亂其瘡飽滿無陷手按之堅硬皆好
將收時漸退紅腫或瘡中收靨覺有黃蠟色或外面
先靨根下皺皮男從面收至頭背女從面收至胸腹

收後離肉不粘易脫俱好有微渴痒痛有身收完足
收遲亦不妨身微熱不能食者亦有之只怕瘡嫩易
破悶亂痒塌者凶

靨 瘡疹收靨之後預宜調理就有出外不避風寒
不節飲食偏無病者莫非胃實體壯亦宜仔細
後 病初痊臟腑初安脾胃尚弱動止飲食過度復
餘 病喘咳腹脹必凶又血氣尚弱動止太早病復
皆凶况肌肉嬌嫩冒風易得感寒頭痛身熱則

症則難治矣

腹脹氣促根窠不赤之症

陳文宿先生云痘瘡已出未愈之間或瀉渴腹脹氣促其瘡不光澤不起發根窠不紅謂之表虛也先與十一味木香散以和五臟之氣後與十二味異功散送七味肉豆蔻丸以助臟腑之氣竊謂痘瘡既出不光澤不起發不紅活或泄瀉作渴或肚腹作脹或氣促作喘寒戰咬牙或手足指冷肢體攣縮作渴飲湯陽氣虧損內虛

寒而外假熱也用十二味異功散若作渴飲湯手足不冷者脾胃虛弱也用五味異功散凡痘瘡先出不如式後出而紅活或成片色赤而穢氣者俱無妨

一小兒出痘四日腹脹瀉渴脾胃虛寒也用十二味異功散一劑又用參芪內托散貫膿靨而忽寒熱咬牙此膿貫而陽氣虧損也用參附湯獨參湯而愈

一小兒痘四日腹脹瀉渴氣促體倦此脾氣虛也用人參白朮散加木香煎送四神丸一服諸症頓止但膿遲

作渴此表裏血氣俱虛用參芪四聖散大補湯而愈

一小兒痘瘡作渴腹脹小便不利此邪氣壅滯也用木通芍藥湯一劑諸症稍愈用參芪四聖散其漿漸貫用參芪內托散結靨而愈

一小兒痘瘡將愈腹脹手足或冷或熱此陽氣虛寒也先用十二味異功散手足不冷此陽氣漸復也乃用五味異功散加木香而愈

一小兒痘瘡大便利而小便秘腹脹作喘手足並冷此

脾氣虛也先用葶藶木香散一劑又用五味異功散加木香二劑而愈後腹脹不食口角流涎仍用五味異功散而痊

一小兒痘瘡將愈忽腹脹泄瀉侵晨為甚飲食不化余謂脾腎虛弱朝用人參白朮散夕用二神丸而瀉止又用參芪內托散兼托裡散而靨

一小兒痘瘡腹脹泄瀉飲食不化此脾腎氣虛用人參白朮散豆蔻丸而愈