

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百八十六



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

普濟方卷

目錄

周王朱橚撰

普濟方

普濟方

主表氣行經絡而浮
調則六腑不和榮衛虛
經絡為寒所折則榮衛

科晉方脈崇者止也從者通也榮血得寒則澀而不行

衛氣從之與寒相搏亦壅遏而不通氣者陽也陽氣蘊
積則生於熱寒熱久不散故積聚成癰腑者陽氣浮行
主表故癰浮淺皮薄以澤久則熱勝於寒熱氣蘊結傷
肉而敗肌故血肉壞化而為膿其患則表浮淺則骨髓
不焦枯腑臟不傷敗故可治而愈也 五常政大論云

天不足西北左寒而右涼地不滿東南右熱而左溫高
者氣寒下者氣熱故寒涼者脹溫熱者瘡下之則脹已
汗之則瘡已夫東南二方在人則為丙小腸熱甲胆風

小腸與胆皆居其下其性炎上其瘡外有六經之形證
內無便溺之阻隔飲食如故清便自調知不在裏非疽
瘡也止癰癰也小則為癰大則為癰其初所受於下風
濕之地氣自外而來侵加於身者也經云營氣不從逆
於肉理乃生癰腫病機云諸痛痒瘡瘍皆屬心火此瘡
自外而入是丙小腸左遷入於胆作痛而痒也此二方
皆主血血為病必痛此元氣不足營氣逆行其初出未
有傳變在於肌內之上皮毛之間只於風熱六經所行

經絡地分出矣宜瀉其風濕熱醫者只知陰復其陽則
宜汗也此宜發汗者乃濕熱鬱其手足少陽致血脉凝
逆使營氣周身元氣消弱也其風熱鬱滯於下其面色
赫赤面腫微黯東方青理沒之色也風木之性上衝顏
必忿色其人多怒而瘡之色亦赤赫腫硬微帶黯色其
瘡之形勢亦奮然高起結硬而作痛也其肺只在左手
屬表左寸外洪緩左關洪緩而弦是客邪在血脉之上
皮膚之間宜急發其汗而通其榮衛則邪去矣以內托

榮衛湯發之

瘡瘍者火之屬須分內外治其本若其脉沈實當先疏其內以絕其源也其脉浮大當先托裏恐邪氣入內也有內外之中者邪氣至盛遏絕經絡故發癰腫此因失托裏及失疏通又失和榮衛也治瘡之法大要須明托裏疏通行榮衛之三法內之外者其脉沈實發熱燥煩外無焮赤痛深於內其邪氣深矣故先疏通臟腑以絕其源外之內者其脉浮數焮腫在外形証外顯邪氣恐

極而內攻故先托裏也內外之中者外無熅惡之氣內亦臟腑宣通知其在經當和榮衛也用此三法之後雖未瘥必無變證亦可使邪氣峻減而易愈 脉數身無熱即內有癰諸浮數脉當發熱而反洗洗惡寒若有痛處當結為癰脉微而遲必發熱脉弱而數此為振寒當發癰腫脉浮而數身體無熱其形默默胃中微燥不知痛處其人當發癰腫脉滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛榮衛相逢即結為癰熱之所過即為

癰膿身體有痛處時時苦有瘡 凡癰發腫高者疔源
淺腫下者疔源深大者易療小熱者難療初便大痛傷
肌晚乃大痛傷骨都堅者未有膿半堅半軟者有膿發
腫都軟者血瘤也非癰發腫以漸知長引日月亦不熱
時時牽痛瘤也非癰諸氣結亦有腫久久不消成癰療
之宜散氣氣已散若初腫處有浮氣年衰皆發癰療之
宜及年盛并折散熱可無此憂

發癰堅如石走皮中無根癰癰也久不消因得他熱之

疾時有發為癰也

無虛勞腹中之疾或發血瘤瘡狀墳切父吻起頭正盤直

不當灸療療之火熨便焦爛剝刮去焦痂則血泄不

可禁必死 凡癰無問大小已覺即取膠如手掌大暖

水浸令軟納納然稱大小當頭上一孔如錢孔大貼腫

上令相當湏臾乾急若未有膿者即定不長已作膿者

當自出若以鋒針當孔上刺至膿大好至瘡乃去其膠

凡癰高而光大者不大熱其肉正平無尖而紫者不湏

攻之但以竹葉黃耆湯申其氣耳肉正平為無膿也癰
卒痛以八味黃耆散傳之大癰七日小癰五日其自有
堅彊者寧生破法乳若熱手不可得近者先內服王不
留行散外摩發背膏若背生破無若在乳宜令極熟候
手按之隨手即起者瘡熟也須針之針法要得著膿以
意消息胸背不過一寸斟量不得膿即與食肉膏散著
允頭內癰口中如體身熱歇即服木占斯散五日後癰
欲著痂者即服排膿內塞散 凡癰破之後便綿愒欲

死內寒外熱腫自有似癰而非者當以手按腫上無所連乃是風毒勿針之宜服升麻湯外摩膏破癰口當令上留三分近下一分針之務令極熟熟便不痛破後敗壞不差者作豬蹄湯洗之二日一度夏用一日又口用六七日用湯半劑亦可夫癰壞後有惡肉者宜豬蹄洗去穢次傅食肉膏散惡肉盡後傅生肉膏散及摩四邊令好肉速生當斷絕房室忌風冷勿自勞煩待筋脉平復乃可任意耳緣新肉易傷傷則裏潰潰則裏發發則

難救慎之慎之白痴最忌

治癰久瘡口不合其肉白而膿血少此為瘡口冷滯乃病

人氣血枯竭不潮於瘡遂致如是合用此艾葉一把入瓦器內濃煎湯避風處乘熱用艾湯澆洗瘡口四圍淨肉以絹帛兜艾葉乘熱澆沃一日一次洗了須避風仍燒松香以烟薰瘡口良久用神異膏貼之其瘡勿令厭穢之人見若不能禁忌瘡口難安藥亦無效

方

五黃丸

出千金方

治虛勞客熱數發癰腫瘡癰

熟地黄

四兩

黃耆

黃芩

大黃

黃連

澤瀉

細辛

各三兩

甘草

桂心

芍藥

茯苓

乾漆

各二兩

兩
人參一兩天門冬五兩

右為末蜜和丸如梧桐子大酒服十九日三夜一加

至二十丸久服終身不發癰疽凡方中用大黃薄切

五升米下蒸熟曝乾用之熱多倍大黃一方無澤瀉

玄參散

出聖惠方

治癰腫始發熱毒氣盛寒熱心煩四肢

痛疼

玄參

半兩

甘草

半兩

麥門冬

三分

前胡

去蘆

枳實

炒

麩

微
人參

去蘆

赤芍藥

生乾地黃

黃耆

芎藭

赤茯苓·黃芩各一兩石膏二兩

右為散每服四錢水一中盞入竹葉二七片小麥一

百粒煎六分去滓不計時候溫服

黃耆散出聖惠方治癰腫熱氣大盛寒熱進退

黃耆剉川升麻 川大黃剉碎黃芩 遠志去心

赤茯苓 赤芍藥各一兩生乾地黄二兩當歸半兩麥門

冬一兩半人參半兩甘草半兩

去心

蘆頭

生剉

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時

溫服之

生地黄散

出聖惠方

治發癰腫熱腫疼痛心神煩悶

生乾地黄

二兩

玄參

二兩

甘草

生剉

赤芍藥

黃耆

剉

木

通

剉

黃芩

當歸

剉微炒

地骨皮

各一兩

赤茯苓

半

川升麻

一兩

川大黃

一兩

剉微炒

右為散每服四錢水一中盞入竹葉二七片煎至六

分去滓不計時候溫服

蛇啣膏

出肘後方

療癰腫瘀血產後血積耳目暗等牛領

馬鞍瘡

蛇啣

大黃

附子

去黑皮

芍藥

當歸

細辛

黃芩

大戟

枳

去目莽草

獨活

各一兩

薤白

十四莖

右切以苦酒淹一宿以不中成鍊猪膏二升龍銜藤

一兩合膏煎名龍銜膏今又有龍草似蛇銜而葉大

耳亦有取其根合煎者亦名龍銜膏肘後方云於七

星火上各熬絞去滓溫酒服如彈丸一枚日再病在

外摩傳之耳以綿裹塞之目病如黍米注皆中一方