

# 欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百六十六



南京中醫藥大學圖書館版權所有



周王朱橚撰

和氣散

和氣散

和三焦痞悶因飲水過  
兩脇虛脹欲唾引脇下

桂心散

出聖惠方

治懸飲心腹痞滿水走腸肋兩脇引痛

桂心

一兩

旋覆花

半兩

白朮

半兩

細辛

半兩

半夏

半兩湯洗七遍去滑

桔梗

半兩去蘆頭

赤茯苓

半兩

一方有芍藥無茯苓

澤瀉

半兩

附子

半兩炮裂去皮臍

枳殼

半兩麩炒微黃去穰

前胡

半兩去蘆頭

右為散每服四錢以水一盞入生薑半分煎至六分

去滓每於食前溫服

前胡散

出聖惠方

治懸飲腹脇痞急宿食不化心胃滿悶

前胡

一兩去蘆頭

半夏

一兩洗七遍去滑

桂心

一兩

人參

一兩去蘆頭

訶梨勒皮

一兩

白朮

一兩

檳榔

一兩

枳殼

一兩麤炒微黃去穰

甘草

半合炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓稍熱服日三四服

厚朴散

出聖惠方

治懸飲心腹氣滯兩脇多疼

厚朴

去麤皮一兩塗生薑汁炙令香熟

川大黃

一兩剉碎微黃

桂心

半兩

枳殼

三分麤炒微黃去穰

檳榔

三分

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓溫服

日三四服

旋覆花方

出聖惠方

治懸飲腹滿脇痛

旋覆花

一兩

皂角

三挺去黑皮塗酥炙令黃去子

草豆蔻

一兩

去皮

杏仁

一兩湯浸去皮尖雙仁麤炒微黃

枳殼

半兩炒

微黃去穢

川大黃

一兩剉碎微炒

右為末煉蜜和丸如桐子每於食前生薑湯下二十

丸

治懸飲心腹氣滿兩脇多痛

出聖  
惠方

半夏

三兩搗  
為末

木香

二兩

旋覆花

一兩

檳榔

三兩

皂角

三兩去黑皮塗酥炙令黃焦去子皮搗碎以酒一升揉取汁去滓煎成膏將半夏末以膏

和作餅子以青蒿蓋出青衣如造麴法搗羅為末

右為末以酒煮麴糊為丸如梧桐子大每於食前以

生薑湯下二十九

小枳殼丸

出聖  
惠方

治胃不和宿寒留飲心腹痞滿脇肋

刺痛嘔逆痰水不思飲食

枳殼

四兩炒  
去穢

半夏

三兩湯洗  
去滑

白朮

三兩

赤茯苓

二兩

去皮

乾薑

二兩炒

右為細末麴糊為丸如梧桐子大每服三十丸食後

生薑湯下

治懸飲腹滿脇痛

出聖  
惠方

郁李仁

三兩湯洗  
去皮微炒

半夏

一兩湯洗  
七遍去滑

草豆蔻

一兩  
去皮

右為末以酒煮麴糊和丸如桐子大食前生薑湯下

二十丸

又方

出聖惠方

牽牛子

二兩炒

皂角子仁

二兩微炒

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每於食前以生薑湯下十五丸以取下痰滯為度

溢飲

附論

溢飲謂因大渴而暴飲水水氣溢於腹胃之外在於皮膚之間故言溢飲令人身體疼重而多汗是其候也



方

半夏散

出聖惠方

治溢飲胸膈痰壅頭痛嘔逆不下飲食

半夏

一兩湯洗七遍去滑

赤茯苓

三分

白朮

二分

桔梗

三分去蘆頭

枳殼

二分麴炒微黃去穰

前胡

三分去蘆

頭

人參

半兩去蘆

甘草

半兩炙微赤剉

防風

半兩去蘆

頭

大腹皮

半兩剉

麥門冬

三分去心

枇杷葉

半兩

拭去毛炙微黃

右為散每服五錢以水一盞生薑半分煎至五分去

滓不計時候溫服

治溢飲在胃間不散上衝攻於頭面不能食飲宜服此

方

出聖  
惠方

白朮

三分

木香

半兩

赤茯苓

半兩

人參

半兩

前胡

半兩去  
蘆頭

半夏

一兩湯洗  
七遍去滑

肉桂

半兩  
去皴

皮

青橘皮

半兩湯浸  
去白穰焙

芎藭

三分

附子

一兩炮製  
去皮臍

大腹皮

半兩  
剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

白朮散

出聖惠方

治溢飲當發其汗

白朮

三分

麻黃

一兩去節根

赤芍藥

三分

旋復花

兩半

桂心

一兩

前胡

三分去蘆頭

甘草

三分炙微赤判

五味子

二分

半夏

三分湯洗七遍去滑

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候熱服衣蓋取汗如人行十里未汗

再服



小青龍湯出仁存方

治溢飲倚息不得卧及喘滿者見方

咳嗽門咳嗽  
不得卧類

大青龍湯出三因方

治溢飲者當發其汗并身體疼重汗

不出拘急痛

麻黃六兩去節

桂心二兩

甘草一兩炙

生薑三兩

石膏一枚如雞子大

杏仁四十枚去皮尖雙仁

大棗十枚擘

右呖咀以水九升先煮麻黃減二升乃同諸藥煮取

二升絞去滓適寒溫服一升溫覆令汗汗出多者溫

粉粉之一服汗出者勿再服汗出多亡陽逆虛惡風煩躁不得眠脉微弱汗出惡風不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也忌海藻松菜生葱

又方 出聖惠方

治溢飲當發其汗

麻黃

一兩去根節

桂心

一兩

甘草

半兩炙微赤剉

細辛

半兩

石膏

一兩

杏仁

半兩湯洗去皮尖雙仁炒微黃

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候熱服衣蓋取汗如人行十

里未汗即再服

治溢飲上衝頭旋目眩氣喘腹脇虛脹宜服此方

旋覆花

半兩

牽牛子

半兩微炒

杏仁

半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為末煉蜜為丸如桐子大不拘時候生薑湯下二

十九

支飲

附論

水飲停積胃膈不能消化支乘於心故名支飲其狀令人心下築悸欬逆喘息飲食不下身體虛浮形如腫是

也

方

大半夏丸 治支飲膈腕不利咳嗽喘滿

半夏

四兩湯洗七遍去滑焙乾為末

沉香

半兩

青橘皮

半兩

湯浸去白焙

乾薑

半兩炮

白朮

半兩

陳橘

半兩湯浸

去白焙

附子

半兩炮裂去皮臍

肉豆蔻

半兩

去殼

紅豆蔻

半兩

青州棗

二兩別煮取肉同薑蜜入銀石

器與半夏末和熬



右為末與半夏膏和勻九如梧桐子大每服十九空

心煎乾薑棗湯下加至十五九

旋復花湯 治支飲胃膈實痞呼吸短氣

旋復花

一兩

檳榔

一兩

芫胡

一兩 去苗

桔梗

一兩 炒

桑根白皮

一兩 半

鼈甲

一兩半 去裙襴醋炙

大黃

一兩半 剉炒

甘草

半兩 炙

右判如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓

溫服不拘時候

乾棗湯

出十金方

治腫及支飲滿癖

大棗

十枚

大戟

一兩

大黃

一兩

黃芩

一兩

甘草

一兩

甘遂

一兩

芫花

半兩

薤花

半兩

右呔咀以水五升煮取一升六合分四服以快下為

度

旋復花丸

出聖惠方

治支飲心胃壅滯喘息短氣皮膚如

腫

旋復花

一兩

漢防己

一兩

赤茯苓

一兩

桂心

一兩