

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷四十三



北京中醫藥大學圖書館版權所屬

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

備急千金要方卷四十三

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

小腸腑方

小腸腑脈論第一

論曰小腸腑者主心也舌是其候也心合於小腸小腸

者成之腑也號監倉吏重一斤十四兩長二丈四尺

廣二寸四分小腸經八分十分之少半也後附脊左回

欽定四庫全書

備急千金要方

疊積其注於回腸者外傳臍上回運環反十六曲常留

水穀二斗四升其一斗二升是水一斗二升是穀應主

二十四氣也

難經云十六曲盛穀二斗四升水六升三合合之大半甲乙云受三斗三合合之大

半脣厚人中長以候小腸小腸病者小腹痛腰脊控羣

而痛時窘之復耳前熱若寒甚獨肩上熱及手小指次

指之間熱若脉滑者

脉經作陷甲乙亦同

此其候也

小腹控羣引腰脊上衝心邪在小腸者連羣系屬於脊

貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃動肝肺散於育

結於臍故取之育原以散之刺太陰以與之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之

左手關前寸口陽絕者無小腸脉也苦臍痺小腹中有疝瘕王月即冷上搶心刺手心主治陰心主在掌後橫文中入一分

左手關前寸口陽實者小腸實也苦心下急熱痺小腸內熱小便赤黃刺手太陽治陽手太陽在手小指外側本節陷中

小腸有寒其心下重便膿血有熱必痔

小腸有宿食常暮發熱明日復止

小腸脹者小腹膜脹引腹痛

心前受病移於小腸心欬不已則氣與欬俱出

厥氣客於小腸夢聚邑街衢

心應皮皮厚者脉厚脉厚者小腸厚皮薄者脉薄脉薄者小腸薄皮緩者脉緩脉緩者小腸大而長皮薄而脉冲小者小腸小而短諸陽經脉皆多紆屈者小腸結

扁鵲云手少陰與太陽為表裏所以表清裏濁清實濁
虛故食下腸實而胃虛故腑實而不滿實則傷熱熱則
口張口為之生瘡虛則傷寒寒則便泄膿血或發裏水
其根在小腸先從腹起方見治水篇中

小腸絕不治六日死何以知之髮直如乾麻不得屈伸
白汗不止

手太陽之脉是動則嗌痛頷腫不可以顧肩似拔臑似
折是主液所生病者耳聾目黃頰頷腫頸肩臑肘臂外

後廉痛

經脉支別已見心臟部中

小腸虛實第二

脉方灸法

小腸實熱

左手寸口人迎以前脉陽實者手太陽經也病苦身熱來去汗不出心中煩滿身重口中生瘡名曰小腸實熱也

柴胡澤瀉湯治小腸熱脹口瘡方

柴胡

澤瀉

橘皮

一用桔梗

黃芩

旋復花

枳實

升麻

芒硝各三兩

生地黃

切一升

右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓下芒硝分三

服

大黃圓治小腸熱結滿不通方

大黃

芍藥

葶藶各二兩

大戟

朴硝

各三兩

杏仁

五十枚

巴豆

七枚

右七味為末蜜和丸如梧子大飲服大人七丸小兒

二三九日二熱去日一服

灸法

小腸熱滿灸陰都隨年壯穴俠中管兩邊相去一寸是也

小腸泄痢膿血灸魂舍一百壯小兒減之穴在俠臍兩邊相去各一寸

翼云相去一寸

又灸小腸輸七壯

小腸虛寒

左手寸口人迎以前脉陽虛者手太陽經也病苦顙際

偏頭痛耳頰痛名曰小腸虛寒也

治小腸虛寒痛下赤白腸滑腸中懊懣補之方

乾薑

三兩

當歸

黃蘗

地榆

各四兩

黃連

阿膠

各二兩

石榴皮

三枚

右七味㕮咀以水七升煮取二升五合去滓下膠煮
取膠烱盡分三服

舌論第三

論曰凡舌者心主小腸之候也舌重十兩長七寸廣二

寸半善用機衡能調五味也凡有所啖若多食鹹則舌
脉凝而變色多食苦則舌皮槁而外毛焦枯多食辛則
舌筋急而爪枯乾多食酸則舌肉肥而脣揭多食甘則
舌根痛而外髮落又曰心欲苦肺欲辛肝欲酸脾欲甘
腎欲鹹此五味內合五臟之氣也若臟熱則舌生瘡引
脣揭赤若腑寒則舌本縮口噤脣青寒宜補之熱宜瀉
之不寒不熱依臟腑調之舌縮口噤脣青升麻煎主之
方見別卷

風眩第四

叙論方
灸禁法

前卷既有頭面風方風眩不當分出思邈蓋以此是
徐嗣伯方不可以餘方相雜故此特立風眩方條專
出徐氏方焉

徐嗣伯曰余少承家業頗習經方名醫要治備聞之矣
自謂風眩多途諸家未能必驗至於此術鄙意偏所究
也少來用之百無遺策今年將衰暮恐奄忽不追故顯
明證論以貽於後云爾

夫風眩之病起於心氣不定胃上蓄實故有高風面熱之所為也痰熱相感而動風風心相亂則悶瞀故謂之風眩大人曰癰小兒則為癰其實則一此方療治萬無不愈但恐證候不審或至差違大都忌食十二屬肉而責脈為患發多氣急氣急則死不可救故此一湯是輕重之宜勿因此便謂非患所治風眩湯散丸煎凡有十方凡人初發宜急與續命湯也困急時但度灸穴便火針針之無不瘥者初得針竟便灸最良灸法次列於後

余業之以來三十餘年所救活者數十百人無不瘥矣
後人能曉此方幸勿參以餘術焉

續命湯治風眩發則煩悶無知口沫出四體角弓目反
上口噤不得言方

竹瀝

一升
二合

生地黄汁

一升

龍齒

四兩

防風

麻黃

各四兩

防己

三兩

附子

三分

石膏

七兩

桂心

二兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服有氣加附

子作一兩紫蘇子五合橘皮半兩已服續命湯口開
四肢尚未好定而心中尚不除者紫石湯主之方見
後紫石煮散是也

賁豚湯治氣奔急欲絕方

吳茱萸升一

石膏

人參

半夏

芎藭

各三分

桂心

芍藥

生薑

各四分

生葛根

茯苓

各十分

當歸

兩四

李根皮

斤一

右十二味㕮咀以水七升清酒八升煮取三升分三

服

防已地黃湯治言語狂錯眼目霍霍或言見鬼精神昏

亂方

防已

甘草

各二兩

桂心

防風

各三兩

生地黃

五斤別切勿合藥漬疾小輕用二斤

右五味㕮咀以水一升漬一宿絞汁著一面取滓著

竹簣上以地黃著藥滓上於五斗米下蒸之以銅器

盛取汁飯熟以向前藥汁合絞取之分再服