

欽定四庫全書

子部

本草乘雅半偈卷七



南京中医药大学图书馆版权所有

本草乘雅半偈

問世寶

明 盧之頤 撰

遂

蘆

及枯草

青箱

瓜蒂

羊蹄

藜蘆

射干

扁蓄

雷丸

郁李仁

棟實

蜀椒

皂角

夜明砂

豬懸蹄

豚卵

神農食經

茗

本經下品

商陸氣味辛平有毒主水腫疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精
物

穀曰出咸陽山谷所在亦有春生苗高三四尺莖青
赤極柔脆枝枝相值葉葉相當葉如牛舌而長夏秋
白花作朶亦有赤花者赤者根赤白者根白白者入
藥赤者見鬼神甚有毒也根如萊菔似人形者有神

爾雅謂之遂蕒廣雅謂之馬尾周易謂之莧陸修治
取白花之根銅刀刮去皮薄切作片東流水浸兩宿
取出以黑豆葉重重間隔入甑蒸之從午至亥俟冷
去豆葉暴乾判用無豆葉以黑豆代之

叅曰金音曰商從外知內以內知外也高平曰陸四
時日月所行之路也蓋天有四陸人有四街營衛血
氣所行之道也故主水停為腫氣痺為疝為瘕失其
常陸之唯內無外更假火力熨除癰腫之唯外無內

也若殺鬼精物以金氣適勁彫落非其類爾

本經下品

甘遂氣味苦寒有毒主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破癥堅積聚利水穀道

覈曰出中山山谷唯太山江東者良比來用京口者為勝江東者稱次矣苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮色赤肉色白作連珠狀實重者方堪入藥修治去莖槐砧上剉細用生甘草湯及薺芫自然汁攪浸三

日水如黑汁乃漉出用東流水淘六七次水清為度
取出晒乾納土器中熬脆用瓜蒂為之使惡遠志反
甘草

叅曰味大苦而名甘遂者左氏所謂請受而甘心快
意焉以甘於遂其力用也其為方也為大為急其為
劑也為通為洩甘屬中土惟其能遂土欲也故為癥
堅積聚疝瘕及留飲宿食致無能利水穀道外溢而
成大腹滿脹及面目浮腫者皆通之洩之所以從其

欲也但氣味苦寒偏於以熱為因寒則非所宜矣

本經下品

狼毒氣味辛平有大毒主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡瘡鼠癰疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸

覈曰出秦亭山谷及奉高宕昌建平諸處今陝西州郡及遼石州亦有之莖葉並似商陸及大黃莖葉之上都有白毛根皮色黃肉色白形似防葵沈重者為貴但蝮蛇喜食其根最為難得今人多以草蘭茹偽

之不可不辨大豆為之使宜醋惡麥句薑畏占斯蜜

陀僧

叅曰取狼為名者謂狼善逐也爾雅翼云狼之將遠逐食必先倒地以卜所向故獵師遇狼輒喜蓋狼之所向即獸之所在也故主殺飛鳥走獸并主水穀積聚而為欬逆上氣以及寒熱蠱毒與水穀無以轉輸皮毛致生惡瘡鼠瘻疽蝕者狼毒逐而輸之此但似狼性之貪饕非若狼腸之直而輒出也先人云非我

族類鮮不滅除不存諸有不害諸無

本經下品

葶藶氣味辛寒無毒主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅
逐邪通利水道

穀曰出藁城平澤田野間汴東陝西河北州郡亦有
之近以彭城曹州者為勝他處者不堪用也春生苗
葉高六七寸似薺根而色白枝莖俱青三月開花微
黃色遂結角列子亭亭扁小如黍粒微長而黃味苦

入頂微甘者狗薺也月令孟夏靡草死注云狗薺亭
薺之屬是也一種單莖向上葉端出角其實肥大而
短一種葉近根下作寄生如芥葉其角細長者此皆
異種不可不辨修治以糯米合置燠上微焙俟米熟
去米搗碎用榆皮為之使得酒良惡白殭蠶石龍芮
參曰水止曰亭行止曰歷史記云決河亭水而注之
海蓋以功用為名故決瀆水道誠急方之洩劑也若
氣結為癥瘕為積聚為飲食寒熱皆止固不遷決而

洩之十劑云洩可去閉葶藶之屬是矣

本經下品

桔梗氣味辛微溫有小毒主胸脇痛如刀刺腹滿腸鳴
幽幽驚恐悸氣

穀曰出嵩山山谷及冤句今在處有之二三月生苗
莖如筆管高尺餘紫赤色葉如杏及人參薺芩輩但
杏葉圓桔梗葉長人參葉兩兩相對桔梗葉三四相
對亦有不對者薺芩葉下光明滑澤無毛桔梗葉下

暗濇有毛為異夏開小花紫碧色頗似牽牛花秋後
結實根外白中黃有心味苦若無心味甜者薺芫也
關中一種莖細色青葉小似菊根黃似蜀葵根者亦
可入藥又一種木桔梗根形真相似只是咬之腥濇
不堪啖不為藥用修治去頭上硬尖二三分并兩畔
附枝槐砧上細剉用生百合搗膏投水中浸一伏時
取出緩火熬乾每桔梗四兩用百合二兩五錢節皮
為之使畏白及龍膽草忌猪肉得牡蠣遠志療恚怒

得消石石膏解傷寒其發味白粥解之但節皮不知
為何物也

叅曰桔梗如桔槔之梗傾則仆滿則立載上載下其
馮以樞合入少陽少陰樞藥也雷公製以百合此藥
梗基玉涵佐以甘草此鍊梗已基築已鍊上下乃察
也胸脇為少陽部署故主胸脇痛如刀刺若腹滿腸
鳴幽幽悸氣此上下不察驚則載上不下恐則載下
不上皆樞象也千金用治喉痺咽痛此則少陰部署

亦少陰樞象耳

本經下品

夏枯草氣味辛寒無毒主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散
瘰結氣脚腫濕痺輕身

覈曰出蜀郡川谷所在亦有生平澤原野間冬至後
生苗漸高至一二尺許莖微方葉對節生似旋覆葉
而長大邊有細齒而背白三四月莖端作穗長一二
寸穗中開淡紫碎花似丹參花結子亦作穗一穗四

子五月便枯宜四月收采土瓜為之使伏永砂

叅曰冬至生夏至枯具三陽之正體寒水之正化故
從內達外自下徹上以去寒熱氣結及合濕成痺也
癰癰曰寒熱病經云癰癰者皆鼠瘻寒熱毒氣留於
脈而不去也其本在於藏其末出於頸腋之間浮於
脈中而未內與著於肌肉而外為膿血者易去也治
之奈何請從其本引其末可使衰去而絕其寒熱審
按其道以予之徐往徐來以去之決其死生反其目

視之中有赤脈上下貫瞳子者見一脈一歲死見一脈半歲半死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲而死見赤脈不下貫瞳子者可治也若癭則但浮於脉癥則但著於藏脚腫唯下頭瘡唯上雖非本末統名寒熱病也樓全善用治目珠疼簡要濟衆方用治目睛痛此得靈樞意旨有赤脈貫瞳子者相宜否則涉寒非對待法也

具寒水之正化可從在內之藏本具三陽之正體可從在外脈中之支末癰癰曰寒熱病者以本於