

增補萬病回春原本卷之七

小兒科

大醫院史員金谿雲林草堂醫子才編

同邑後學周亮登元龍校

小兒神色總斷

凡小兒病宜先觀形症神色然後察脉但如肝之爲病則面青心之爲病
則面赤脾之爲病則面黃肺之爲病則面白腎之爲病則面黑先要分
辨五臟形症次看虛受盈虧胎氣虛實明定標本而治之無不可者

門審候狀

觀形察色辨病因 陰陽強弱硬柔 姑是傷寒雙受冷

要知有熱肚皮求 鼻脣便知是瘡疹 耳冷應知風熱症

角指頭冷是傷寒 上熱下冷復食病

五指稍頭冷

必定是傷寒

驚來不可當

若逢中指熱

麻痘症相得

女右男分左

分而仔細看

觀面部五色

面赤爲風熱

面青驚可詩

心肝形此見

脈證辨溫涼

脾怯積病積

虛寒解白光

若逢生黑氣

營敗命須亡

面部
觀形
察色



須腎

左腎屬木東
額上屬心火南

右腎屬金西
鼻壅屬肺土中

小兒三歲以下有病須看男左女右虎口三關從第二指側看第二指名風關第三指側看第三指名命關辨其紋色紫者屬熱紅者屬青者屬風白者屬病黑者中惡黃者脾之困也若現於風關爲輕者關誘重遍于命關則難治矣

三關脉紋主病歌

紫黑紅傷寒 吉驚白是疳 黑時因中惡 黃節因脾端

青色大小曲 人驚併四足 赤色大小曲 水火飛禽摸

紫色大小曲 傷米麪魚肉 黑色大小曲 脾風微作喘

王指脉紋八段錦

丫魚刺形主驚風發熱

十懸針形主傷風泄瀉積熱

水字形主驚癇食積咳嗽

乙乙字形主肝病驚風

蟲形主肝與大腸穢積

九環形主疳積吐逆

亂紋主蟲

四珠形主死

虎口三關脉紋圖

感關第一節寅位

氣關第二節卯位

命關第三節辰位

虎口火手處是也

凡小兒至三歲以上乃用一指按于關尺三部當以左七至爲率添則爲

熱誠則爲寒伴其風盛數則多慳沉運爲虛沉實爲積

小兒脉法總歌

小兒有病須憑脈

一指三關安息數

遲冷數熱古今傳

浮風沉積當生識

左手人迎主外証

右手氣口主內疾

外候風寒暑濕侵

內候乳食痰積致

洪緊無汗是傷寒

浮緩傷風有汗液

浮洪多是風熱盛

沉細元因乳食積

沉緊腹中痛不休

弦緊喉間作氣急

緊促之時疹痘生

緊數之際驚風至

虛軟慢驚作癲癇

緊實風癇發搐搦

軟而細名爲疳蟲

牢而實者因便閉

脉芤大小便中血

虛濡有氣兼驚悸

滑主露潔客所傷

弦急密忤君須記

大小不勻爲虛候

二至爲免三至卒

五至爲虛四至損

六至不和曰無疾

七至八至病尤輕

九至十至病欲絕

十一至死無疑

此訣萬中無一失

小兒死候歌

眼生赤脉貫瞳人
額門腫起又作坑
指甲黑色鼻乾燥

鴉聲忽作壯青筋

虛舌出口咬牙齒

目多直視不轉睛

魚口氣急喘不得

耽蟲既出死形真

手足鄭搖驚過節

靈丹十救一無生

魚目定睛夜死

面青脣黑晝亡

啼而不哭是痛

哭而不啼是驚

噬煎不安是煩

駭睡不定是燥

驚驚

急驚風症牙關緊急壯熱涎潮

竄視反張搐搦動唇口眉眼窄引口伸

內有實熱外挾風邪當截風定搐若淡熱尚作初發下之癥熱所潤急

宣調養胃氣搐差而皮熱少退猶宜調補脾氣此大去也

急驚屬肝風邪厥熱有餘之症也

急驚屬陽明也治宜解表敗毒散主之若急驚用腹脹脛痛盡砂九散意丸之類

○敗毒散治急驚風初起發熱手足搐搦

上宮天吊角弓反張併一切或寒涼發熱喉嚨喘急鼻塞聲重及瘡瘍欲出發揚並宜

那 人參

羌活

獨活

柴胡

前胡

茯苓皮

桔梗去蘿

川芎

枳殼去穰

天麻

全蝎去毒姜

荳蔻炒

白附子煨也

甘草減半

右剉一劑生薑三片水煎服

甘草減半

右剉一劑生薑三片水煎服

○靈砂丸

治小兒風痰驚積至危篤者如神

南星泡

半夏泡

巴豆

去殼酒煮乾次各五錢

全蝎

少朱

人藥一半石硃爲衣各三錢

姜奮

飛過人參

去苦

白茯神

二錢

右爲末水和丸如黍米大每一次三九如驚風金銀湯下其餘辰湯下

○龍腦安神丸

專治大人小兒驚風癲癇男婦骨蒸勞熱咳嗽諸症皆宜久不瘥者及傷寒太熱不解久無汗者大人服一丸并花

水薰姪黃間五分送下或細服或研下小兒一歲以下者之四二三歲三之一四五年以上者二之

年歲之四二三歲三之一四五年以上者二之

年歲之四二三歲三之一四五年以上者二之

牛黃

五分

片腦

三分

鳥犀角

二錢

硃砂

飛過二錢

人參

去苦

白茯神

二錢

地骨皮

二錢

麥門冬

去心二錢

桑白皮

二錢

麝香

分

馬牙硝

分

甘草

二錢

右各爲末分兩粒碎合爲一處煉蜜爲丸每兩作十九金滿四大張爲

衣盒乾器內放用萬蠅作蓋恐泄脂麝之氣

此方白發消其功不能盡述

○于金散

治小兒一切痰喘急慢驚風雖至死復能開口灑下無不活者

全蝎

炙

姜奮

名三

硃砂

四分

牛黃

五分

水片

一分

黃連

天麻

名四分

膽星

甘草

二錢

右爲末每用五七釐蓮荷燈心金銀煎湯不拘時調下

○保生丹

治小兒急慢驚風痰延壅盛胎驚內吊多啼夜間恍惚不寧久癩癧咳嗽發熱夏天中暑發搐皆沿常服鎮驚安神寧心

牛黃

天竺黃

辰砂各一錢

雄黃三錢

麝香五分

牛腦五分

琥珀一兩

珍珠五錢

大赭石二錢

火煅蛇含石七錢

金銀箔四

天麻

防風

甘草

茯苓皮八錢

人參各三錢

姜黃

右爲細末用米粉糊爲錠辰砂爲衣用薄荷湯化下

○大聖壽命金丹

治小兒急慢驚風，癇癲，天吊，各牛物，牛中惡及初生脣反躬底，脫口不醒，出見一切驚風危惡，緊急之症，並皆治之。某効如神，但藥難制，但不及此，真起死回生之良劑也。楊海雨傳。

天麻

炮

全蝎炒去清蟄星

防風去薦羌活

白附子

炮

茯苓去皮川芎

遠志心橘更去苦桔

石菖蒲

半夏

姜製

人參去翫

白术去芦

茯苓去皮酸枣仁

研荆棟酒浸沃

細辛

各五錢

川烏

炮

志皮臍一箇

烏蛇尾

酒浸沃五錢

大赤頭

蜈蚣一錢

珍珠

辰砂水飛

珍珠各三錢

天竺黃一兩

雄黃

麝香

各一錢

金箔三十片

銀箔四十片

琥珀各三錢

天竺黃一兩

雄黃

砂爲衣每服一丸用金銀薄何煎湯研化不拘時服
一小兒潮熱發搐疾涎上壅手足指冷申酉時左腮青色隱白用補中益氣湯調補肺脾六味丸滋養肝腎而痊

小兒三歲因驚搐病發熱痰盛久服抱龍丸等藥面色或赤或青此心脾二經血虛風熱生痰也用六味丸滋腎生血用六君柴胡升麻調補脾農而安三方俱具補益

慢驚

慢驚症因病後或吐瀉或藥餌傷損脾胃肢體通冷面白氣微手足瘺癰昏睡露睛此脾虛生風無陽之症也

○慢驚屬脾中氣虛損不足之病也

慢驚者陰症也治宜固裏醒脾散正之

○醒脾散

治小兒吐瀉不止作慢驚風脾困昏沉默然不食

人參

土蘆白术去苦

白茯苓去皮木香

全蝎

去毒

天麻

白附

烟

姜桑

炒各半分

甘草炙減半右剉生姜三片枣一枚水煎溫服

一方去元麻桑加南星

泡半夏泡陳倉米二百粒煎服

一方去元麻桑加南星

一方去元麻桑加南星

○葛根湯

治小兒慢驚風之神藥也

葛根一錢蜜水炒

人參三錢

人參三錢

炙甘草五分加白芍炒一錢右剉一劑水之大乳服

一劑水之大乳服

治小兒吐瀉脾驚二歲可服

朱砂五釐二歲已上一分三歲已上四五分

金鰣一個去足翅并一歲一個二歲二個

右爲細末乳汁調服

老慢驚元氣虛損而至昏迷者急灸百會穴皆待下痰不愈而移灸之則

總歸虛處推肝受之無風可逐無驚

可療此因脾虛不能攝血而似瘀也

紫金錠子

或急擾驚風涎朝發搐或叶

人參去芦白朮去皮白茯苓去皮

白茯神去皮

山藥

乳香赤石脂

醋研七次

辰砂各三麝香一錢

白芍木以糕

一兩爲丸如彈子太金箔爲衣每一粒薄荷湯研化服

小兒傷食發丹服發表之劑手足搘拗服抱龍丸目睭然盛余謂脾胃
虧損而變瘧驚也無風可祛無痰可逐只宜溫補胃氣遂用六君子加
附子一劑而愈方見補益

一小兒精神廢延自流或用驚風之藥益甚視其面色黃白金角六君子
補中益氣二湯補脾氣而愈一方俱見補益

滋元丹治小兒急慢驚風癆嗽喘熱吐瀉腹脹小兒百病大有功效方見

驚後調理

○牛黃鎮驚丸

治驚後調理安心神養氣血和平預防之劑

當歸身酒洗赤芍藥煨

蘿蔔

天竺黃

另胡來門冬去心木通去毒速姜汁炒

山梔仁炒

辰砂

另研水飛牛黃

方研二錢龍骨火服各一錢

青黛

另研一錢

右爲末煉蜜爲丸如米大每服二三十丸淡姜湯送下

小兒五歲因看會見鬼臉被驚嚇兩眼黑睛翻向裏白睛翻向外視物微覺一線諸醫不能治求治於余余曰此子曾出痘疹不對曰未俟出痘疹可治逾日痘疹盛行其子發熱似有將出之幾其母果召余治以綿胎脂將水泡出汁慢火熬成膏全兒兩眼胞上下一日塗兩次直七竈收壓後其眼復舊

疳疾

夫小兒疳汗由乳母寒熱失理動止延飲食無節甘肥過量多食而虛

醉飽勞傷乳兒者故成疳病又以久吐之後久悶之後久痢之後以致久悶久汗久熱久癥久嗽下血久瘡之後皆能生津液而成疳病

錢氏云疳皆脾胃傷亡津液之所作也

丸養小兒宜戒敵

酒肉油腻偏生病

生冷硬物涼水漿不與白無

疳病

○消疳湯

治小兒大便色白小便渾濁或澄之如米泔無聲痛虛症

山楂肉

白芍

炒沙

白茯苓

去皮白朮去芦

澤瀉錢一

青皮四分甘草生三分

右剉一劑姜棗火煎

○治疳丸

治五疳片黃肌瘦髮直呆白肚大清解好食足炭茶米丸物或吐或渴腹內積塊諸蟲作痛

荳朮米泔浸炒

陳皮

厚朴

姜汁炒砂殼麪糊炒

神曲炒

山楂去了

麥芽炒

三棱炮

莪术炮

砂仁

茯苓去皮

黃連炒

胡蘆連

蕷夷仁

蘆薈

史君子去殼右各等分爲

末少君子散

煎湯泡蒸餅爲丸如彈子大每服一丸清米湯化下

○肥兒丸

消疳化積磨輝清挑代肝補脾進食殺蟲潤肌膚養元氣

○

二錢半碗盛泥封固

人參

三錢

白朮去皮

茯苓各三錢

黃連姜炒

五錢

一

金匱

半

小兒疳疾

史君子

六錢

散四錢

神龜炒

麥芽炒

山楂肉各三錢半

甘草

炙二錢

右爲末黃米糊爲丸米湯化下或作丸蒸米

大每服二三十丸湯下看見大小加減

○快活丸

治小睡火

見下利包症皮膚瘦削骨露如柴肚大青筋小便濁

○蒸餅

不分仍

見下利包症皮膚瘦削骨露如柴肚大青筋小便濁

右爲細末別以肥小點用米泔水浸經一皮飯上蒸熟去核皮爛杵如糊同前餅末杵勻爲丸如黍子大每服三五十丸不拘時清米湯送下或稍化米湯調服亦可

○蘆連消癩丸

治小兒生瘡痘塊發熱壯

脹壯脾腎消飲食鴻臚丸磨積塊

大甘草節

去粗皮生用四兩

蘆薈

治瘡毒

宜東連

酒炒五錢

各

白木通

米泔水

白茯苓

去皮

當歸

全身用酒洗

白芍

酒炒八錢

各

山楂肉

各七錢

蕷夷炒

檳榔各五錢

史君子

去子酒乾

山楂肉

各七錢

蕷夷炒

檳榔各五錢

右爲細末湯泡蒸餅一兩爲丸菉豆大每服五六十九臨晚米湯送下或燒蜜爲丸如龍眼大每晚噙化一丸或米湯下或酒亦可

一小兒肝疳白膜遮睛筋疳瘍血腎疳身瘦瘡疥骨疳羸卧冷地又治胃

怯不言解願併年長不能行者用六味丸各等分煉蜜丸服

神効方見補益

一小兒四肢消瘦肚腹脹大步行步不能頗能飲食作渴發熱去後臭穢此

脾臟傷也用異功散方見補益肥兒丸調理而愈

一小兒面色痿黃眼胞微腫作渴腹脹飲食少思腹中一塊或移動小便登白大便不實此脾疳之患用四君子方見補益加山梔無芽兼肥兒丸而愈

一小兒尿濁如米泔余以江南做酒小麴炒爲末酒調下三服

疳疾

錢仲陽云癥不愈偏於兩腸痞結者否於中脘此因乳哺失調飲食停滯邪氣相搏而成或乳母六淫七情所致古人多用攻伐痞癥既久飲食減少脾氣必虛久而不愈必先以固胃氣爲主使養正則積自除若欲直攻其結不惟不能善消抑且損其脾土凡脾土虧損必變症百出矣

當察各類及隨見症而主治之若癬塊日久元氣脾胃俱虛宜朝服補中益氣湯多服于金消 痘丸間與混元丹兼服治之獲効者多矣
癬者生於皮裏元外也○淨腑湯治小便一切癬塊發熱

柴胡

白芷芩附猪苓

澤鴻

三稜

炒芥末醋炒

山楂

去核名錢

苦参

白术

去芦半夏姜製人參各八

胡黃連

甘草各三分

右剉一劑姜煎煎服

○肥兒丸

治癬如神
方見柏疾

金泊癬丸

治小兒癬疾積魏有殊

蘆薈

阿魏另爲青黛

木香

厚朴姜炒

檳榔

陳皮

去白穰各一錢

麥芽

炒四錢

大黃

君子去殼

山楂肉

香附

木浸二錢

稜

醋炒

莪术

燶醋炒

各二錢

人參

去芦各一錢

茯苓

去皮白术

各二錢

和麵打爛爲丸

茶葉豆大每服四五十粒水飲白湯任下

益兒餅

治小兒癩

水紅花子

史君子

去穀

山楂肉各五

白术

去芦四錢

柏榔半錢 水香錢 神礬炒神牛錢

右爲末人黃蠅延水和作煎劑以

○主寶丸

貞阿魏

蘆薈

天竺黃

胡黃連

雄黃

川山用

炒沉香

白草烏泡

硇砂各二分

沒藥各二分

右爲極細末用好酒和成一塊入銅鍋內再入酒牛膝鍾熬成膏易令火大恐傷藥力量可丸取出丸如豌豆大每丸指消化下十歲以上服二丸臨臥時服待其自然汗出三日服一次重者五七服輕者二三丸熱節退塊亦消須要忌口如服後熱不止可後服金花丸如羸弱不進食者可先服平胃散

○癬疾方

麝香一分

全蝎去毒斑

猫去頭

足紅娘子

去頭尾足翅去人用男子去皮

蠻虫

去足翅

血蝎

雄黃

硇砂

蘆薈

木香

阿魏

當歸尾

酒浸

三棱

醋煮

莪朶

醋煮

附子

炒白豆蔻

去皮

蘿蔔子

炒各一錢

右爲細末醋糊丸如梧桐子大每服三十九

或酒或溫水下壯盛者可服

○癬疾方

蘆薈五分

阿魏五分

急性子

子部小桃紅

水紅花子

錢

白芷生

錢

右爲細

末每服三分黃酒送下三帖全好

○癬疾方

生黃四分雄膽四分血竭

一錢蘆薈四分蘆甘石五分天竺黃

鐵五分外蘆甘石五分天竺黃鐵五分

黃蠟

五錢

淨皮硝

雨蜂蜜

四兩

右將蠟化開與蜂蜜一處

潔熟佳火傾入細磁碗內涼冷後將羣藥爲細末方入蜜蠟內攪匀每日常服先服用筋頭酸吃後多服不怕十日全消忘酸冷油膩之物

○又方

核桃仁一斤檳榔二十個

一錢

大黃一兩右三味爲細末入桃

仁水煮一炷香水滾時陸續人皮硝

半斤香盡稍亦盡止食桃亦好

○清香散

治癬疾生牙

輕粉炒炭

象皮炒灰

象牙炒黃

乳香

沒藥

孩兒茶

紅褐

炒灰

珍珠

焙黃

海巴

等分

右爲細末擦患處立時痛止生肌如神

○桃花散

治癬氣土攻牙齦腐爛

桃花一塊

桑柴火內燒紅淬人細茶濃濁內如此七次去信將茶濁

入雄黃一塊研末入酒內用雞翎頻掃患處止痛生肌立時見効

桃花信一塊桑柴火內燒紅淬人細茶濃濁內如此七次去信將茶濁

入雄黃一塊研末入酒內用雞翎頻掃患處止痛生肌立時見効

○鰓堅膏

專治小兒癬塊發熱虛瘦者