

欽定四庫全書

子部

金匱要畧論註卷十一至



北京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

嘉興徐彬註

致其病也意欲食復
欲行不能行飲食或
如寒無寒如熱無熱

靈者身形如和其脉微數每溺時頭痛者六十日
乃愈若溺時頭不痛漸漸然者四十日愈若溺時
快然但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或
病四五日而出或病二十日或一月後見者各隨
證治之

註曰此言傷寒虛勞之人都有正氣不能禦邪致浸
淫脉現證雜亂不能復分經絡曰百合病謂周身百
脉皆病然若有所宗而主之以致各病而各不能專

持其病者但覺行住坐卧飲食皆妨而寒熱口苦便赤吐利諸症且得藥則劇身形反如和毫無可捉摸而唯其脉微數似屬

闕

轉為患現證不能

食默默不能卧似屬

闕

口苦似屬少陽小便

赤似屬太陽吐利似屬三焦腑病未深入臟故恐邪久留連陽經搏結于腦則猝難脫身而非不治之病但于溺時而頭痛者知其深曰六十日愈謂月再週而陰勝則傷邪自平也頭不痛而淅淅然則病稍淺

矣快然而頭眩則邪更淺矣故愈日以漸而速也至其病發之先後遠近無非視內氣并邪蓄之淺深故曰各隨證治之乃千金曰其狀惡寒而嘔者病在上焦也二十三日當愈其狀腹滿微喘大便堅三四日一大便時復小溏者病在中焦也六十三日當愈其狀小便淋瀝而難者病在下焦也三十三日當愈各隨證治之則知此病有搏邪在內而微有三焦之分者其治法又當分三焦而和之可知矣

百合病發汗後者百合知母湯主之 百合病下之後
者滑石代赭湯主之

註曰十二經絡皆朝宗于肺而氣口成寸乃仲景註
百合病云百脉一宗悉致其病豈非謂百脉之病無
可名狀一宗于肺而為病乎百合者味甘平微苦色
白陽中之陰補肺藥也觀其用之為主而即以百合
名病則仲景因肺為治之意不更曉然乎然不明言
肺何也蓋百合病乃傷寒餘邪留連陽經而浸淫于

各腑之陰無正氣以統之各自為病互相牽引若出一宗而現證無一是肺則知病雖不在肺而肺之治節實不行矣故以百合之夜合屬陰色白歸肺辦辦相附無往不合者補肺之正氣以合于他臟而理其滯者為主其在汗後者汗過傷陽陽虛熱鬱不可攻補故以百合同知母之保肺清胃而滋腎者以養其陰加之泉水以清其熱而陽邪自化也其在下後者下多傷陰虛邪在陰陰虛火逆攻補無益故以百合

同滑石之通竅代赭之鎮逆者以通陽氣加之泉水以瀉其熱而陰氣自調也

百合知母湯方

百合

七枚

知母

三兩

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母取一升後合煎取一升五合分溫再服

滑石代赭湯方

百合

七枚

滑石

三兩碎
綿裹

代赭石

如彈丸
碎綿裹

右先以水洗百合浸一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升別以泉水二升煎滑石去渣取一升後合和重煎分溫服

百合病吐之後者百合雞子湯主之

註曰吐傷元氣而陰精不上奉故百合病在吐之者須以雞子黃之養陰者同泉水以滋元陰協百合以行肺氣則氣血調而陰陽自平

百合雞子湯方

百合 七枚

雞子黃 一枚

右先以水洗百合浸一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓內雞子黃攪勻煎五分溫服百合病不經吐下發汗病形如初者百合地黃湯

註曰既不經吐下發汗則無傷陰傷陽之可慮但病形如初初者即傷寒論所謂太陽病是也如初不解是陽經之困極而陰氣亦耗竭矣心為五臟之主故

以生地之涼血補心者同百合泉水養陰以化其陽
經之久邪

百合地黄湯方

百合

七枚

生地黃汁

一升

右以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水
二升煎取一升去滓內地黃汁煎取一升五合分溫
再服中病勿更服大便當如漆

百合病一月不解變成渴者百合洗方主之

註曰渴有陽渴有陰渴若百合病一月不解而變成
渴其為陰虛火熾無疑矣陰虛而邪氣蔓延陽不隨
之而病乎故以百合洗其皮毛使皮毛之竅得其平
而通氣于陰即是肺朝百脉輸精液於皮毛脉合精
行氣于腑之理食煮餅假麥氣以助精液也勿食鹽
豉恐傷陰血也

百合洗方

百合一升以水一斗漬一宿洗身洗後食煮餅

勿食鹽豉

金匱要略卷三
百合病渴不差者括萋牡蠣散主之

註曰渴不差是雖百合湯洗而無益矣明是中之陰氣未復陰氣未復由于陽亢也故以括萋根清胸中之熱牡蠣清下焦之熱與上平陽以救陰同法但此從其內治耳故不用百合而作散

括萋牡蠣散方

括萋根

牡蠣

熬等分

右為細末飲服方寸匕日三服

百合病變發熱者百合滑石散主之

註曰仲景嘗謂發于陽部其人振寒而發熱則知變發熱者內熱不已淫于肌膚而陽分亦熱故以滑石清腹中之熱以和其內而平其外兼百合壯肺氣以調之不用泉水熱已在外不欲過寒傷陰故曰當微利謂畧疏其氣而陰平則除也

百合滑石散方

百合

一兩
炙

滑石

二兩

右為散飲服方寸匕日三服當微利者止服熱則除
百合病見于陰者以陽法救之見于陽者以陰法救之
見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復下之此亦
為逆

註曰此段總結全篇謂百合病同是內氣與傷寒餘
邪相併留連無已不患增益而患因循故病在下後
及變渴渴不止所謂見于陰也勢必及陽至陽亦病
而無可為矣故以滑石通徹其毛竅之閉百合利其

皮毛之陽在內之陽燥枯萎牡蠣養其腹內之陽陽得其平陰邪欲傳之而不受則陰經之邪漸消矣所謂以陽法救之也病在汗後及下後及病形如初及變發熱皆所謂見于陽也勢必及陰至陰亦病而無可為矣故以知母關

之陰雞子養其血分之

陰生地壯其關

發于肌表者滑石以和其

腸胃之陰關

邪欲傳之而不受則陽中之

邪漸消矣所謂以陰法救之也然而救也非攻也若