


# 简明中医辞典

(五官科部份初稿)



成都中医学院《中医辞典》编写组

一九七七年十月

## 說 明

在英明领袖华主席抓纲治国的伟大战略决策指引下，全国各行各业大干快上，热气腾腾，科技文教卫生战线跃进的形势也一片大好。为适应工矿、农村、部队广大基层医药卫生人员的需要，西医学习中医群众运动的需要，《中医辞典》编委会决定，在《中医辞典》初稿基本完成的基础上，尽快编写一部《简明中医辞典》。报经卫生部批准后，今年五月已制定出编写计划。按该计划规定的编写分工，五官科部份由我们承担。目前初稿已经写出。由于我们政治业务水平有限，经验不足，加之时间仓促，问题一定不少。现印出来，请同志们审阅，提出宝贵意见，以便进一步修改。

成都中医药学院《中医辞典》编写组

一九七七年十月

## 目 录

眼科部份.....	1
耳科部份.....	20
喉科部份.....	24
口齿部份.....	34
唇舌部份.....	38
鼻科部份.....	46



1052091

## 眼 科 部 分

**眼** 又称目。五官之一。为肝之窍。具有明视万物的功能。《灵枢·大惑论》：“五脏六腑之精气皆上注于目而为之精，精之窠为眼”。说明眼的视功能的产生及维持与全身脏腑经络有着不可分割的关系。《灵枢·脉度篇》：“肝气通于目，肝和则目能辨五色矣”。《素问·五脏生成篇》：“肝受血而能视”。进一步说明眼的功能与肝的关系尤为密切。

**目** 见眼条。

**眼珠** 又名目珠。位于眼眶前部中央，形圆类珠，即今之眼球。它的前端中央为黑睛。黑睛内为黄仁。黄仁正中有圆孔，称瞳神。黑睛后接白睛。珠内有神水、神膏、视衣等。其后端接目系，上入于脑。为视觉主要器官。参见眼条。

**目珠** 见眼珠条。

**胞睑** 又名牌。即今之眼睑。为眼最外部分。分上睑与下睑，能开合，具有保护眼眶及眼珠的作用。胞睑内应于脾，为眼的五轮中之肉轮。

**睥** 见胞睑条。

**睑弦** 又名胞弦、目唇、眼楞。即今之睑缘。为上下胞睑的边缘。生有排列整齐的睫毛，与胞睑共同起着保护眼珠的作用。参见胞睑条。

**胞弦** 见睑弦条。

**目唇** 见睑弦条。

**眼楞** 见睑弦条。

**眦** 又名眼角。为上下睑弦的联合处。外端称外眦（又称锐眦、小眦），内端称内眦（又称大眦）。两眦内应于心，为眼的五轮中之血轮。

**眼角** 见眦条。

**锐眦** 《灵枢·癫狂篇》：“目眦外决于面者，为锐眦”。即外眦，详眦条。

**泪堂** 又名泪窍。即今之泪点。《银海精微》：“大眦（内眦）有窍，名曰泪堂”，为泪液排泄通道之起点。

**泪窍** 见泪堂条。

**泪** 即眼泪。具有清洁和润泽眼部的作用。《素问·宣明五气篇》：“五脏化液，……肝为泪”，故泪为肝液。其病变常与肝有关。

**眼带** 类指眼外肌。支配眼珠之转动。《沈氏尊生书》：“若风寒直灌瞳人，攻于眼带，则瞳人牵拽向下”。

**白睛** 又名白仁、白珠、白眼。为眼珠之外层。包括今之球结膜与巩膜。前部与黑睛紧连，彼此病变常互相牵累。白睛内应于肺，为眼的五轮中之气轮。

**白仁** 见白睛条。

**白珠** 见白睛条。

**白眼** (1) 出《灵枢·大惑论》。即白睛，详该条。(2) 即白涩症，此症南人俗呼白眼(《审视瑶函》)。

**黑睛** 又名黑眼、黑珠、乌珠、神珠、青睛。位于白睛的前部正中。形圆无色透明，因能透见其内黄仁之黑褐色而得名。相当于今之角膜。若发生病变，失去正常之透明，则影响视力。黑睛内应于肝，为眼的五轮中之风轮。

**黑眼** 《灵枢·大惑论》：“筋之精为黑眼”。即黑睛，详该条。

**黑珠** 见黑睛条。

**乌珠** 见黑睛条。

**神珠** 《目经大成》：“气轮之中青睛则属木，属肝，轮曰风，世称神珠”。即黑睛，详该条。

**青睛** 《目经大成》：“肝木风轮乃青睛”。即黑睛，详该条。

**黄仁** 出《银海精微》。又名睛帘、虹彩。位于黑睛之内，呈圆盘状，即今之虹膜。其色因人种而异，我国人多为棕褐色。中央有直径约2.5~4毫米大小之圆孔，称瞳神。黄仁居风轮之里层，病变常与肝胆有关。

**睛帘** 见黄仁条。

**虹彩** 见黄仁条。

**瞳神** 又名瞳子、瞳人、瞳仁、金井。《审视瑶函》：“华佗云：‘目形类丸，瞳神居中而独前’”，为黑睛内黄仁中央之圆孔，随光线强弱而缩展。即今之瞳孔。内应于肾，为眼的五轮中之水轮。

**瞳子** 见瞳神条。

**瞳人** 见瞳神条。

**瞳仁** 见瞳神条。

**金井** 见瞳神条。

**黄精** 又名睛珠。《目经大成》：“膏中有珠，澄澈而软，状类水晶棋子，曰黄精”。即今之晶状体。正常为无色弹性透明体，似双凸面透镜，厚约4~5毫米，直径约9毫米，病变时显混浊。与瞳神同属于肾。

**睛珠** 见黄精条。

**神膏** 古代概念欠明确。《目经大成》：“风轮下一圈收放者为金井，庄内黑水曰神膏，有如卵白涂以墨汁”。它与神水、瞳神之间有着“水养膏，膏护瞳神”(《审视瑶函》)的关系。类指今之玻璃状体。与脏腑所属关系，历来认识不一致：有的认为属胆(《审视瑶函》)，有的认为属肾(《目经大成》)，亦有认为属肺(陈达夫《眼科六经法要》)者。然而一般主张神膏病变与肾胆有关者居多。

**神水** 《证治准绳》第七册：“神水者，由三焦而发源，先天真一之气所化。在目之内，虽不可见，然使触物损破，则见黑膏之外有似稠痰者是也；在目之外，则目上润泽之水是也”。其义有二：(1)神水在目珠之内者，类似今之房水。与神膏、瞳神有着“水养膏，膏护瞳神”(《审视瑶函》)的关系。(2)神水在目珠之外者，似指泪液。若枯涩，则目珠失去莹润光泽(《证治准绳》)。

**目系** 出《灵枢·大惑论》。又名目本、眼系。类指视神经。属厥阴肝经。

**目本** 见目系条。

**眼系** 见目系条。

**视衣** 类指今之脉络膜、视网膜等组织。内属心、肝、肾等经。

**五轮** 见《秘传眼科龙木论》。轮，喻眼珠形圆而转动灵活似车轮之意。历代眼科将眼由外向内分为五部份，内应五脏，名为五轮：肉轮，即胞睑，属脾；血轮，即两眦血络，属心；气轮，即白睛，属肺；风轮，即黑睛，属肝；水轮，即瞳神，属肾。藉此说明眼的结构及生理机制，成为眼科一独特理论。历代眼科临床应用比较普遍。

**八廓** 见《秘传眼科龙木论》。八廓是指中医眼科在眼外划分的八个部位（或方位）。历代命名繁多，一般多用自然界八种物质现象或它们的八卦名称来命名。即天（乾）廓、地（坤）廓、风（巽）廓、雷（震）廓、泽（兑）廓、山（艮）廓、火（离）廓、水（坎）廓。称之为廓，系取其有如城廓护卫之意。至于八廓的位置、内应脏腑以及临床意义等，历来各家说法不一。如《审视瑶函》认为，八廓在眼各有定位，可凭气轮上血丝“或粗细连断，或乱直赤紫，起于何位，侵犯何部，以辨何脏何腑之受病”；但《银海精微》认为，八廓“无位有名”；《医宗金鉴》却主张，八廓只分属于六腑和包络、命门，因脏腑相应，其位又多与五轮相重。近代某些医家则认为，八廓位于白睛四正四隅八个方位，分别与六腑及包络、命门相应，用于临床辨证，具有一定意义（陈达夫《眼科六经法要》）。正由于历代医家对八廓的见解很不一致，所以它在临床上的应用不如五轮普遍。

**障** 《医宗金鉴·眼科心法要诀》：“障遮蔽也”。指眼之翳障。一般将其归纳为外障、内障两大类。分详外障、内障条。

**内障** 指主要发生于瞳神及眼内各组织的疾病。一般以虚证居多，尤以肝肾不足，气血两亏为常见。此外，阴虚火旺，或情志失调，气滞血瘀，风火痰湿上扰清窍以及外伤等，亦可致病。常自觉眼前蚊蝇飞午，黑花飘荡，视灯火如彩虹，视物昏蒙，夜盲，甚至暴盲等。一般患眼外观无特殊病征，但亦有见瞳神大小、形状、颜色改变者。眼内障病情比较复杂，临证需结合全身症状辨证论治。除用药物、针灸等疗法外，有的尚需手术治疗。

**外障** 指发生在胞睑、两眦、白睛、黑睛等的眼病。一般以实证居多。常因六淫外侵，或内有郁热、痰火、积滞以及外伤等引起。此外，肝肾阴虚、虚火上炎或脾虚气弱亦可致病。眼部常见红赤、肿胀、糜烂、流泪、眵多粘稠或干结，以及生翳、膜、胬肉等。自觉眼痛痒、羞明、沙涩不适。宜结合全身症状辨证施治。除药物内治外，外治法和手术亦常用。

**膜** 痘名。眼生片状薄膜，通常伴有血丝，从白睛发出，侵向黑睛，甚至遮盖瞳神，影响视力。一般以血丝疏密和红赤的浓淡不同，又有赤膜和白膜之分。详赤膜、白膜等条。

**赤膜** 又名红膜。眼生膜，其血丝红赤稠密者称赤膜。参见赤膜下垂条。

**红膜** 见赤膜条。

**白膜** 眼生膜，其血丝色淡而稀疏者称白膜。参见白膜侵睛条。

**翳** 痘名。（1）通常指引起黑睛混浊或溃陷的外障眼病，以及病变愈后遗留于黑睛的疤痕。如凝脂翳、宿翳等。实证多由肝风热邪引起，虚证常属肝肾亏损，阴虚火旺，因外伤引起者亦不少见。治实证常以疏风清热、解毒泻肝为主；虚证多宜滋养肝肾，养阴

清热；后期又宜明目退翳为主；外伤者，参照上述治法。（2）广义而言，凡眼内外所生遮蔽视线之目障皆可称翳。除（1）之所述外，某些内障也称为翳。如园翳、惊震翳等。

**目痛** 症名。一般日间痛属阳，夜间痛属阴。痛而烦闷为气实，痛而恶寒为气虚。隐隐而痛，时作时止为阴虚火动，痛如针刺，持续无间为火邪有余。痛而干涩不适为津液耗损或水亏血虚；赤痛而多分泌物，眵泪胶粘为风热壅盛。二便清利，目微赤痛为虚火上浮，二便不利，头目痛甚为实火内燔。痛而拒按，喜冷敷为实；痛而喜按，热熨则舒为虚（广东中医学院主编《五官科学》）。

**眯目** （1）指细微异物入目。（2）上下眼睑微微闭合之状。

**小儿劄（dó答）目** 指小儿两眼时时眨动的证候。多见于风热攻目或疳积初起。参见目痒、目涩、疳疾上目等条。

**流泪症** 病症名。指非因情志因素而两眼时时流泪的证候。可分冷泪和热泪。冷泪包括冷风刺激的迎风流泪和泪液排出受阻的无时泪溢。热泪常见于热性眼病及异物入目等。详冷泪、热泪等条。

**热泪** 症名。多由风热外袭，肝肺火炽或阴虚火炎所致，异物入目亦可引。《银海精微》：“肿痛亦涩泪出者，此热泪也”。泪下有热感，甚至泪热如汤，常伴有红赤、肿痛、羞明等症。多见于外障眼病。治疗当按主症分别选用疏风、清热、养阴、平肝、凉血、祛瘀等法。异物入目者，应及时清除异物。

**冷泪** 症名。多因肝肾两虚，精血亏耗，招引外风所致。椒疮或鼻部疾病引起泪道狭窄或闭塞等亦可造成。其症眼不红痛，无时泪下，迎风更甚，泪液清稀无热感。属肝肾两虚者，宜补益肝肾；泪道阻塞者，可酌情深冲及手术治疗。

**不时泪溢** 病症名。多因泪点外翻或泪道狭窄、阻塞等引起。症见单眼或双眼常有泪液存留，并不时溢出睑缘，流淌面颊。一般泪液清稀，泪下无热感，眼局部不红不痛。属冷泪，详该条。

**眵** 俗称眼粪。为眼部分泌物。眵多硬结属肺经实热；眵稀不结属肺经虚热。当结合眼部及全身症状辨证论治。

**惟覩三光** 古称日、月、星为天之三光。历代眼科对视力严重减退者，常以是否能见三光，辨有无光感。《秘传眼科龙木论》：“目不辨人物，惟覩三光”，即指视力减退至仅存光感。

**盲** 见《素问·生气通天论》。即失明，俗称瞎眼。指目茫茫无所见。病因较多，有先天与后天之分。后天凡严重的内、外障眼病和外伤均可致盲。

**失明** 见盲条。

**畏光** 症名。又称羞明、怕日羞明、恶日。多因风火热邪上攻或阴虚血亏所致。患眼怕见光亮，遇光则涩痛难睁。若兼红赤肿痛，眵多泪热者，多属风火实证；不赤不痛，干涩不适者，多属阴亏血虚。常见于白睛、黑睛及某些胞睑、瞳神疾患。宜结合眼部及全身症状辨证论治。

**羞明** 见畏光条。

**怕日羞明** 见畏光条。

**恶日** 见畏光条。

**抱轮红** 症名。出《原机启微》。又名赤带抱轮、乌轮赤晕、白睛抱红。多由肝肺实热或阴虚火炎所致。症见沿黑睛周围，白睛深层环绕一带细直模糊红赤血丝，压之红赤不退，推之血丝不移。相当于今之睫状充血。常见于瞳神、黑睛和白睛深层的疾患。宜结合眼部及全身症状辨证论治。

**赤带抱轮** 见抱轮红条。

**乌轮赤晕** 见抱轮红条。

**白睛抱红** 见抱轮红条。

**目昏** 症名。又名目昧。即视物模糊不清。《灵枢·大惑论》：“五脏六腑之精气，皆上注于目而为之精”。如久病虚羸，气血两亏；肝肾不足，精血暗耗；心营亏损，神气虚乏；脾胃虚弱，运化失调；情志不舒，肝失条达；气滞血瘀，玄府闭塞；风、火、痰、湿上扰清窍等，以及头眼部外伤，均可使眼失去五脏六腑精气的正常濡养，以致目昏。宜结合眼及全身症状辨证论治。

**目昧** 见目昏条。

**目眩** (huāng 荒) 眩无所见 指视物模糊不清。《素问·脏气法时论》：“肝病者，……虚则目眩流无所见”。又《灵枢·经脉篇》：“肾足少阴之脉，……是动则病坐而欲起，目疏眩如无所见”。说明肝肾受病均能引起视力减退。参见目昏条。

**目涩** 症名。眼干燥涩或似异物入目般涩痛不适的感觉称目涩。《诸病源候论》：“液竭者，则目涩”。又谓：“脏腑劳热，热气乘于肝，而冲发于目，则目热而涩也，甚则赤痛”。说明阴亏液竭及脏腑劳热均可致目涩。详目干涩及目沙涩条。

**目干涩** 症名。又名目枯涩。多由肺阴不足，或肝肾阴亏，虚火上炎，以及肝虚血少等所致。目内干燥少津，涩痛不适。宜结合眼部及全身症状辨证论治，分别选用养阴清热，滋养肝肾，补肝养血等法。

**目枯涩** 见目干涩条。

**目沙涩** 症名。见《原机启微》。又名碜涩、瘾涩。多由风热、肝火、阴虚火旺或物异入目所致。眼内沙涩，有异物感。多伴有羞明流泪，红赤痒痛等。常见于外障眼病。宜结合眼部及全身症状辨证论治，分别选用法风清热，平肝泻火，养阴清热等法。异物入目者，首当清除异物。

**目碜** (chěn) 涩 见目沙涩条。

**目瘾涩** 见目沙涩条。

**目痒** 症名。由风火、湿热、血虚以及邪退正复，气血得行等均可引起眼痒，重者痒若虫行，奇痒难忍。因风者，宜法风散邪，用驱风一字散（川乌、川芎、荆芥穗、羌活、防风）加减；属风热者，宜疏风清热，用银翘散加减；属湿热者，宜清热除湿，可用三黄汤（黄芩、大黄、黄连）加减；属血虚生风者，宜养血祛风，用四物汤加荆芥穗、白蒺藜等。目久病，气血渐复而痒，勿需治疗。参见椒疮、眼弦赤烂等条。

**金针拨障法** 又称金篦刮目、开金针法、拨内障手法。即今针拨白内障术。我国早在《外台秘要》就记载某些内障“宜金篦决，一针之后，豁若开云而见日”。以后历代眼科医籍则记述更加详细。解放后，在毛主席革命卫生路线指引下，在努力发掘祖国医学遗产的基础上，此法已发展成为中西医结合治疗白内障的一种手术方法。因操作

简易，适用于广大农村。年老体弱或有严重全身性疾病的患者亦宜此法。

**金篦刮目** 见金针拨障法条。

**开金针法** 见金针拨障法条。

**拨内障手法** 见金针拨障法条。

**白内障针拨套出术** 是在金针拨障术基础上发展起来的中西医结合的白内障摘除手术。其拨障手法与金针拨障术大体相同，但因用特制之器械已将拨下的晶状体从切口套出，就避免了晶状体积存于眼球内可能引起的后患。

**割法** 历代眼科手术方法之一。其法为翻转胞睑，用三棱针或小锋针等之针锋轻轻刮刺患处，或以灯草或龙须草之细棘刺，滚转拖刮患处，可消瘀滞。适用于椒疮、粟疮等症。

**割攀睛胬肉手法** 历代眼科手术方法之一。一般先以钩或针挑起胬肉，再用锄刀、眉刀等剥离攀睛之胬肉，然后剔割或剪除之。此法颇类现代手术。

**睁光瞎** 又名睛光瞎。为外眼无特殊改变而目盲者之俗称。参见青盲、暴盲等条。

**睛光瞎** 见睁光瞎条。

**瞑** (mìng明) (1) 闭目之意。《灵枢·寒热病篇》：“阴气盛则瞑目”。(2) 古代音义可与“眠”通。《灵枢·营卫生会篇》：“昼精而夜瞑”。

**瞋** (chēn嗔) 睁目之意。《灵枢·寒热病篇》：“阳气盛则瞋目”。

**胞肿** 痘名。俗称眼皮肿。除由眼睑疾病引起外，还可发于多种眼病及全身性疾病。实证一般表现为胞睑肿硬拒按，红赤焮痛或瘀血青紫，糜烂胶粘等；虚证常见胞睑浮肿，软而喜按，无红赤疼痛。若兼水湿者，皮色光亮。参见胞肿如桃、脾虚如球等有关各条。

**胞肿如桃** 痘症名。出《银海精微》。又名肿胀如杯、覆杯。常由风热毒邪攻目或脾胃积热所致。症见眼睑红赤焮肿，高起如桃李。可兼有白睛红赤，泪热羞明等。宜祛风清热，泻火解毒等法。内服可选用散热消毒饮（牛蒡子、羌活、黄连、黄芩、苏薄荷、防风、连翘）或仙方活命饮加减。外点金丝膏（黄连、龙胆草、大黄、黄柏、当归、山梔仁、乳香、硼砂、灯心、青竹叶、大枣、龙脑）。

**肿胀如杯** 见胞肿如桃条。

**覆杯** 见胞肿如桃条。

**目封塞** 痘症名。《诸病源候论》：“风邪毒气客于睑肤之间，结聚成肿，肿而睑合不开，故谓之封塞”。与胞肿如桃类同。参见该条。

**脾虚如球** 痘症名。出《证治准绳》第七册。又名胞虚如球、悬球。多由脾虚夹湿所致。症见胞睑浮肿，虚起如球，无赤痛，喜按。治宜以补脾益气为主，佐以除湿，可选用神效黄芪汤（蔓荆子、黄芪、人参、甘草、白芍药、陈皮）或补中益气汤加减。

**胞虚如球** 见脾虚如球条。

**悬球** 见脾虚如球条。

**针眼** 痘名。出《诸病源候论》。又名偷针、土疳。多由风热或脾胃热毒所致。其症胞睑边缘长小疖，初起形如麦粒，微痒微痛，继而焮肿拒按，相当于今之麦粒肿。治宜祛风清热，泻火解毒，消肿止痛等法。内服可选用仙方活命饮或通脾泻胃汤（麦冬、茺蔚子、知母、玄参、前仁、生石膏、防风、黄芩、天冬、大黄）加减。外治：“初起轻者，宜

用如意金黄散（大黄、黄柏、姜黄、白芷、南星、陈皮、苍术、厚朴、甘草、花粉）”（《医宗金鉴》）；风热盛者，“或于瘡顶上，重砭一针，（使）血出气泄”（《目经大氏》）。

**偷针** 见针眼条。

**土疳** 见针眼条。

**眼丹** 病名。病因及发病部位同针眼，但病情较重，整个胞睑漫肿赤痛，硬结拒按，常伴有寒热头痛等全身症状。《外科正宗》：“风多者则浮肿易消，热盛者则坚肿难散。初起宜用金黄散（见针眼条）敷之，有表证者，荆防败毒散，有里证者，清胃散加大黄利之。……脓成者，即针”。参见针眼条。

**眼胞痰核** 痘名。又名脾生痰核、目疣。多由脾胃蕴热与痰湿相结，阻滞经络而发。症见胞睑皮里肉外长一核状硬结，按之不痛，推之能移，初起如米粒，日久长大，眼胞重坠。相当于睑板腺囊肿。治宜化痰散结为主，内服化坚二陈丸（陈皮、半夏、白茯苓、生甘草、白僵蚕、川连、荷叶）或清胃汤（山梔仁、枳壳、苏子、石膏、川黄连、陈皮、连翘、归尾、荆芥穗、黄芩、防风、生甘草）加减；外用生南星加醋磨水，频涂患部。核大者应手术治疗。参见目疣条。

**脾生痰核** 见眼胞痰核条。

**目疣** 痘名。即眼胞痰核（详该条）。古人治本症除用药物外，尚用手术治疗。《原机启微》：“翻转眼睑，以小眉刀略破病处，更以两手大指甲捻之令出，则所出者，如豆许小黄脂也”。其法亦类现代手术。

**椒疮** 痘名。见《证治准绳》第七册。又名痘目。多因眼部受风热毒邪侵袭，加之脾胃素有积热，致眼睑脉络壅滞，气血失和而发。症见眼睑内面发生红色细小颗粒，状如花椒，自觉眼部沙涩痒痛，羞明流泪等。相当于今之沙眼。治之常用祛风清热，散瘀通络等法。可选服清脾凉血汤（荆芥、防风、赤芍、玄参、陈皮、蝉蜕、苍术、白藓皮、连翘、生大黄、厚朴、甘草、竹叶）或归芍红花散（当归、大黄、梔子仁、黄芩、红花、赤芍、甘草、白芷、防风、生地黄、连翘）；外点黄连西瓜霜眼药水（硫酸黄连素0.5克、西瓜霜5克、月石0.2克、硝苯汞0.002克、蒸馏水100毫升）。睑内颗粒累累成片者，当施剥法——以灯草或海螵蛸棒轻快磨擦患处。本症严重时可损害胞睑、黑睛等。属慢性传染性眼病。是常见的一种可以致盲的疾病。因之必须十分重视对本病的防治工作。

**痘目** 见椒疮条。

**倒睫拳毛** 痘症名。出李全善《医学纲目》。又名倒睫、拳毛、拳毛倒插。多由胃热肝风塞遏胞络所致。症见皮宽弦紧，睫毛内倒，触刺眼珠，涩痛流泪，羞明难睁等。古有拔除倒睫及夹睑等疗法，后者现已不用。今对倒睫少者可电解倒睫，内服清胃平肝祛风之剂；倒睫多，或兼胞睑内卷者，则应施行矫正手术。

**倒睫** 见倒睫拳毛条。

**拳曲** 见倒睫拳毛条。

**拳毛倒插** 见倒睫拳毛条。

**内急外弛之病** 痘症名。出《原机启微》。常因椒疮失治，脉络壅闭，胞睑失养，以致睑皮宽松，睑内紧急，睑缘睫毛亦随之倒入。本症内治效果欠佳。古代用夹睑法治之，

常有严重后遗症，现施行睑内翻矫正术。参见椒疮及倒睫拳毛等条。

**风赤疮痍** 痘名。见《秘传眼科龙木论》。又名风赤疮疾。“由脾脏风热蕴结，两睑似朱涂而生疮”（《沈氏尊生书》卷22），一般眼睑或睑缘红赤起疱及溃烂，痛痒并作。治以祛风清热为主，痒胜于痛者，以风邪为重，宜祛风解毒用五退散（蝉退、蛇退、蚕退、猪蹄退、芥穗、穿山甲、川乌、炙甘草）加减；痛胜于痒者，以热邪为重，宜清热凉血祛风，用加减四物汤（生地、苦参、薄荷、川芎、牛蒡子、连翘、天花粉、防风、赤芍、当归、荆芥）加减。

**风赤疮疾** 见风赤疮痍条。

**眼弦赤烂** 痘名。见《古今医统》。又名烂弦风、风弦赤烂等。多由脾胃蕴积湿热，复受风邪，风与湿热相搏，结于睑缘而发。症见胞睑边缘红赤溃烂，痒痛并作，还可睫毛脱落，甚至睑缘变形。相当于今之睑缘炎。内治法以祛风、清热、除湿为主。湿偏盛者，宜除湿汤（连翘、滑石、车前、枳壳、黄芩、川连、木通、粉甘草、陈皮、荆芥、白茯苓、防风）；风偏盛者，宜柴胡散（柴胡、防风、赤芍、荆芥、羌活、桔梗、生地、甘草）；热重者，宜用三黄汤（黄芩、大黄、黄连）加减。外治：局部可敷鸡蛋黄油膏（鸡蛋黄1～3枚熬油，制甘石、冰片各少许研细末，和匀涂患处）。

**烂弦风** 见眼弦赤烂条。

**风弦赤烂** 见眼弦赤烂条。

**眦赤烂** 痘名。又名眦帏赤烂。为眼弦赤烂之一种。“赤烂唯眦有之”（《证治准绳》第七册）。相当于今眦部性睑缘炎。参见眼弦赤烂条。

**眦帏赤烂** 见眦赤烂条。

**胎风赤烂** 指新生儿或婴儿患眼弦赤烂症。古人认为发病“皆因胎气风热之毒”（《古今医统》），即胎儿禀受热毒所致。参见眼弦赤烂条。

**睥翻粘睑** 痘名。出《证治准绳》第七册。又名风牵出睑、残风、地倾。常由胃经积热，肝风内盛，致使风痰湿热瘀滞睑络而成。此外，眼睑皮肤疮疡或外伤结瘢也可引起。其症“（眼）睥翻转贴在外睑之上，如舌舐之状”（《证治准绳》第七册），甚至不能闭合，眼部常感干燥，赤涩流泪，严重者黑睛生翳。相当于今之睑外翻。治疗以手术为主，药物为辅。内治常用祛风清热，化痰除湿，通络散瘀等法。

**风牵出睑** 见睥翻粘睑条。

**残风** 见睥翻粘睑条。

**地倾** 见睥翻粘睑条。

**脾肉粘轮** 痘名。又名两睑粘睛。多因风热上攻，热燥血涌，气血瘀阻而成，常见于椒疮重症。此外，烧伤及腐蚀性物质入目等亦可引起。症见“目内脾之肉与气轮相粘不开，难于转运”（《证治准绳》第七册）。相当于今之睑球粘连。内治宜祛风清热，散瘀通络等法。可选用排风散（桔梗、明天麻、防风、五味子、干蝎、乌风蛇、细辛、赤芍）或菊花通圣散（菊花、滑石、石膏、黄芩、桔梗、生甘草、牙硝、黄连、羌活、防风、川芎、当归、芍药、大黄、薄荷、连翘、麻黄、白蒺藜、芒硝、荆芥穗、白术、梔子）加减。严重者，可考虑手术治疗。

**两睑粘睛** 见脾肉粘轮条。

**上胞下垂** 病名。又名垂目、侵风、睑废。发病有先后天之分：先天性者，常由发育不全引起；后天性者，多因脾虚气弱，脉络失和，风邪客睑而成，亦可由外伤所致。症见上胞垂下，掩及瞳神，无力提起，妨碍视瞻。内治一般以补脾益气，祛风通络为主。可选用补中益气汤或人参养荣汤酌加僵蚕、全蝎、赤芍、牛膝等。还可配合针灸按摩等疗法。必要时可手术治疗。

**睑废** 见上胞下垂条。

**睢(suī)目** 病名，又名侵风。即上胞下垂。睢，指仰目而视，上胞下垂甚者，常藉助仰首使瞳神显露方能视物，故称睢目。《诸病源候论》：“五脏六腑之血气，皆上荣于目也，若血气虚则肤腠开而受风，风客于睑肤之间，所以其皮缓纵，垂覆于目，则不能开”。详上胞下垂条。

**侵风** 见睢目条。

**目痨** 痘症名。见《审视瑶函》。多因火毒郁结，邪热上攻所致。症见胞睑生疮，初起微痒微肿，渐致赤烂，甚至成脓，或伴寒热交作等。治疗一般宜清热消肿，泻火解毒。可选服加减四物汤（见风赤疮痍条）或仙方活命饮加减，外用眼疮药（青黛、黄柏、黄连、血竭、乳香）掺患处。

**眼胞菌毒** 痘名。由脾蕴湿热所致。症见眼胞内生出如菌，头大蒂小，渐长垂出，甚者眼翻流泪，亦致昏蒙（《外科正宗》）。治宜清热祛湿，内服凉膈清脾饮（防风、荆芥、黄芩、石膏、山梔、薄荷、赤芍、连翘、生地、甘草）或除湿汤（见眼弦赤烂条）；外以清凉圆（归尾、石菖蒲、赤芍、川连、地肤子、杏仁、羌活、胆矾）煎水洗。菌大经久不退者，可手术切除。

**鸡冠蚬肉** 痘名。见《世医得效方》。又名奚魁蚬肉。多由脾胃积热，肝风上冲所致。症见睑眦之内，瘀肉高起如鸡冠似蚬肉，渐渐长大，甚至可掩及全目。治以祛风泻热散瘀为主，宜先刺洗钩割，后服抽风汤（桔梗、大黄、车前子、细辛、芒硝、元参、防风）或石决明散（见宿翳条）加减。

**奚魁蚬肉** 见鸡冠蚬肉条。

**赤脉传睛** 痘症名。出《银海精微》。又名赤脉侵睛。多由心火上亢，肾水虚衰或三焦积热所致。症见赤脉呈多数细枝状自大眦或小眦发出（前者为大眦赤脉传睛，后者为小眦赤脉传睛）走传白睛，甚至黑睛。患者自觉眼部痒涩不适或生眵泪。治法：实证宜清热泻火，可用泻心汤（黄连、连翘、黄芩、大黄、荆芥、赤芍、车前子、薄荷、菊花）加减；虚火宜滋阴降火，可选用补心汤（知母、当归、桔梗、人参、连翘、远志、黄芪、甘草、生地黄、麦冬）或六味地黄丸加减。

**赤脉侵睛** 见赤脉传睛条。

**胬(ㄉㄩ)肉攀睛** 痘名。见《审视瑶函》。又名努肉攀睛、胬肉、攀睛、瘀肉攀睛、赤筋板睛等。多因心肺二经风热壅盛，气滞血瘀所致，亦可由阴虚火旺引起。症见淡赤胬肉由眦角发出，似昆虫翼状，横贯白睛，渐侵黑睛，甚至掩及瞳神，自觉碜涩不适，影响视力。相当于今之翼状胬肉。内治：常用疏风清热，滋阴降火，通络散瘀等法。可选用槐子胜奇散（白蒺藜、蝉蜕、谷精草、甘草、木贼、黄芩、草决明、菊花、山梔子、川芎、荆芥穗、羌活、密蒙花、防风、蔓荆子）或知柏地黄丸加赤芍、红花之类。外点磨障灵光

膏。胬肉侵及瞳神者可手术治疗。古代使用钩割法。

**胬肉** 出《千金翼方》。即胬肉攀睛，详该条。

**攀睛** 出《原机启微》。即胬肉攀睛，详该条。

**胬肉攀睛** 出《卫生宝鉴》。即胬肉攀睛，详该条。

**赤筋板睛** 出《异授眼科》。即胬肉攀睛，详该条。

**迎风流泪** 病症名。见《眼科捷径》。多由肝肾不足或肝经郁热所致。症见遇风流泪，甚者泪下如雨。可有流冷泪和热泪之分，详迎风冷泪和迎风热泪条。

**迎风冷泪** 病症名。出《古今医统》。多由肝肾两虚，精血亏耗所致。症见遇风则双眼冷泪频流。治宜补益肝肾，可选用左归丸或菊睛丸（甘菊花、巴戟、肉苁蓉、枸杞子）酌加川芎、白芷、蕤仁、五味子等。

**迎风热泪** 病症名。出《证治准绳》第七册。多由风热外袭，肝肺火炽或肝肾阴虚，虚火上炎所致。症见遇风则双眼热泪频流，可伴有目赤涩痛，怕热羞明等症。治法：实证宜疏风清热，平肝凉血，可选用银翘散或羚羊角散（羚羊角、羌活、玄参、车前子、山梔子、黄芩、瓜蒌、胡黄连、家菊花、细辛）；阴虚火炎者，宜滋阴降火，可用知柏地黄丸加减。

**漏睛** 病名。出《原机启微》。又名漏睛脓出、窍漏症、眦漏。由心经郁热或风热上攻内眦，结聚生疮成脓，按之则内眦穴处沁泌脓出，甚至内眦近鼻隆起一核，红肿焮痛拒按，可溃破流脓，甚至久不愈合，形成瘘管。相当于今之泪囊炎。内治宜疏风、清热、泻火、解毒等法。视热邪轻重不同，可选服竹叶泻经汤（柴胡、梔子、羌活、升麻、炙草、黄芩、黄连、大黄、茯苓、赤芍、泽泻、草决明、车前子、青竹叶）、白薇丸（白薇、石榴皮、防风、白蒺藜、羌活）或三黄汤（见眼弦赤烂条）；外治：局部可敷如意金黄散（见针眼条）或补漏生肌散（枯矾、轻粉、血竭、乳香），经年不愈者，应考虑手术治疗。

**漏睛脓出** 见漏睛条。

**窍漏症** 见漏睛条。

**眦漏** 见漏睛条。

**金疳** 病名。见《证治准绳》第七册。又名金疡、白睛粒起。由肺火亢盛引起。症见白睛表面隆起灰白色小泡样颗粒，形似细小玉粒，周围赤丝环绕，自觉眼部碜涩不适，畏光流泪。类今之泡性结膜炎。治宜清泻肺火，用桑白皮汤（桑白皮、泽泻、黑玄参、甘草、麦门冬、黄芩、旋复花、菊花、地骨皮、桔梗、白茯苓）加减。反复发作，经久不愈者，多属肺燥阴伤，宜养阴润燥，用养阴清肺汤加减。

**金疡** 见金疳条。

**白睛粒起** 见金疳条。

**流金凌木** 病症名。《目经大成》：“此症无甚大弊，但三处两处似膜非脂，从气轮（属肺金）而蚀风轮（属肝木），故曰流金凌木。状如胬肉攀睛，然色白而薄，位且不定”。类今之假性翼状胬肉。小者无须治疗，大者有的可考虑手术。

**白膜侵睛** 病名。见《审视瑞函》。多因肝肺热盛或阴虚火旺所致。症见黑白睛交界处出现灰白色小泡，并能侵至黑睛，严重时，小泡可融合成片，愈后遗留云翳。患眼畏光，刺痛流泪。病状常反复发作。类今之泡性角膜结膜炎。治法：实证宜泻肝肺之火，用

龙胆泻肝汤加桑白皮、地骨皮、玄参等；阴虚火旺者，宜养阴清热，用养阴清肺汤加石决明、草决明等。

**白涩症** 病名。出《审视瑶函》。俗名白眼。多因肺阴不足或肝肾阴虚，虚火上炎所致，亦可由湿热蕴结，火伏气分而发。本症眼部“不肿不赤，爽快不得，沙涩昏蒙”（《审视瑶函》），无明显外症。治法：养阴清热，可选服养阴清肺汤或十珍汤（生地、当归、白芍、地骨皮、天冬、知母、丹皮、麦冬、人参、甘草梢）加楮实子、女贞子、枸杞等；清热利湿，可用桑白皮汤（见金疳条）加减。

**火疳** 病名。见《证治准绳》第七册。又名火疡。因火毒上犯白睛，滞结为疳。症见白睛深部向外凸起暗红色颗粒，状如瘤子，逐渐长大，红赤疼痛，羞明流泪，视物不清，甚至影响瞳神、黑睛发生病变，严重者可失明。治法：以清热解毒，凉血散结为主，可内服洗心散（大黄、赤芍、桔梗、玄参、黄连、荆芥穗、知母、防风、黄芩、归尾）加减，外点五胆膏（熊胆、鲭胆、鲤胆、猪胆、羊胆、川蜜各等分，将胆、蜜入银铫或铜铫中，微火熬成膏，取起用磁盒藏之备用）。

**火疡** 见火疳条。

**白睛青蓝** 痘症名。又名目珠俱青。《证治准绳》第七册：“乃目之白珠变青蓝色也”。常出现于火疳症的后期，白睛病变处红肿消退，遗留紫蓝色或青灰色斑。参见火疳条。

**目珠俱青** 见白睛青蓝条。

**状若鱼胞** 痘症名。见《证治准绳》第七册。又名状如鱼脬、气胀。由热邪壅肺，气机不畅所致。症见“气轮肿起，不紫不赤，或水红，或白色，状若鱼胞”（《审视瑶函》），甚至白睛肿胀高于黑睛，从而掩没黑睛缘，可兼有赤涩疼痛。治宜清热泻肺，用泻白散或泻肺汤（羌活、黑参、黄芩、地骨皮、桑白皮、大黄、芒硝、甘草）。

**状如鱼脬** 见状若鱼胞条。

**气胀** 见状若鱼胞条。

**黄油症** 出《证治准绳》第七册。又名黄油障。因湿热而起，生于气轮，状如脂而淡黄浮嫩，不肿不疼，目亦不昏，故人不求治，无他患，至老只如此（《证治准绳》第七册）。类今之睑裂斑。

**黄油障** 见黄油症条。

**赤丝乱脉症** 痘症名。出《证治准绳》第七册。又名赤丝虬（qiú求）脉、白睛乱脉。多因受邪日久，白睛血络瘀滞所致。常见气轮丝脉赤乱，纵横分布，粗细疏密不等，自觉眼涩不爽，或微泪羞明。类今之慢性结膜炎。多见于椒疮、粟疮等或长期风沙烟尘刺激，嗜酒以及用眼过度等。治宜祛邪散瘀为主，根据病情辨证论治。

**赤丝虬（qiú求）** 见赤丝乱脉症条。

**白睛乱脉** 见赤丝乱脉症条。

**赤膜下垂** 痘症名。出《世医得效方》。又名垂帘障。由肝肺风热，脉络壅滞所致。症见黑睛上缘有细小血丝，似垂帘状渐次向下伸延，掩盖瞳神，甚至盖满黑睛，羞明流泪，沙涩疼痛，视力障碍。类今之砂眼角膜血管翳。治宜疏风清热、平肝退翳，内服石决明散（见宿翳条）加减，外点石燕丹（炉甘石、硼砂、石燕、琥珀、朱砂、冰片、麝香）。

**垂帘障** 见赤膜下垂条。

**血翳包睛** 痘名。出《古今医统》。又名红霞映日症、彩云捧日症。系肝肺风热壅盛，心火内炽，瘀血凝滞所致。多并发于椒疮，由赤膜下垂恶化而来。症见混厚血丝翳膜盖满睛，不能视物。类今沙眼角膜全血管翳。治宜清热泻火，凉血散瘀，内服归芍红花散（见椒疮条）或石决明散（见宿翳条）加减，外点石燕丹（见赤膜下垂条）。

**红霞映日症** 见血翳包睛条。

**彩云捧日症** 《目经大成》：“此症满风轮生障赤色，厚薄高低不等，痛涩莫敢开，视人则两眉紧斗，眵泪并流，且丝脉纵横，白睛亦红紫相映，故曰彩云捧日”。即血翳包睛，详该条。

**风火眼** 痘名。又名风热眼、火眼，俗称狗眵眼。由风热攻目而起。起病较急，双眼红赤疼痛，沙涩羞明，眵多泪热，可兼发热头痛等。相当于今之急性结膜炎。治宜疏风清热为主。内服驱风散热饮子（连翘、牛蒡子、羌活、苏薄荷、大黄、赤芍、防风、归尾、甘草、山梔仁、川芎）加减，外用蒲公英煎水薰洗，滴10%千里光眼液。本症发病急重者属暴风客热；热毒较盛，起病急剧，传染性强者，属天行赤眼。各详有关条。

**风热眼** 见风火眼条。

**火眼** 见风火眼条。

**暴风客热** 痘名。出《世医得效方》。因外感风热，眼部暴发赤热肿痛，沙涩羞明，热泪如汤，甚至胞肿难开，白睛浮肿高于黑睛，并有头痛鼻塞，恶寒发热等。治宜疏风清热，泻火解毒，可选服羌活胜风汤（白术、枳壳、羌活、川芎、白芷、独活、防风、前胡、桔梗、薄荷、荆芥、甘草、柴胡、黄芩）或泻肺饮（石膏、赤芍、黄芩、桑皮、枳壳、木通、连翘、荆芥、防风、梔子、白芷、羌活、甘草）加减，外治同风火眼，参见该条。

**天行赤眼** 痘名。出《世医得效方》。又名天行赤热，俗称红眼。由风热毒邪，时行疠气所致，暴发眼睑、白睛红赤浮肿，痛痒交作，怕热羞明，眵泪粘稠，甚至流淡红血泪，黑睛生翳等。传染性强，能造成广泛流行。相当于今之急性传染性结膜炎。治法：疏风散邪、清热解毒。可选用驱风散热饮子（见风火眼条）或龙胆泻肝汤加减，外治同风火眼（详该条）。本症具有传染性，应注意预防。对患者使用的手巾、面巾及接触过的器具要隔离消毒。

**天行赤热** 见天行赤眼条。

**红眼** 见天行赤眼条。

**色似胭脂症** 痘名。见《证治准绳》第七册。又名白睛溢血。多因热客肺经，肺气不清，致血热妄行，溢于络外。也有由剧咳、呕吐和外伤等引起者。症见白睛有不规则的片状鲜红色血斑，界线分明，眼部余无不适。治宜清肺散血，可用退赤散（桑白皮、甘草、牡丹皮、黄芩、天花粉、桔梗、赤芍、归尾、瓜蒌仁、麦门冬）加减。因外伤者，内服四物汤加桃仁、红花。因他病者，除病因治疗外，酌加通络散瘀之品。

**白睛溢血** 见色似胭脂症条。

**目飞血** 痘名。又名白睛飞血、赤脉贯布。《诸病源候论》：“足厥阴经脉之血气虚，而为风热所乘，故血脉生于白睛之上，谓之飞血”。俗称铺红。系指白睛赤丝血脉成片布散之候。常见于椒疮、粟疮、火疳等多种眼病。参见各条。

**白睛飞血** 见目飞血条。

**赤脉贯布** 见目飞血条。

**宿翳** 病症名。见《目经大成》。为黑睛病赤痛羞明等症消退后遗留之翳痕。相当于今之角膜瘢痕。内治宜细审体质，补虚泻实，明目退翳。可选用开明丸（羊肝、官桂、菟丝子、草决明、防风、杏仁、地肤子、茺蔚子、葶苈、黄芩、麦冬、五味子、蕤仁、细辛、枸杞子、青葙子、泽泻、车前、熟地黄）或石决明散（石决明、草决明、青葙子、梔子、赤芍、麦冬、木贼、荆芥、羌活、大黄）加减；外治可点七宝散。上述虽有若干治法，但翳久深厚者疗效不佳。

**云翳** 病症名。宿翳之呈片状，或似淡烟，或如浮云者，称云翳。一般以翳薄而浮，色白淡嫩，未遮掩瞳神者为轻，翳久深厚色黄，掩蔽瞳神者为重。详宿翳条。

**冰瑕翳** 病症名。又名冰瑕障。《证治准绳》第七册：“薄薄隐隐，或片或点，生于风轮之上，其色光白而薄，如冰上之瑕”。指宿翳之菲薄透明光滑者。详宿翳条。

**冰瑕障** 见冰瑕翳条。

**花翳白陷** 痘名。见《世医得效方》。又名白陷鱼鳞。由肝肺风热搏结于上所致。黑睛生白翳，如花瓣，似鱼鳞，中央低陷，白睛红赤，羞明泪热。类今之角膜溃疡。治宜祛风清热，泻火解毒。可选用新制柴连汤（柴胡、黄连、黄芩、赤芍、蔓荆子、山梔子、龙胆草、木通、甘草、荆芥、防风）、龙胆泻肝汤、泻肝散等加减。

**白陷鱼鳞** 见花翳白陷条。

**凝脂翳** 痘名。见《证治准绳》第七册。因风热毒邪外侵，肝胆实火内炽，风火毒邪搏结于上所致。黑睛生翳，色带鹅黄，状若凝脂，头眼剧痛，目赤羞明，泪热眵稠，发展迅猛，可溃穿黑睛，甚至失明。类今之化脓性角膜炎。治宜清肝泻火解毒，用四顺清凉饮子（当归身、龙胆草、黄芩、桑皮、车前子、生地黄、赤芍、枳壳、炙甘草、熟大黄、防风、川芎、川黄连、木贼草、羌活、柴胡）或龙胆泻肝汤加蒲公英、羚羊角、大黄、丹皮等。

**轮上一颗如赤豆** 痘名。见《证治准绳》第七册。又名风轮赤豆。<sup>多由肝经风热，气血瘀滞所致。常见于体弱小儿。</sup>症见黑睛上有颗粒突起，白睛一束赤脉直上黑睛绕布颗粒，故状如红豆。有抱轮红赤，羞明流泪。类今之束状角膜炎。治疗常用清热，<sup>泻肝</sup>，<sup>养阴</sup>等法。可用龙胆泻肝汤或甘露饮（天冬、麦冬、黄芩、枇杷叶、枳壳、<sup>石斛、生地黄、熟地黄、甘草、茵陈</sup>）加减。

**风轮赤豆** 见轮上一颗如赤豆条。

**混睛障** 痘名。见《审视瑶函》。又名混障症、气翳。由肝经风热或湿热，郁久伤阴，瘀血凝滞所致。症见一片灰白色混浊翳障，似磨砂玻璃样漫掩黑睛，严重时赤脉伸入，翳色暗红，视物不见，白睛红赤，抱轮暗红，刺痛流泪，羞明难睁。类今之角膜实质炎。内治：祛风平肝，散瘀退翳，宜地黄散（生地黄、当归、熟地黄、大黄、谷精草、黄连、白蒺藜、木通、乌犀角、玄参、木贼草、羌活、炙甘草）加减；养阴清热除湿，用甘露饮（见轮上一颗如赤豆条）重加土茯苓。外治：点磨障灵光膏。

**混障症** 见混睛障条。

**气翳** 见混睛障条。

**星** 痘症名。见陈士铎《石室秘录》。指黑睛所生星点状白翳。参见翳及聚星障条。

**聚星障** 痘名。见《证治准绳》第七册。由肝火内炽，风热外侵，风火相搏，上攻于目，或肝肾阴虚，虚火上炎引起。黑睛生翳，数颗聚群分布，抱轮红赤，沙涩疼痛，羞明流泪，严重者可成花翳白陷、凝脂翳等。治宜祛风清热或滋阴降火，用石决明散（石决明、草决明、青葙子、山梔子、麦冬、大黄、荆芥、木贼、羌活、赤芍）或海藏地黄散（大黄、熟地黄、玄参、沙苑蒺藜、防风、谷精草、黄连、生地黄、白蒺藜、犀角、蝉蜕、木贼草、甘草、羌活、当归身）。

**旋螺突起** 痘名。又名旋螺尖起、旋螺外障、翳如螺盖、螺盖翳。症见“乌珠高而绽起如螺”（《张氏医通》），色青白或带黑，重者可致盲。类今之角膜葡萄肿。一般由蟹睛结疤而来。参见蟹睛条。

**旋螺尖起** 见旋螺突起条。

**旋螺外障** 见旋螺突起条。

**翳如螺盖** 见旋螺突起条。

**螺盖翳** 见旋螺突起条。

**聚散障** 痘名。又名聚开障、星月聚散、浮萍障。多因肝肾阴虚，虚火上炎所致。症见黑睛生翳，“或圆或缺，或厚或薄，如云似月，或数点如星，痛则见之，不痛则隐，聚散不一，来去无时，或一月数发，或一年数发”（《证治准绳》）。治宜养阴清热，用生熟地黄丸（川牛膝、石斛、枳壳、防风、生地黄、熟地黄、杏仁、羌活、白菊花）或杞菊地黄丸。

**聚开障** 见聚散障条。

**星月聚散** 见聚散障条。

**浮萍障** 见聚散障条。

**蟹睛** 痘症名。见《世医得效方》。又名蟹睛疼痛外障、损翳。多由肝火上攻，黑睛翳溃或外伤所致。黑睛破损，黄仁从破口突出如珠，形似蟹眼，周围绕以白翳，眼痛剧烈，羞明泪出。相当于今之虹膜脱出。愈后遗留瘢痕。若黄仁神膏从破口大量涌出，多致失明。治法：初宜清肝泻火，用龙胆泻肝汤加减；日久赤痛减退者宜滋阴清火，用镇肾决明丸（石决明、菟丝子、五味子、知母、干山药、干地黄、知母）或知柏地黄丸。

**蟹睛疼痛外障** 见蟹睛条。

**损翳** 见蟹睛条。

**青黄牒出** 痘名。见《证治准绳》第七册。又名青黄凸出。系指眼之“风轮破碎，内中膏汁叠出”（《证治准绳》）。参见蟹睛条。

**青黄凸出** 见青黄牒出条。

**玉翳遮睛** 痘症名。出《银海精微》。又名玉翳浮满、玉翳浮睛。起病多因肝经风热，病久反复者又属肝肾不足。症见大片白翳盖满黑睛。治法：祛风清热，用明目菊花散（菊花、车前子、熟地黄、木贼、密蒙花、薄荷、连翘、白蒺藜、防风、荆芥穗、甘草、川芎）加减；滋养肝肾，用通明补肾丸（楮实子、五味子、枸杞子、人参、菟丝子、肉苁蓉、菊花、熟地黄、当归、牛膝、知母、黄柏、青盐）。无赤痛羞明者，类今之全角膜白斑，药难奏效。