

辨燈奇聞婦科卷十一

山陰陳士鐸遠公父原本

文守江南紀氏敬述

寧鄉

男先五建中氏

帶門

一下流白物如涕唾不止自然而下者甚則臭穢白帶也夫帶病俱是濕病以帶名者因婦人有帶脉不能約束故也帶脉通于什督任督病帶脉亦病帶脉止婦人有之所以束胞胎之系婦人無

帶脉則難以繫胎故帶脉弱胎易墮損傷帶脉胎必不牢然帶脉
損傷非獨跌閃挫氣已也行房過縱送飲酒出顛狂雖無疼痛其
中暗耗則白物自下故帶病師尼寡婦嫁女多處子少况脾氣虛
肝氣鬱濕氣侵火氣逼安得不成帶下白帶者濕盛火衰肝鬱脾
虛則脾土受傷濕土之氣下陷是以脾精不守不能化爲榮血交
白滑物由陰門而直下欲禁止不得宜大補脾胃氣少佐舒鬱使
風木不閉塞地中地氣自升于天上脾氣健濕氣自消方用完帶
湯白朮山藥兩甘草半下紅前子蒼朮紅陳皮荆芥紅人參紅白

難遽效或問前言助脾土今何補肝血絕不補脾不知芍藥乎肝
肝舒自不尅脾是補肝正所以扶脾又何必加參朮哉

一帶血色黑甚如黑汁其氣最腥人謂下寒極誰知火熱極乎火
色紅何成黑色不知火極似水假象也其症必然腹疼小便時必
如刀觸陰門必發腫面必紅久則黃瘦飲食兼人口必大渴飲涼
水少覺寬快此命門膀胱三焦火合胃火又旺四火同煎安得不
戴炭色不發往者以腎水與肺金之氣涓二不絕是以潤心濟胃
耳故飲水下胃但成帶下火結于下不炎上惟以泄火爲主火退

濕熱自舒用利水湯白朮石羔鉅大黃伏苓前子王不留行劉寄奴黃連炒枝子仁知母仁六劑全愈此方迅利殊不知救焚少緩火勢延燒不戢不止今用黃連石羔知母枝子寒涼泄火次大黃中迅速掃輪又得王不留劉寄奴利濕甚急俱無停住之機左朮苓車前速成功也

一帶下色黃寤如黃茶濃汁其氣帶腥人謂脾經濕熱誰知任脉濕熱乎夫任脉本不容水何濕氣入化黃帶不知帶脉橫生通于任二脉直上達唇齒唇齒間原有不斷之泉下灌任脉使任脉無

熱則口中津液盡化精入腎惟熱存下焦則不化精而化濕水
火紅今濕與熱合欲變紅不能化白不得煎熬成汁因變爲黃二
土色直水火合成丹邪水火合成帶世以黃帶爲脾濕熱單治脾
此故難痊也方用退黃湯山藥欠寔兩黃柏紅車前子紅白朮樹
四劑全愈此方白帶俱治但黃帶尤效蓋山藥欠寔專補任虛又
利水加白果引人任脈使捷效至用黃柏清腎火腎與任脈相通
同羣共濟解腎火卽解任脈熱

一帶下色青甚如綠豆汁稠粘不斷其氣亦腥人謂小腸濕熱誰

知肝經溫熱乎肝屬木色青帶下流綠豆汁明是肝病但肝最喜水溫亦水似非肝所惡何竟成青帶不知肝喜水惡熱以所惡合所喜必違其性矣肝性既違肝氣必逆氣上升溫欲下降兩相牽掣必停住中焦走帶脉從陰門出色青綠者正其乘肝氣也逆輕者熱必輕色青逆重者熱必重色綠似治青易治綠難然解肝火利膀胱水帶病自愈方用逍遙散加減伏苓白朮白芍紅甘草五原皮柴胡紅茵陳炒梔子紅四劑愈逍遙散解鬱何取治青帶如神蓋肝經溫熱留者因肝氣逆逍遙散最解肝逆二平濕熱難留

況茵陳利濕梔子清熱肝氣清涼青綠又何來乎此方之奇也倘
傳治青帶惟利濕清熱置肝氣于不問安有止帶之日哉

血枯門

一婦年未七二經先斷人謂血枯誰知心肝脾鬱乎凡血枯必死
此血閉也且經水乃天一之水出腎經至陰精有至陽之氣故色
紅似血非血以經水爲血千古之悞果是血何不名血水古聖呼
經水者以水出腎經名之也是經早斷必腎水衰涸何謂心肝脾
氣鬱蓋腎水生雖不由三經而腎非肝氣相通腎氣不能開非心

氣相交腎氣不能上非脾氣相養腎氣不能成一經鬱則氣不入
腎二氣卽閉塞不通況三經同鬱乎腎水足尚格二難出况腎氣
原虛何以攝精盈滿化經外泄此經閉似血枯耳必散三經鬱大
補腎仍補三經氣則精溢經自通用溫經湯熟地白朮而山藥當
歸紐生薑仁白芍沙參芩丹皮人參仁柴胡杜仲八劑經通一
月人健受孕此心肝脾腎同治妙在補水以通之散鬱以開之倘
徒補則鬱不開生火徒散則氣益衰耗精或用攻堅并辛熱之品
無益反害

一室女月經不來腹大如娘面赤赤白脉乍大乍小人謂血枯
經閉誰知鬼憑乎心邪則鬼來或夢裡求親目中相細或託戚屬
會歡或言仙于取樂久之精神僅供腹中邪二旺正衰必經閉血
枯欲導經邪據腹經難通欲生血邪飲精血唯長因成癆瘵至死
不悟悲乎宜先去邪後補正用蕩邪丹雷丸大黃紅桃仁三十當
歸丹皮虻生草紅一并穢物半桶再用調正湯二朮以仁虻供
苓紅陳皮甘草貝母紅四劑經漸行或疑鬼胎必傷血故血枯而
後經閉今墮其胎何不補血反補胃氣蓋鬼氣中人正虛可知且

血不驟生補氣自易生血二朮補陽氣陽旺陰自難犯倘服補血藥則陰以招陰恐胎雖下鬼氣必再種不若補陽氣使鬼難侵生血亦速

血崩

一血崩双目黑暗昏暈于地人謂火盛動血然此乃虛火世治血崩每用止瀉然虛火不補易于冲擊必隨止隨發終不能愈必須補中行止用固本止崩湯熟地白朮配參芪仁當歸杜黑姜末仁十劑不發倘畏藥重減半必不能止方妙補血更補氣不但補氣

且補火何也血崩至黑暗昏暈則血必盡去僅存氣一線耳若不
急補氣則有形血不能速生無形氣必且盡散故補血先補氣然
補氣不補血二不易生補血不補火血且凝滯不能隨氣速生况
乾姜引血歸經補中有收故並用

一老婦血崩症同前此不慎房帷也七二天癸絕宜閉關不洩卽
莖二了事未必腎火大動倘如少年浪戰必血室大開崩決而下
用當歸補血湯加味芪歸兩三七末仁桑葉汁四酒劑不發設再
犯已必重病補血湯氣血雙補三七根止血桑葉滋陰又收斂但

年老陰精既虧此方雖神恐難永遠以補精葉尚少服此後加自
木伍熟地兩山藥細麥冬仁比味紅服三月斷後

一受娠三月血崩胎墮人謂挫閃受傷誰知房事大過乎少婦行
房者常何血崩氣衰耳氣衰不耐久戰久戰必泄精多則氣又衰
不能抑血况久戰虛火內動精門不閉血室亦不閉胎必不固內
外齊動血又何能固自當補氣少佐止血用固氣湯參朮熟地伍
當歸杜仲仁伏苓甘草炙皮仁遠志仁比味計十劑愈此固氣兼
補血已去血速生將脫血盡抑凡因虛血崩皆效

一交感雖不如血崩然涓二不止未免氣血兩傷久必血枯經閉
此因前月水來貪歡交戰精冲血管也血管不可精傷受孕乃血
管已淨經來血正旺彼欲出精射之則血退縮既不受孕以成胎
勢必聚精而化血交感淫氣觸動舊日之積兩氣相感精欲出血
隨出須通胞胎氣引精外出益以填精補氣血管之傷可再補用
引精止血湯人參鹿皮紐白朮熟地兩伏苓仁前子炒黑荆芥三
黃補五里姜紅十劑不發用參朮補氣地朮補精二氣旺血管自
流動加苓前利水二利血竅自利加黃柏直人血管引出夙精加

荊芥引出敗血又益黑姜止血管之口此方實有調理曲折之妙故除由疾然必慎房事三月則破者不重損補者不再傷慎之

一甚鬱作渴

嘔吐酸血

崩以火治或時效時不效蓋肝氣結也肝

藏血氣結宜血結何反崩此肝性急氣結則更急二則血不藏法

宜開鬱然開鬱不平肝則肝氣大開肝火更熾血何能止用平肝

止血湯白芍

配歸朮

兩柴胡

紅三七

根末

丹皮

生地

紅甘草

荊芥

白朮

利腰

紅四劑愈妙

在

白芍

平肝

得柴胡

而鬱盡

解白朮

利腰

臍血

不積

在

任荊芥通經絡血自歸還丹皮涼骨髓熱生地清臟腑炎當歸三

七補中止血自鬱散血止

一跌仆升墜惡血下冲如血崩錯認血崩用止血適害之也手按
必疼痛久之瘀黃枯槁治須行血去瘀活血止痛血自止苟卽用
補澁瘀必內攻痛且不止新血不生舊血作祟用逐瘀止崩湯大
黃龜板紅生地可當歸紅芍紅丹皮紅只壳紅桃仁紅不必四
劑方活血佐下泄故逐瘀止血或疑跌仆升墜由外傷內雖不比
內傷重然既血崩內傷亦不輕何去瘀不顧氣不知本實未擬治
標是矣何必顧本補內

一每戰卽如血崩人謂胞胎有傷觸卽動血誰知子宮血海因熱不固乎了宮在胞胎下血海在胞胎上血海衝脉也衝脉寒血虧衝脉熱血沸血崩正衝脉熱然衝脉熱何必交戰始血來蓋脾健能攝血肝平能藏血也人未入房君相二火寂然不動雖衝脉熱血不外泄及戰子宮大開君相人齊動以鼓精房血海泛溢不可止過肝欲藏血而不能脾欲攝血而不得故經水隨交感至若聲應之捷必絕色三月用滋陰降火藥涼血海則終身之病可半載愈用清海丸熟地桑葉白芍白朮玄參斤一束皮石斛畝比味三麥