

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百八十四



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷一百八十四 明

周王朱橚 撰

諸氣門

上氣嘔吐

附論

夫上氣嘔吐者氣上而不下肺胃虛也肺脉起於中焦
環繞胃口寒氣乘於肺則上氣喘滿升降不利痰飲停
積中焦氣動於胃胃氣逆則嘔吐肺主於氣肺為邪所
乘則上氣此為腸內有熱胃間有寒寒從胃上乘於肺

與膈內熱相搏故乍寒乍熱而上氣上氣動於胃胃氣逆故令嘔吐也

方

紫蘇子湯

出聖濟總錄

治上氣嘔吐胃滿喘息不利

紫蘇子

半夏

湯洗七次去滑焙

五味子

桂

去粗皮

青橘皮

湯洗出白焙

杏仁

湯洗出皮尖雙仁焙各一兩

赤茯苓

甘草

炙各半兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半薑半分切同煎取七

分去滓溫服不計時候

胡椒丸

出聖惠方

治肺胃有寒上氣嘔吐胃滿不食

胡椒

葶藶

白朮

赤茯苓

去黑皮

陳皮

湯去白焙

甘草

炙剉

訶梨勒皮

去苗土各一兩

桂

去粗皮

訶梨勒皮

煨去核

人參

款冬花

乾薑

炮製各半兩

右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸生薑橘皮湯下

日三服不計時候

七氣湯

出聖濟總錄

治上氣食則吐逆

草豈蔻仁

生去皮

人參

赤茯苓

去黑皮

白朮

大腹皮

和皮對生

訶黎勒

煨去核各半兩

甘草

炙一分

右粗搗篩每服五錢水一盞煎至六分去滓溫服不

思食入生薑煎服

訶黎勒湯

出聖惠方

治上氣痰壅嘔吐喘促

訶黎勒

煨去核二兩

半夏

湯洗七次去滑焙三分

赤茯苓

去黑皮

陳皮

湯去白焙各一兩

甘草

炙對半兩

人參

前胡

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒黃各一兩

紫蘇莖葉

檳榔

白朮各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半生薑五片棗三枚劈破同煎七分去滓溫服不計時候

芫花散出聖濟總錄

治上氣嘔吐不止

芫花一兩醋炒肉苳蔻去殼剉檳榔剉各三枚

右為散每服一錢煨葱白一寸溫酒調下

半夏湯出聖濟總錄

治上氣嘔吐逆不食

半夏湯洗七次去滑一兩乾桑葉六兩乾薑炮一分

右粗搗篩每服三錢生薑五片水一盞煎六分去滓
稍熱溫服不拘時候

半夏湯 治上氣嘔吐不能下食

半夏

湯洗去滑七次焙三分

白朮

半兩

人參

一兩

桂

去粗皮

甘草

炙對

陳皮

湯浸去白焙各半兩

厚朴

去粗皮生薑汁炙香熟二兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半生薑五片棗三枚劈
破煎至七分去滓溫服日三

厭氣散 治上氣嘔逆及踈利過多虛氣上攻及短氣

少力氣噎悶

木香 人參

白茯苓

去黑皮

藿香葉

右為散每服二錢煎訖蘇木灰生薑湯送下再入銀
盞重湯煎五七沸溫服

人參散 治上氣嘔吐或胃中痰飲停積嘔吐

人參 白朮

剉炒各二兩

白茯苓

去黑皮一兩

甘草

炙剉

乾薑

炮各半兩

粟米

合一

右為散每服二錢用竹茹生薑湯調下

治上氣嘔吐

用芥子二升為末蜜丸如梧子大寅時井花水服下
七丸日二亦可作散空腹服之及用酒浸服并治臍
下絞痛

赤茯苓散 治上氣嘔吐脇胃滿悶不思飲食心神虛
煩

赤茯苓

一兩

陳皮

湯浸去白焙

訶黎勒皮

各三分

麥門冬

半兩去心

白朮

一兩

甘草

一分炙剉半夏

半兩湯洗七次去滑

杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右搗篩為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去滓溫服不拘時

枇杷葉散 治上氣嘔吐心胃滿悶痰滯不能飲食

枇杷葉一兩拭去毛炙微黃 檳榔 赤茯苓各一兩 高良薑半兩

陳橘皮一兩湯浸去白焙 前胡一兩去蘆 細辛三分 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去

滓溫服不拘時

橘皮散 治上氣嘔吐不能食

陳皮

一兩湯浸去白焙

紫蘇子

微炒

人參

一兩去蘆

赤茯苓

柴胡

去蘆各一兩

杏仁

一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為散每服三錢水一盞生薑半分棗三枚煎至六

分去滓溫服不計時候

人參散 治上氣胃中煩熱痰壅吐逆不能下食

人參

一兩去蘆

麥門冬

一兩去心

陳皮

湯浸去白焙

黃耆

剉

紫蘇莖葉

赤茯苓

枇杷葉

拭去毛炙微赤各一兩

訶黎勒皮半一兩 甘草半兩炙微赤剉

右為散每服三錢生薑半分棗三枚煎至六分去滓

溫服不計時候

白朮丸 治上氣胃中不和嘔吐不能下食虛弱無力

白朮 五味子 陳皮湯浸去白焙半兩 人參去蘆一兩

桂心一兩 白茯苓 沉香各一兩 厚朴一兩去粗皮塗薑汁炙香熟

紫蘇子微炒 草豆蔻去皮各一兩 枳實半兩麩炒微黃

右搗羅為末煉蜜和丸搗三二百杵如梧子大每於

食前薑湯送下三十丸

下氣止吐

用蓴菜和鯽魚作羹食之多食發痔

治噦氣

以燕窠中草燒令黑研水服方寸匕

治患哕

取羅勒汁服半合定各月用乾者煮之

治噦氣嘔逆

以仙人杖水煮服之

上噦氣

以柿蒂煮服之瘥

治噦氣

用古磚燒熱於患處熨之三五度瘥

上氣欬逆

附論

夫上氣欬逆者由肺臟虛弱感於風寒而成欬逆也欬則氣聚於肺致令肺脹心胃煩悶是為欬逆也皆邪氣

與正氣相搏正氣不得宣通阻逆行於咽喉之間邪氣動則作氣逆遂致奔上胃膈故謂之上氣欬逆也

方

芫花散 治上氣欬逆心滿喘嗽氣結胃中心煩不利

芫花

半兩醋拌炒令乾

桂心

三分

乾薑

半兩炮製剉

細辛

半兩

陳橘皮

三分湯浸去白穰焙乾

前胡

三分去蘆

赤茯苓

一兩

訶黎勒皮

三分

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去

滓溫服日進三四服

人參散

出聖惠方

治上氣咳逆喉中不利

人參

一兩去蘆

陳橘皮

三分湯浸去白穰焙

紫苑

一兩洗去苗土

赤茯苓

一兩

款冬花

三分

射干

一兩

細辛

三分

菖蒲

三分

杏仁

雙仁三分

湯浸去皮尖麤炒微黃

右為散每服五錢水一盞入生薑半分煎至五分去

滓溫服不拘時候

川椒丸

出聖惠方

治上氣欬逆胸滿多唾

川椒一兩去目及閉口者微炒去汗人參一兩去蘆款冬花三分

赤茯苓一兩乾薑半兩炮製對桂心一兩訶苑三分洗去苗土

附子半兩去皮臍製五味子三分白朮半兩

杏仁三分湯浸去皮尖雙仁麤炒微黃菖蒲三分細辛三分

右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧子大每服以溫生薑湯下三十丸日三四服

麥門冬丸出聖惠方治上氣欬逆心胃煩悶小便不利

麥門冬一兩半去心焙昆布三分洗去鹹味乾薑半兩炮製對細辛半兩