

欽定四庫全書

子部

保命集卷中



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

保命集卷二

和風

中國論

風

於熱

風者

金張元素撰

而數變行者動也風本

風者熱也叔和云熱

且以靜勝其躁是養血

虛其衛多下則損其榮

欽定四庫全書

保命集

一

汗下各得其宜然後宜治在經雖有汗下之戒而有中藏中府之說中府者宜汗之中藏者宜下之此雖合汗下亦不可過也仲景曰汗多則亡陽下多則亡陰亡陽則損其氣亡陰則損其形經曰氣血者人之神不可不謹養也初謂表裏不和須汗下之表裏已和是宜治之在經也其中府者面加五色有表證脉浮而惡風惡寒拘急不仁或中身之後或中身之前或中身之側皆曰中府也其治多易中藏者唇吻不收舌不轉而失音鼻

不聞香臭耳聾而眼瞽大小便秘結皆曰中藏也其治多難經曰六府不和流結為癰五藏不和九竅不通若外無留結內無不通必知在經也初證既定宜以大藥養之當順時令而調陰陽安藏府而和榮衛察病機審氣宜而少有不愈者若風中府者先以加減續命湯隨證發其表若忽中藏者則大便多秘澀宜以三化湯通其滯表裏證已定別無他變故以大藥和治之大抵中府者多著四肢中藏者多滯九竅雖中府者多兼中藏

之證至於舌強失音久服大藥能自愈也有中風濕者
夏月多有之其證身重如山不能轉側宜服除濕去熱
之藥治之不可用鍼可用灸今具六經續命湯方小續
命湯通治八風五痺痿厥等疾以一歲為總以六經為
別春夏加石膏知母黃芩秋冬加桂附芍藥又於六經
別藥隨證細分加減自古名醫不能越此

凡覺中風必先審六經之候慎勿用大熱藥烏附之類
故陽劑剛勝積燎原為消狂瘡腫之屬則天癸竭而榮

涸是以中風有此誠故經所謂邪風之至疾如風雨易
曰橈萬物者莫疾乎風若感之淺者留於肌膚感之深
者達於骨髓蓋禍患之機藏於細微非常人之豫見及
其至也雖智者不能善其後是以聖人之教下皆謂之
虛邪賊風避之有時故中風者俱有先兆之證凡人如
覺大拇指及次指麻木不仁或手足不用或肌肉蠕動
者三年內必有大風之至經曰肌肉蠕動命曰微風宜
先服八風散愈風湯天麻丸各一料為效故手大指次

指手太陰陽明經風多著此經也先服祛風滌熱之劑
辛涼之藥治內外之邪是以聖人治未病不治已病又
曰善治者治皮毛是止於萌芽也故初成者獲愈固久
者伐形是治未病之先也

中風之人如小便不利不可以藥利之既得自汗則津
液外亡小便自少若利之使榮衛枯竭無以制火煩熱
愈甚當候熱退汗止小便自行也兼此證乃陽明大忌
利小便須當識此中風之人能食者凡中風病多能食

蓋甲已化土脾盛故能食由是多食則脾氣愈盛土克
制腎水水虧則病增劇也病宜廣服藥不欲多食病能
自愈中風多食者風木也盛則克脾脾受敵求助於食
經曰實則夢與虛則夢取是也當瀉肝木治風安脾脾
安則食少是其效也中風之人不宜用龍麝犀珠譬之
提鈴巡於街使盜者伏而不出益使風邪入於骨髓如
油入麪莫能出也此之類焉若痰潮不省昏憤不知事
宜用藥下其痰涎故風者百病之長庸可忽諸

小續命湯

麻黃

去節

人參

黃芩

各一兩

芍藥

防己

桂

川芎

各一兩

防風

一兩半

附子

半兩

杏仁

甘草

各一兩

右除附子杏仁外搗為麤末後入二味令勻每服五

七錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓稍熱服食前

凡中風不審六經之加減雖治之不能去其邪也內經

云開則淅然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以加減

續命湯隨證治之

中風無汗惡寒麻黃續命主之

麻黃

防風

杏仁

依本方添加一倍宜鍼太陽至陰出血崑崙舉蹻

中風有汗惡風桂枝續命主之

桂枝

芍藥

杏仁

依本方加一倍宜鍼風府已上二證皆太陽經中

風也

中風無汗身熱不惡寒白虎續命主之

石膏

知母

一料中各加二兩

甘草

依本方加一倍

中風有汗身熱不惡風葛根續命主之

葛根

二兩

桂枝

黃芩

依本方加一倍

宜鍼陷谷刺厲兌鍼陷谷者去陽明之賊刺厲兌者瀉陽明經之實也 已上二證陽明經中風也

中風無汗身涼附子續命主之

附子

加一倍

乾薑

加一兩

甘草

加三兩

宜刺隱白穴去太陰之賊也此一證太陰經中風也
中風有汗無熱桂枝續命主之

桂枝

附子

甘草

依本方
加一倍

宜鍼太谿此證少陰經中風也

中風六證混淆繫之於少陽厥陰或肢節攣痛或麻木
不仁宜羌活連翹續命主之

小續命

八兩

加羌活

四兩

連翹

六兩

古之續命混淆無六證之別今各分經治療又分經鍼

刺法厥陰之井大敦刺以通其經少陽之經絕骨灸以引其熱是鍼灸同象法治之大體也

中風外無六經之形證內無便溺之阻格知血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養血而筋自榮大秦朮湯主之

秦朮

兩三

甘草

兩二

川芎

兩二

當歸

兩二

白芍藥

兩一

細辛

兩半

川羌活

防風

黃芩

兩各一

石膏

兩二

吳白芷

兩一

白朮

兩一

生地黃^{一兩}

熟乾地黃^{一兩} 白茯苓^{一兩}

川獨活^{二兩}

右一十六味剉每服一兩水煎去滓溫服無時如遇
天陰加生薑煎如心下痞每兩加楮實一錢同煎
中風外有六經之形證先以加減續命湯隨證治之內
有便溺之阻格復以三化湯主之

厚朴

大黃

枳實

羌活^{各等分}

右剉如麻豆大每服三兩水三升煎至一升半終日
服之以微利為度無時法曰四肢不舉俗曰癰瘕故

經所謂太過則令人四肢不舉又曰土太過則敦阜
阜高也敦厚也既厚而又高則令除去此真所謂膏
梁之疾非肝腎經虛何以明之經所謂三陽三陰發
病為偏枯痿易四肢不舉王注曰三陰不足則發偏
枯三陽有餘則痿易易為變易常用而痿弱無力也
其治則瀉令氣弱陽衰土平而愈或三化湯調胃承
氣湯選而用之若脾虛則不用也經所謂土不及則
卑陷卑下也陷坑也故脾病四肢不用四肢皆稟氣

於胃而不能至經必因於脾乃不得稟受也令脾不能與胃行其津液四肢不得稟水穀氣日以衰脉道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉其治可補十全散加減四物去邪留正

愈風湯中風證內邪已除外邪已盡當服此藥以行導諸經久服大風悉去縱有微邪只從此藥加減治之然治病之法不可失其通塞或一氣之微汗或一旬之通利如此為常治之法也久則清濁自分榮衛自和如此

初覺風動服此不致倒仆

羌活

甘草

防風

蔓荊子

川芎

細辛

枳殼

人參

麻黃

甘菊

薄荷

枸杞子

當歸

知母

地骨皮

黃耆

獨活

杜仲

吳白芷

秦艽

柴胡

半夏

前胡

厚朴

熟地黃

防己

各二兩

茯苓

黃芩

各二兩