

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷三十三



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

本草綱目卷三十三目錄

果之五

蔬類九種

內附一種

甜瓜

嘉祐瓜蒂

西瓜

日用

葡萄

本經

蓰蓰

綱目即野葡萄

獼猴桃

開寶即藤梨

甘蔗 別錄

沙糖 唐本

石蜜 唐本

刺蜜 拾遺
補齊附

右附方舊十二新四十

果之六 水果類六種
外附二種

蓮藕 本經

紅白蓮花 拾遺

芡實

別錄
即菱

芡實

本經
即雞頭

烏芋

別錄
即勃薺

慈姑

日華

附錄諸果

綱目二十一種拾遺一種
諸果有毒並另附於末

津符子

必思荅

甘劍子

楊搖子

海梧子

木竹子

槽罌子

羅晃子

檐子

夫編子

白緣子

繫彌子

人面子

黃皮果

四味果

千歲子

侯騷子

酒杯藤子

蔞子

山棗

隈夫

以上俱
綱目

靈牀上果子

拾遺

諸果有毒

拾遺

右附方舊十五新六十三

本草綱目卷三十三目錄

欽定四庫全書

本草綱目卷三十三

西瓜

果之五內類一種

甜瓜

校正

釋名

瓜

時珍曰

甜之類也

是也供菜者為菜瓜

其子曰新其肉曰新其附曰環謂脫花處也其蒂曰

明李時珍撰

欽定四庫全書

本草綱目

一

寔謂繫蔓處也禮記為天子削瓜及瓜祭皆指果瓜也本草瓜蒂亦此瓜之蒂也

集解

別錄曰瓜蒂生嵩高平澤七月七日采陰乾頌曰瓜蒂即甜瓜蒂也處處有之園圃所蒔有青

白二種子色皆黃入藥當用早青瓜蒂為良時珍曰甜瓜北土中州種蒔甚多二三月下種延蔓而生葉大數寸五六月花開黃色六七月瓜熟其類最繁有團有長有尖有扁大或徑尺小或一捻其稜或有或無其色或青或綠或黃斑糝斑或白路黃路其瓢或白或紅其子或黃或赤或白或黑按王禎農書云瓜品甚多不可枚舉以狀得名則有龍肝虎掌兔頭狸首羊髓蜜筒之稱以色得名則有烏瓜白團黃瓠白瓠小青大斑之別然其味不出乎甘香而已廣志惟以遼東燉煌廬江之瓜為勝然瓜州之大瓜陽城之御瓜西蜀之溫瓜永嘉之寒瓜未可以優劣論也甘肅甜瓜皮瓢皆甘勝饅蜜其皮暴甘猶美浙中一種

陰瓜種于陰處熟則色黃如金膚皮稍厚藏之至春食之如新此皆種藝之功不必拘以土地也甜瓜子曝裂取仁可充果食凡瓜最畏麝氣觸之甚至一蒂不收

瓜瓢氣味甘寒滑有小毒

大明曰無毒思邈曰多食發黃疸令人虛羸多忘解

藥力病後食多或反胃脚氣人食之患永不除也說曰多食令人陰下濕痒生瘡動宿令癰癖病破腹發虛熱令人惺惺氣弱脚手無力少食則可龍魚河圖云凡瓜有兩鼻兩蒂者殺人五月瓜沉水者食之得冷病終身不瘥九月被霜者食之冬病寒熱與油餅同食發病多食瓜作脹者食鹽花即化弘景曰食瓜多即入水自漬便消時珍曰張華博物志言人以冷水漬至膝可頓啖瓜至數十枚漬至項其啖轉多水皆作瓜氣也則水浸消瓜亦物性也瓜最忌麝與酒凡食瓜過多但飲酒及水服麝香尤勝於食鹽漬

也水主治止渴除煩熱利小便通三焦間壅塞氣治口

鼻瘡嘉祐暑月食之永不中暑宗

發明

宗奭曰甜瓜雖解暑氣而性冷消損陽氣多食未有不失利者夏月多食深秋作痢最為難治

惟以皮蜜浸收之良皮亦可作羹食弘景曰凡瓜皆冷利早青者尤甚熟瓜除瓢食之不害人時珍曰瓜

性最寒曝而食之尤冷故稽聖賦云瓜寒於曝油冷於煎此物性之異也王冀洛都賦云瓜則消暑蕩煩

解渴療饑又奇效良方云昔有男子病膿血惡痢痛不可忍以水浸甜瓜食數枚即愈此亦消暑之驗也

瓜子仁修治

毀曰凡收得曝乾杵細馬尾篩篩過成粉以紙三重裹壓去油用不去油其力

短也西瓜氣味甘寒無毒主治腹內納聚破潰膿血

子仁同

最為腸胃脾內壅要藥

別錄

止月經太過研末去油水

調服

藏器

血泛經過

炮灸論序曰

炒食補中宜人

孟詵

清肺潤

腸和中止渴

時珍

附方

舊一

口臭

用甜瓜子杵末蜜和為丸每旦漱

口後含一丸亦可貼齒

千金

腰

腿疼痛

甜瓜子三錢

空心酒下

日三

壽域神方

腸癰已成

小腹腫痛

小便似淋

或大便難澀

下膿用甜瓜子一

合當歸炒一兩蛇退皮一條

咬咀每服四錢水一盞

半煎

一盞食前服利

下惡物為妙

聖惠

瓜蒂

本經上品

釋名瓜丁

千苦丁香

形象修治

毀曰凡使勿

用白瓜蒂要

取青綠色瓜氣足時其蒂自然落在蔓上采得繫屋
東有風處吹乾用宗奭曰此甜瓜蒂也去瓜皮用蒂
約半寸許曝極乾臨時研用時珍曰按唐璠云甜瓜
蒂以團而短瓜團瓜者良若香甜瓜及長如瓠子者
皆供菜之瓜具
氣味苦寒有毒大明曰無毒 主治大水身
蒂不可用也

面四肢浮腫下水殺蠱毒欬逆上氣及食諸果病在

胸腹中皆吐下之本經去鼻中瘕肉療黃疸別錄治腦寒

熱艱眼昏吐痰大明吐風熱痰涎治風眩頭痛癰瘡喉

痺頭目有濕氣時珍得麝香細辛治鼻不聞香臭好古

發明張機曰病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮
胸中痞噎氣上衝咽喉不得息者此為胸中有

寒也當吐之太陽中膈身熱頭痛而脈微弱此夏月傷冷水水行皮中也宜吐之少陽病頭痛發寒熱脈緊不大是膈上有痰也宜吐之病胸上諸實鬱鬱而痛不能食欲人按之而反有濁唾下利日十餘行寸口脈微弦者當吐之懊憹煩躁不得眠未經汗下者謂之實煩當吐之宿食在上脘者當吐之並宜以瓜蒂散主之唯諸亡血虛家不可與瓜蒂散也成無己曰高者越之在上者涌之故越以瓜蒂香豉之苦涌以赤小豆之酸酸苦涌泄為陰也杲曰難經云上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死此飲食內傷填塞胸中食傷太陰風木生發之氣伏于下宜瓜蒂散吐之素問所謂本鬱則達之也吐去上焦有形之物則本得舒暢天地交而萬物通矣若尺脈絕者不宜用此恐損真元令人胃氣不復也宗奭曰此物吐涎甚不損人全勝石綠礞砂輩也震亨曰瓜蒂性急能損胃氣胃弱者宜以他藥代之病後產後尤宜深戒

時珍曰瓜蒂乃陽明經除濕熱之藥故能引去胸脘痰涎頭目濕氣皮膚水氣黃疸濕熱諸證凡胃弱人

及病後產後用吐藥皆宜加慎何獨瓜蒂為然

附方

舊七新十四

瓜蒂散

治證見上其方用瓜蒂二錢半熬黃赤小豆二錢半為末每用

一錢以香豉一合熱湯七合煮糜去滓和服少少加之快吐乃止仲景傷寒論

太陽中暈

身熱頭痛而脈微弱此夏月傷冷水水行皮中所致瓜蒂二七箇水一升煮五合頓服取吐金匱要畧

風涎暴作

氣塞倒仆用瓜蒂為末每用一二錢膩粉一錢七以水半合調灌良久涎自出不出

含沙糖一塊下咽即諸風諸癇

諸風膈痰諸癇涎涌用瓜蒂炒黃為末量

人以酸漿水一盞調下取吐風癇加蠍稍半錢濕氣腫滿加赤小豆末一錢有虫加狗油五七點雄黃一

錢甚則加荒花半錢立吐
東垣活法機要 風癰喉風 瘰癧及遍身風

證不拘大人小兒此藥不大吐逆只出涎水瓜蒂為
末壯年服一字老少半字早晨并華水下食頃含

沙糖一塊良久涎如水出年深者出墨涎有塊布水
上也涎盡食粥一兩日如吐多人困甚即以麝香泡

湯一盞飲之即急黃喘息 心堅硬欲得水喫者瓜
止 經驗後方 帶二小合赤小豆一合研

末暖漿水五合服方寸七一炊久當吐 遍身如金
不吐再服吹鼻取水亦可 傷寒類要

四十九枚丁香四十九枚乾鍋內燒存性為末每熱
用一字吹鼻取出黃水亦可揩牙追涎 經驗方

病發黃 瓜蒂為末以大豆許吹鼻中輕則半日
重則一日流取黃水乃愈 千金翼 黃疸

癰黃 並取瓜蒂丁香赤小豆各七枚為末吹豆許入
鼻少時黃水流隔日一用瘥乃止 孟詵食