

圓機堂纂集痘科良方

蜀漢安謝曦曉村先生編輯

王雲錦小屏校訂
男懷慶榮緒校字

○收靨證治

萬密齋曰痘瘡成膿之後鮮明肥澤飽滿堅實以手拭之瘡頭微焦硬者此欲靨也大小先後以漸收靨不失太急不失太緩已靨者痂殼周圍無有突凸陷凹者乾淨無滯濕破濺者此爲正靨否極泰來之象也

凡痘瘡收靨不可以日數拘也大抵痘本稀元氣實者自然易出

易屬若痘本稠密元氣虛者難出難屬也只要先後有次疾徐得中飲食如常便無他證如收太急者毒邪未盡煎熬津液以致速枯非正收也必爲目病爲癰毒爲怪疾甚則天亡微則殘廢宜微利之以徹其毒當歸九主之如收太遲者中氣已虛脾胃太弱不能榮養肌肉使之完就以致潰爛內服十全大補湯外用敗草散視之

錢氏云五七日痂不焦是內發熱蒸於外故不得焦痂也宜宣風散導之用生犀磨汁解之必著痂矣

劉涓子訣云痘發如膿窠不肯靨者但調砂糖水與喫劉提點

云亦曾試用但後來結癰痕白

痘瘡膿漿已成毒氣已出又復發熱者俗呼爲乾漿不必施治

聶久可曰此時漿滿或爲寒所薄一時痘俱紫黑如紫葡萄色不必驚恐急以上好肉桂磨湯或煎湯服之立見如舊

有寒戰咬牙者此真氣外發而內虛寒也宜大建中湯補之

○痰多不食

聶久可曰痘出八九日膿漿充滿顏色蒼蠟者上也若無他證勿藥可也然痘出稠密而膿不甚滿者至此時飲食多減痰涎多盛宜用養胃開痰湯

養胃開痰湯

人參 白朮 茯苓 甘草炙 山查肉 連子去心 山藥各五

陳皮 半夏 桔梗

生薑一片同煎服 渴者去半夏加麥冬八分五味子九粒

吐逆者加藿香砂仁各三分

灌膿時忌用尤苓半夏恐其燥津液膿漿不行也收靨時可用

○當麝不麝

聶久可曰痘至九日十日之間膿滿漿足而色蒼蠟者必發熱薰蒸此回漿之候也俗謂之燒漿又謂之乾漿蓋真陽運化其水

自消灤而收靨矣若及時回漿當靨而不靨其人身涼而手足
冷脉來沉遲者此元氣不足虛寒證也雖大補氣血而助之收
結宜用溫表調中湯或用回漿散主之

溫表調中湯

黃耆

蜜炒二錢

人參

白朮

茯苓

官桂

大川芎

當歸身

炙甘草

乾薑

炒各一錢

防風

白芷

丁香

附子

製各五分

生薑一片同煎服

回漿散

此大補收斂之方也

何首烏

白芍

黃耆

人參

甘草

白朮

茯苓

生薑一片水煎服

其有發熱蒸蒸而當靨不靨者毒氣未解也退其熱則痘自收宜用清表解毒湯或甘露回天散主之

清表解毒湯

地骨皮

麥冬

花粉

酒炒各八分

牛蒡

炒連翹

當歸

各五分 柴苓

澤瀉

酒炒

木通

甘草

生用各四分

黃芩

酒炒

水煎服

甘露回天散

能令熱退痘收亦好但毒盛者恐未必效

沙糖

半盞

百沸湯調溫服

一瘕血氣本虛多服補劑以漸起發灌膿將收靨而不收靨微發
熱者當與補藥中少加涼藥可也若謂將靨去補劑而竟與涼
藥或用下利藥令其速靨是令其速斃也宜用象牙散主之
象牙散

人參

白朮

黃耆

蜜炒各二錢

甘草

七分

茯苓

一錢五分

何首烏

一錢

象牙

右糯米一撮棗二枚水煎送下象牙末一錢

一收靨太遲元氣脾胃虛弱不能榮養肌肉使之完就或有潰爛
者宜十全大補湯

四苓散

治痘自頭靨至腰而下身數日不靨者血熱在下也小便閉澀
白朮 茯苓 芡苓 澤瀉 加黃芩 黃連 滑石 木通
水煎服

○潰爛漿流

一痘當漿回而不結痂反成潰爛流漿不已合皮脫去者此倒靨
也急用保元湯加當歸牛蒡子連翹薄荷桂木香防風主之外用
敗草散白龍散敷之

一痘已成膿過期不靨者以致潰爛膿汁淋漓血氣虛弱宜十全
大補湯外用敗草散白龍散視之

敗草散

多年屋上爛茅草擇淨者爲末摻之

白龍散

乾牛糞在雨露中多日色畧白者火煨成灰以絹袋之與瘡上
徧撲席褥上飾些靦睡亦好

睡肌散

地骨皮

黃連

炒

黃柏

炒

五倍子

炒

生甘草

等分

爲末摻之

綿繭散

蚕繭不拘多少以白礬入內填滿燒令汁出成灰爲末摻之

天水散

滑石粉

六兩甘草末

生研一兩

右細末和勻蜜水調塗痘瘡上

百花膏

石蜜不拘多少畧用湯和時時以鷺翎掃之瘡痂亦易落無痕

生肌散

治瘡痂已落因抓破灌膿濕爛者

黃連

黃柏

大黃

赤石脂

各錢一

乳香

炮

末藥

炮

雄黃

兒茶

血結

黃丹

龍骨

煨各五分

枯礬

二分

麝香

冰片

各一分

右爲細末摻之立效

○倒靨

萬密齋曰痘子初出磊落成箇後來長大作膿始相連串外雖相串皮下猶一箇是一箇至於結痂腫消膿乾現出初來本形所以收藏歛束要完全堅厚復成箇數爲貴或根脚相通皮肉盡串者結痂之時亦要乾淨無有滯濕及濺破者次也若未成痂者潰爛已成痂者只是嫩皮此倒靨也

痘毒當靨不靨復入於裏者謂之倒靨此死證也元氣素怯又不食常自利者陳氏木香散異功散死中求活聖藥也如原無泄

瀉大便秘今添腹脹喘呼此毒盛薄蝕元氣復入於裏宜急下之排毒散若不急下則腸胃不通榮衛不行益加喘滿躁悶而死矣若毒入裏忽然自利者此人脾胃素強毒氣難留故自利須看利下之物如利痂皮膿血者毒氣得出爲順不可止之待利盡膿血自愈如利水穀者此毒氣反驅水穀脾胃虛不能制之其證爲逆不可治也

排毒散

大黃

錢五

白芷

沉香

木香

錢各二

穿山甲

炒焦

當歸稍

錢五

右爲末看人大小虛實多寡用之長流水煎沸調服

如痘瘡破損潰爛者復腫灌作瘡不致乾枯原無痘處復出一層如初出之狀亦以漸起作膿者此裏氣充實毒不得入猶在於表未成倒靨逆中之順也但痘子重出一番必其人能食大便堅足以勝其再作之毒如食少大便濇者用十全大補湯人參白朮散肉豆蔻丸主之蓋病久氣虛惟利溫補不可再解毒也

○不靨悶亂哽氣腹脹

薛立齋曰陳文宿先生云痘瘡十一日至十二日當靨不靨身熱悶亂不寧臥則哽氣腹脹泄瀉寒戰咬牙急用異功散加木香當歸以救陰陽表裏助其收靨竊謂前證手足冷屬脾胃虛寒

者宜異功散若脾胃微弱者用

五味異功散

人參 白朮 茯苓 炙甘草 陳皮 加木香

薑棗同煎服

聶久可曰當屬時或忽然腹痛其痛着在中脘此熱毒凝滯瘀血作痛也宜用消毒散血湯

消毒散血湯

牛蒡子

白芍

生用

桃仁

炒去皮尖研爛

大黃

酒炒各一錢

紅花

酒洗

沒藥

乳香

俱用燈心同研藥煎投入

水煎服一服立止

○泄瀉

收靨之時忽爾洞泄水穀者此中氣暴虛不能禁固水穀或毒氣乘虛入裏欲作倒靨宜陳氏木香散異功散豆蔻丸主之利止者佳利不止者陽脫而死

木香散

異功散

肉豆蔻丸散

○收靨吉凶

痘疹片玉

卷三

收靨類

世渴

收靨吉凶

八

萬密齋曰收靨之時人心怠忽居處飲食不知禁忌以致變生異證滔滔皆是也

痘瘡收靨圓淨堅厚如螺靨者上也頭穿膿出堆聚成痂如雞矢者次也皮破膿出痂薄如紙者又次也皮爛膿潰不成痂皮膿汁腥臭者斯爲下矣如已過期譬如瓜果熟久則爛此造化之常還作順看若未及期則爲斑爛乃逆候也變倒靨而已

結靨時色轉蒼蠟一二日從口唇四邊結靨由胸腹收至兩眼然後腳背和額上一齊結靨落而愈者吉

結靨時遍身臭爛如搭餅臭不可近目中無神者死