

良改
嵩厓尊生

上海錦章圖書局印行

○中身部

○心分

心胸下謁髻。即心之位。

包絡位居心之四旁。以捧護心。即兩乳之中膻中穴是也。

凡筋脈由胸下膈。自膈貫胸。如肺心脾肝膽腎包絡七經筋脈皆從此過。三焦脈亦布膻中。故腎病主心煩心痛。

○心分諸病論

心痛。心包絡與胃脘痛。實不在心也。心為君主。不受邪。或君火衰甚。大寒觸犯心君。亦或汚血冲心。素無心病。卒然大痛。無聲咬牙。噤齒。舌青氣冷。汗出不休。手足青過節。冷如冰。是為真心痛。旦發夕死。夕發旦死。不忍坐視。用猪心煎湯去渣。入麻黃肉桂乾薑附子。直至心經寒散。亦可死中求生。如但見爬床搔席面無青色。四肢不厥痛亦不至無聲。即非真心痛。由包絡捧心。或寒或痰或蟲或食。上于包絡脂膜緊急作痛。宜各從其類審脈用藥。必應湯玄胡為君。香附艾灰歸身砂仁生薑。亦有怵惕思慮傷神。涸血而致者。其症喜悲不時時眩仆。安神養血自愈。補心湯茯神柏仁遠志歸身生地人參甘草稍。下膻中。即為胃脘痛。胃脘上口名賁門。與心相連故也。辨確方可施治。

心煩。心血虛有熱。則心煩。宜清熱生津液。滌煩湯。薄荷葉為君。麥冬五味生地茯神遠志竹葉棗仁甘草圓肉。

煩躁有辨。內熱心煩為煩。外熱身體躁亂為躁。煩屬熱。躁是無根之火。屬寒。諸虛煩熱。與傷寒相似。但不惡寒。身頭皆不痛。脈不緊數。不可汗下。誤攻必害。

嵩崖尊生書

岳生堂纂著

人參竹葉湯

陳皮湯

竹茹湯

遠志湯

小豆湯

○煩躁備用諸方

身不熱頭昏口乾不寐為心虛煩 竹葉一握 人參 甘草一錢 半夏二錢 石膏 麥冬各二錢 粳米

或去石膏加茯苓小麥

煩熱誤發煩益甚致嘔 陳皮半錢 炙草五錢 人參五錢 竹茹六錢

頭疼氣短內熱心悶亂 麥冬 小麥各二錢 炙草一錢 人參五錢 茯苓各一錢 半夏二錢 竹茹六錢

煩熱卧不甯 遠志 黃耆 當歸 麥冬 棗仁 石斛各一錢 人參 茯苓各七錢 甘草五錢

甚者加竹葉知母

憂思成煩虛勞病 小草 黃耆 當歸 麥冬 石斛各二錢 棗仁一錢 人參一錢 炙草五錢

腎虛心煩躁下部瘦弱小便病 八味地黃丸

○驚悸怔忡病論

驚耳聞大聲目擊異物遇險臨危觸而成驚心血一虛神氣失守神去則舍空舍空則鬱而成痰多致目睛不轉不能言短氣自汗多異夢忽驚覺成多魔寸脈止而復來曰動脈

悸心下築築然跳動或水衰火旺或水停心下或汗吐後正氣虛極證狀不一總不外傷心火動火鬱痰生

怔忡驚然跳動有時而作為驚悸若心下怏怏動搖不得安甯無時不作名曰怔忡或怒傷肝驚傷膽始則驚悸久則心虛停水水氣乘心火畏之故然亦或急欲富貴戚戚貧賤或遇事煩冗用心太勞甚至一經思慮便動皆心血不足所致治法養心血調心氣清熱熱痰清鎮湯茯苓神遠志菖蒲棗仁柏仁石斛當歸生地貝母麥冬膽星其犀角硃砂琥珀龍齒牛黃麝香等病深參用不可概用心火熾則用安神丸硃砂五錢黃連六錢生地一錢五分炙草當歸各二錢五分

心澹澹動此包絡病鎮胞湯人參茯神遠志丹砂生地石斛棗仁麥冬五味栢仁生草

○驚悸怔忡備用諸方

驚病外有所觸心動與悸恐不同

觸事易驚 半夏 枳實 竹茹 各一錢 陳皮 五錢 炙草 四錢 茯苓 七錢 又方 硃砂 二錢 黃連 三錢

妙方

被物驚心跳不甯 猪心 二個 鹽 生地 分 蜜丸 燈心湯下 硃砂 末 於內紙包大煨熟食之大效

養心湯

悸病 無所觸心跳不甯由憂鬱得之舌強恍惚驚恐 心惕不甯 黃耆 茯神 茯苓 半夏 當歸 川芎 各一錢 遠志 棗仁 辣桂 栢仁 五味

人參 各一錢 炙甘草 五分 如覺胸中有聲 是停水 加檳榔 赤苓

思慮多怔忡不寐便濁 當歸 黃耆 小草 棗仁 栢仁 茯神 木香 白芍 人參 麥冬

炙草 各一錢

虛弱怔忡卧不安 棗仁 遠志 黃耆 茯苓 蓮肉 當歸 人參 茯神 各一錢 陳皮 炙草 各五錢

分 日二服 常憤怔忡 黃耆 茯神 人參 遠志 各一錢 熟地 八錢 栢仁 五錢 棗仁 五味 各五錢

分 硃砂 五分 蜜丸

悸有痰熱 人參 五錢 菖蒲 遠志 茯苓 茯神 各一錢 硃砂 一錢 白朮 麥冬 各五錢 蜜丸

甚者兼咽乾煩熱 人參 五錢 當歸 五味 麥冬 天冬 栢仁 棗仁 各一錢 茯苓 錢五 元參

丹參 桔梗 遠志 各五錢 生地 四錢 黃連 二錢 蜜丸 又方 麥冬 二錢 遠志 菖蒲 香附 各二錢

雨 天冬 花粉 白朮 貝母 熟地 茯神 各一錢 人參 當歸 各一錢 牛膝 黃耆 各二錢

木通 錢八 棗肉丸 圓眼湯下

丹 中和補心

丹 定志丸 天王補心

補心丸 棗仁湯

養榮湯

妙香散

參歸腰子飲

歸脾湯

人參養榮湯

加味二陳湯
麥門定志湯

衛生集

心氣不足神不定驚悸 麝香一分 木香二分 山藥錢一 茯苓錢一 茯神 黃耆 遠志錢各一 人參

桔梗 甘草各五分 硃砂三分 共為末酒調下。

心跳兼自汗 人參 當歸錢各五 猪腰個一 細切入葯同煎飲葯汁吃腰子。

○健忘病論

健忘心腎不交濁火亂其神明或思慮過多精神短少或精氣衰倦記前失後或痰迷心竅遇事多忘心

腎不交朱雀丸茯神四兩沉香一兩香附可代蜜丸人參湯下思慮過度歸脾湯精氣衰倦人參養榮

湯補中益氣湯去升麻加白茯苓白芍熟地肉桂五味遠志痰迷導痰湯半夏南星枳實赤茯苓橘紅

薑 健忘備用諸方

思慮過度健忘 人參 茯神 圓眼肉 黃耆 棗仁 白木各二分 木香 炙草各五分 遠志

當歸錢各一 有痰加竹瀝

精神少健忘 白芍一兩 人參 陳皮 黃耆 桂心各一兩 當歸 白木 炙草各一兩 熟地 五

味 茯苓錢各七 遠志錢五 石菖蒲錢六 棗仁錢八 棗肉丸

素痰多者 半夏 陳皮 茯苓 益智 香附 人參各一錢 炙草五分 烏梅個一 竹瀝 薑汁

勤政勞心讀書刻苦多忘 人參一兩 白木 茯苓 茯神 遠志 石菖蒲 棗仁 麥冬各一兩

牛黃錢一 辰砂五分 圓眼四兩 熬膏加煉蜜四兩為丸辰砂為衣每三十丸日三服

痰迷語言如癡多忘 服上茯苓湯

○不眠多眠病論 附夢論方

不眠心膽有熱血虛則不眠宜清熱養陰血甯神飲棗仁烏梅生地麥冬五味茯神遠志生甘草竹茹

不眠多眠備用諸方

養心湯

加味養心湯

六君子湯

溫膽湯

龍甲羌活湯

湯安卧如神

平胃散

六君子湯

人參益氣湯

勞心之人多少寐 黃耆 茯苓 茯神 半夏 當歸_{各二錢} 川芎_{二錢} 炙甘草_{二錢} 遠志 肉桂

柏仁 五味子 棗仁 人參_{各一錢} 薑棗煎

方卧即大聲鼾睡少頃即醒不寐_{是心火} 羚羊角_磨 犀角_磨 養心湯服

年高不寐 人參 白朮 茯苓 半夏 陳皮 黃耆 炙甘草 棗仁

痰多不寐 半夏 枳實_{各一錢} 陳皮 炙草 茯苓_{各二錢} 棗仁 遠志 五味_{各八分} 竹茹_{五分}

寐即驚醒 龍甲 棗仁 羌活 牛膝 五味 蔓荊 黃耆 人參 獨活 防風 川芎 炙草

通宵不寐 茯苓 茯神 白朮_{各一錢} 山藥 熟棗仁_{各二錢} 遠志 炙草_{各一錢} 人參_{四分} 辰砂_{五分}

寒水石_{服一錢} 二味俱另入

不能正偃_{是胃不和} 宜服和胃湯 兼肺氣太盛宜瀉肺

體重或瀉多寐_{濕居} 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 白朮 防風

方食已即困欲卧_{脾弱} 人參 白朮 茯苓 半夏 陳皮 炙草 神麴 山查 麥芽

四肢怠惰多卧_{氣弱} 黃耆_{五錢} 人參 防風 升麻_{各七錢} 白芍 生地_{各五錢} 熟地_{六錢} 生草_{四分}

炙草_{三分} 五味_{二十個} 肉桂_{二分}

○附諸夢論方

夢涉大水恐懼_{是陰盛} 宜升陽除濕湯

夢大火燔灼_{是陽盛} 宜清火滋陰

夢相殺_{是陰陽俱盛} 宜清火瀉濕

夢飛_{是陽盛} 宜涼膈清上瀉火

夢墮_{是陰盛} 宜升陽除濕加行下部藥

萬世生書

卷八

中身部 心分

三

夢取飲食不得入口是饑

平胃散或保和丸

夢以飲食予人是飽有食積

夢怒是肝氣盛 青皮 陳皮 當歸 川芎 羌活 防風 香附 胆草 生梔 甘草

夢泄便 大黃 滑石 下之則已

夢聚眾相擊毀傷是內有蟲 安之下之

夢游行是勝 六味地黃丸減澤瀉加益智

夢飲食是胃 六君子湯合平胃散

夢田野是太陽虛 四君子加訶子 肉蔻 龍骨 牡蠣

夢聚邑衝衢是太陽虛 補心湯合導赤散

夢聞訟自刺是膽虛 宜服溫膽湯

夢接內是陰器 地黃丸加黃柏 知母

夢斬首是恐懼 宜補膽涼腎

夢行走不能前或居深地窳苑中 木瓜 牛膝 木香 沉香 草薢 地黃

夢禮節拜起是傷勞倦 或服補中益氣湯

夢恐懼哭泣飛揚是肺 枳殼 桑白 地骨皮 杏仁

夢喜笑是心 連黃 生地 木通 甘草

夢歌樂身重不舉是脾 石膏 山梔 藿香 防風

夢腰脊兩解不屬是腎 黃柏 知母 澤瀉

夢見丘山烟火是心不足 麥冬 人參 柏仁 棗仁 遠志各等分

夢飛揚見金錢奇物或夢見白物見人斬血篇

人參 麥冬 茯苓 山藥 黃芩各等分

夢山林樹木或夢見樹下不

當歸 川芎

五味子 白芍 生地 山萸

夢丘陵大澤壞屋風雨或夢飲食不足或夢

六君子加木香 香附 砂仁

夢臨淵沒居水中或夢見舟船溺人或夢伏水中若有驚恐 宜服六味地黃丸

妄夢昏迷是心腎不交精神散越

宜滋補心腎

因思而夢 因覺時所為而夢 因所喜好而夢 因于恐懼而夢不在病例

諸汗病論

盜汗汗者心之液心血虛有熱則盜汗宜補飲清虛熱桑葉湯經霜桑葉棗仁生地當歸白芍五味黃耆

牡蠣茯神烏梅浮小麥大抵汗症禁用半夏茯苓生薑等香燥辛辣之品

心汗別處無汗獨心孔有汗思慮多汗亦多病在用心過度宜養心血

血汗血自毛孔出見血門

○諸汗備用方足自汗 盜汗 心孔汗 手

血氣不足常自汗 黃耆 桂各一分 白芍分三 甘草一分 入黑砂糖 捻服○非血氣不足止表虛

者 白芍錢五 官桂錢二 炙草錢二 血虛自汗加 當歸錢二 或用黃耆錢六 炙草錢一 棗煎服

虛勞自汗 黃耆錢五 茯苓 熟地 肉桂 天冬 龍骨 麻黃根各錢一 五味子 小麥 防風

當歸 炙草各五分 發厥 炮附 發熱加石斛

汗出膠粘珠凝淋漓如雨 不治之症

虛熱盜汗 黃耆 遠志 當歸 澤瀉各二錢 白芍 龍骨 人參各一錢 炙草一錢

虛勞百病皆具盜汗 天仙藤 鼈甲炙醋 香附 桔梗 柴胡 秦艽 青蒿各一錢 烏藥分五 炙草

大建中湯

中身部 心分

四

補中益氣湯

柏仁丸

當歸六黃散

艾煎散

養血散

益胃散

漏風湯

防風湯

一錢 川芎二錢半

內傷氣虛自汗 黃耆 人參 白朮 當歸錢各一 炙草 陳皮分各五 升麻 柴胡分各三 麻黃根

浮麥錢各一 ○尺脈虛大加黃柏 知母 熟地 ○挾風邪加桂枝分五 白芍錢一

身熱盜汗 柏仁 半夏兩各一 牡蠣 人參 麻黃根 白朮 五味錢各五 麥麩半二錢 棗丸日二

服愈即止

陰虛火動盜汗 當歸 黃芩 黃連 黃柏 黃耆錢各一 生地 熟地錢各二

獨心孔有汗 艾分五 茯神錢二 青桑葉錢一

足汗 白礬 乾葛兩各四 水煎洗足五日愈

每飲食即出汗 黃連 五味 烏梅 生草分各五 炙草分三 升麻分二 忌溼麪酒五辛

不論冬夏額上常有汗出因醉後當風得之 黃耆錢六 甘草錢一 防風 麻黃根 桂枝分各五

自汗畏風雖炎天必須棉衣 防風 荆芥 羌活 桂枝 薄荷 甘草

○諸血病論

血者水穀之精生化于脾總統于心藏受于肝宣布于肺施泄于腎和調五臟灑陳六腑灌溉一身注於脈少則澀充則實一有所傷氣逆血溢火熱血益妄行於上則衄咳嘔吐咯唾五竅出血妄返於下則便紅移熱膀胱則溺血滲透腸間則腸風陰虛陽搏為崩中溼熱鬱滯為帶下熱勝於陰為瘡瘍溼滯于血為痛痒癰疹凝塞皮膚為冷痺畜在上令人善忘畜在下令人狂墮恐跌撲瘀血內凝凡此新舊虛實不同大概俱是熱陰虛陽盛君相二火亢甚煎迫其血而出諸竅或言寒者指時行中寒凝滯而言餘則皆熱夫血下行為順治順易仲景云畜血症下血則愈又無病忽痢其病進若血上行後忽痢為邪欲去皆易治之驗上行則逆治逆難故失血中惟吐血最要衄行清道由經而出吐行濁道由胃

而出喉道通經走而不守其血為走經之血隨火而升大氣急則隨經直犯清道而出於鼻咽道通胃守而不走守營之血存於胃中胃氣虛血無統攝則咳咯嘔吐而出於口治法宜降氣不宜降火降火必用寒涼今連梔柏往往傷脾作瀉脾不能裹血血愈不歸經宜行血不宜止血氣逆上行血不循經降氣行血血循經絡不求止而自止宜補肝不宜伐肝肝藏血失其職則吐肝平血藏吐自止用藥四物為主然獨主血分受傷氣不虛者若氣虛血弱必用參耆陽生陰長之理固然而或陰火或極參耆又禁緣能助火故也有三藥必用二藥必禁服寒涼百不一生服重便百不一死則童便宜用血雖陰類運之者陽荷葉仰盂象震最能運血則荷葉必用降氣莫善于降香則降香必用必禁者知母黃柏也今人不論陰陽一見血症即用四物加知柏曰丹溪明訓誰敢外之初服上焦暫利稍久減食或不想食即如山查神麴致熱愈盛或救愈多尤以葯力未到倍加寒涼而泄瀉腹脹之病作又加枳實腹皮為寬中快氣之品至此不死將待何時故夫發熱咳嗽吐血未必成瘵也服四物知柏之類不已則成瘵矣胸腹痞滿未必成脹也服山查枳實之類則成脹矣面浮肘腫小便秘塞未必成腫也服泄氣滲利之品不已則腫成矣氣滯痞塞未必成腫也服青皮枳殼快利之品不已則噎成矣及陷于危乃曰症犯惡款萬不能救悲夫

○吐血分三因論

風寒暑濕燥火外因也過食生冷好啖炙煿醉飽無度外之內也喜怒憂思悲恐驚內因也勞心好色亦內也跌撲閃胸傷重蓄瘀者不內外因也經曰歲火太過肺金受刑民病血溢血泄又曰少陽之復火氣內發血溢血泄是火氣能使人失血也又曰太陽司天或在泉寒淫則勝血變于中民病嘔血是寒氣能使人失血也又曰太陰在泉溼淫所勝民病血見是溼氣能使人失血也又曰少陰司天熱病生于上冷病生于下民病血溢血泄是寒熱凌犯能使人失血也又曰歲金太過燥氣流行咳逆甚而血

溢是燥氣能使人失血也。六氣皆能使人失血，非獨火也。治法不外咳吐咯等。加司天在泉一二味。惟太陽寒水少陰腎水最易致病。經中之血一得寒氣凝滯不行，咳嗽帶痰而出，病必惡寒。胃必緊，血中間有或紫或黑數點，此皆寒淫之驗。醫者妄以為陰虛火動，用滋陰之藥，危矣。寒溢飲麻黃桂枝白芍甘草當歸五味，得微汗而愈。此人所不知也。若傷暑吐衄脈虛大，可用清暑益氣加丹皮生地，亦不可過用寒涼。外因吐血之症如此。若內因則有五志過極之火，驚而動血者，火起于心，怒而動血者，火起于肝，悲傷動血者，火起於肺，思而動血者，火起于脾，勞而動血者，火起于腎。治法備咳吐三條，暴吐急用加味四生飲，生荷葉生艾葉生柏葉生地黃降香童便，元氣虛弱即將童便浸前藥，水丸獨參湯送下。若墮車墮馬，跌撲損折，大血瘀蓄，腫痛發熱者，先服折銳湯，大黃桃仁紅花當歸寄奴川芎赤芍，使大下十餘次，再服行血破瘀湯，三七當歸玄胡乳香沒藥血竭蘇木靈脂赤芍紅花，然後服百和湯收功。首烏地黃當歸骨碎補白芨鹿角膠續斷甘草薄荷，杖傷亦如前法。

○吐血分陰陽真假論

凡治吐血必先分陰陽。有陰虛有陽虛，有真陰真陽，有假陰假陽。陰虛者血虛也，陽虛者氣虛也。何謂真陰真陽？真陽乃命門無形之火，謂之元氣。真陰乃命門無形之水，謂之元精。似與血無異，不知血即水也。人身中涕唾津液痰汗便溺皆水也。獨血之水隨相火而行，故其色獨赤。腎中之真水乾則真火挾相火而炎，血亦隨之而沸騰矣。腎中之真火衰則真水挾邪水而泛，血亦無附而泛上矣。惟水火真其位，氣血始各順布也。若是者非辛熱不治何也？天上之火如暑月傷暑之病，方可以水沃，可以寒涼折。此河間主五運六氣暑熱立論。發仲景傷寒論所未備，非通論種種不同之大也。若爐中之火，即脾胃之火，得水則滅，脾胃中無火，將以何者蒸腐水穀而分溢四體？此東垣所謂必須溫養戒用寒涼也。至於相火者，龍雷之火，得雨益熾，寒涼正助其焰，惟太陽一照，龍雷自息。此不可水滅而用辛熱之義也。

然與治脾胃理中溫中又異乾薑甘草當歸等藥俱不到腎經惟仲景八味丸能使腎中溫煖一覺腎寒脈沉足冷即用之如久月一陽來復于水土之中龍雷之火自能歸就原土不止血而血自安矣若覺腎熱脈洪足溫即是水乾火炎去桂附純用六味不必瀉火血亦自安此真陰真陽之說也又有假陰假陽凡腎經吐血但是下寒上熱逼陽于上之假證證有二有少陰傷寒寒在腎面赤口渴不能飲水胸煩小腹痛或不痛或嘔用仲景白通湯附子乾薑蔥薑一服而愈又有一等命門火衰真陰失守水泛逼陽上浮面赤喘嘔痰血服寒涼立死八味丸最應然何以辨真假辨之舌凡實熱胎必燥而焦或黑若假熱白胎而滑雖渴不能飲即飲少頃吐出面雖赤色必嬌嫩又何以辨傷寒及陰虛傷寒假證大小便閉陰虛假症大小便和陰陽真假之辨如此

○血從鬱致論

血證多起于鬱人所不知凡鬱皆肝病木中有火鬱則火不得舒血不得藏自生妄行之證但鬱之一字不但怒與憂成鬱其人素有陰虛火證外為風寒暑溼所感皮毛即閉塞而為鬱鬱于經絡經絡之火不得舒血即隨火妄行從鼻而出鬱于胃脘胃脘之火不得舒血亦隨火妄行從口而出凡係鬱證脈多枯澀證惡風寒不知者認以為虛而施溫補之劑誤矣視其面色多滯喜作嘔噦口苦口酸即當散鬱為主加味道遙散對症之方俟鬱舒血止急用六味丸滋陰永不再發

衄血鼻血也不甚不足應以水紙搭鼻銜或以涼水拊項後即止衄甚而久始與吐血無異犀角地黃湯對症之方又黃芩二兩白芩二兩水丸治久衄神效

咳血咳出痰內有血其症有二一曰熱壅于肺一曰久嗽損肺熱壅不必治血火去血自止損肺用補肺丸阿膠為主白芩以仁生地甘草桔梗橘紅貝母為丸噙化又須看痰色如瑪瑙成塊者出胃口易治若一點一絲從肺臟中來肺少血為虛火所逼雖少亦出漸至肺枯無以領一身之氣其病最深保金

九阿膠二兩。生地一兩。麥冬五錢。生甘草五錢。貝母五錢。白芨五錢。青黛五錢。百合五錢。水丸服。

嘔血吐血出于胃。脈必大而孔。人不知樞節。負重奔走。縱情女色。六經受傷。傷重者。從脊而上。如潮湧至。勢不可遏。當任其出。勿強止。蓋所出皆敗血。縱止之。亦不歸經。久必復出。必以消血潤下之劑。使隨血下行。方妙。潤下湯。牛膝一兩。降香一錢。蘇木。山梔各一錢。和童便服。傷輕者。溢出胃脫。嘔吐成盆。成碗。須看紫色者。是宿血。任其去。鮮紅者。新血。止之。止法用冷水濯其兩足。此竈底抽新之法。又薦以水噴其面。使忽驚。則止。內用竈胃湯。牛膝五錢。當歸二錢。山梔。側柏各一錢。青荷葉一錢。降香一錢。童便磨好。墨一盞。

痰涎帶血出于脾。涎唾中有少血散漫而出。脈必孔緩。唾紅湯。青荷葉為君。山藥。當歸。生地。山梔。白芍。生甘草。童便。

咯血唾血出于腎。咯者不嗽。咯出血。疔瘡。或血屑。或血絲。氣分有大。則令人咯。咯之久。則動血。止咯膏。生地。牛膝煎膏。入青黛。杏仁。青荷葉末調服。若一咯一塊。又是胃中血。或血在咽下。咯不出。甚咯則有之。此津乏血乾。宜滋血潤喉。鮮血隨唾而出。亦屬腎。治同咯血。

五竅出血。耳目口鼻一齊出血。藥不及煎。死在頃刻。先將水當面噴幾口。急分開頭髮。用粗紙數層。蘸醋令透。搭在額門。血即止。次用當歸一兩煎好。磨沉香五錢。加童便服。血自歸經。然後以四物加入人參。五味丸服。可收萬全之功。

血自毛孔中出。曰血汗。即肌衄。又名脈溢。心主血。又主汗。極虛有大。則見。脈溢湯。人參。黃耆。麥冬。當歸。茯神。石蓮。硃砂。薑汁。生地。

搔癢血出不止。薰桶。穢燒灰敷之。

臟風。臟毒下血。治法不遠。腸風者。邪氣外入。隨感隨見。血清色鮮。脈必浮。約加散風行濕。如羌活。荊芥。防

轉逆為順
蘇子降氣
湯

人參飲
抽薪湯

立教方
又方

石膏散

風伏於臟毒者。溫積熱毒久而始見。血濁色暗。脈必沉滯。約加生地。白芍。忍冬。地榆。其因有二。有酒色過度。而或有負重涉遠。勞苦而成。酒色過度。糞後下血者。血從小腸來。宜清小腸之火。吳萸炒黃連為君。槐花。山梔。烏約。合前約。糞前血下。血從大腸來。宜清大腸之火。槐花為君。條芩。山梔。烏約。合前約。糞前後。下血者。血從脾胃來。石膏為君。槐花。山梔。甘草。烏約。合前約。若下血太甚。人參。牡蠣。栗殼。升麻。奔走。負重得者。四物倍當歸。加槐花。黃連。任其自下。待色鮮紅。略加澀藥。椿木。烏約。最妙。凡血皆是熱。不可單行單止。亦不可純用寒涼。必加辛溫。升約方得。即涼藥亦必用酒煮。酒炒。大寒血即凝也。此病多食乾柿。或鮮柿。最效。一方用槐實。每月初一。湯下一粒。初二。下二粒。至十五。漸加至十五粒。十六。用十四粒。漸減至三十日。仍一粒。經年服之。永不復發。

○吐血備用諸方

諸症失血。皆見於瀉。隨其上下。以驗所出。大凡失血。脈沉細。設見洪大。後必難治。

吐血非虛瀉瘦弱者

醋大黃

生地

桃仁

丹皮

引血下行。

吐血宜降氣

蘇子

半夏

前胡

炙草

厚朴

陳皮

當歸

沉香

加人參

阿膠

吐血虛弱疲倦

脈必弱。是氣虛。不能攝血。

人參

五味子

黃耆

麥冬

白芍

當歸

炙草

膈熱面赤或胸中痛或血紫黑也

生地

赤芍

當歸

丹皮

荊芥

阿膠

滑石

大黃

玄胡

粉 桃仁泥 利之

吐血不止

血餘灰

阿膠

童便

藕汁

生地

刺薊汁

好墨磨水

溫服即止

又方

生地

鬱金

降香

濃煎服立止

吐血膈熱舌乾頭疼

石膏

麥冬

黃芩

生地

升麻

竹茹

乾葛

花粉

炙草

胃雨傷吐血

炮薑

茯苓

炙草

白朮

頭痛

加川芎

浴室失血

亦用此方

調服五散
歸者湯

雞蘇丸

止血飲

涼血湯

天冬湯

花葉丸

加味理中

茯苓補心

涼上清血

天暑吐血口渴面垢頭暈乾嘔 茅花 燈心 麥冬 藕節汁 側柏汁 茅根汁 薑汁 蜜汁調服 蒼朮 茯苓 猪苓 澤瀉 血止 生地 當歸 丹皮 赤芍 黃耆 甘草

調理之

怒氣吐血唇青面黑 當歸 川芎 白芍 生地 煎湯下 蘇葉 黃芪 防風 荆芥

菊花 川芎 桔梗 生地 甘草 冰片 蜜丸用前湯下之 童便磨墨化阿膠止之 再以 川芎

跌打傷吐血 先以 藕節汁 側柏汁 茅根汁 韭汁 童便磨墨化阿膠止之 再以 川芎

當歸 白芍 百合 芥穗 阿膠 丹皮 大黃 滑石 紅花煎調降香白芨末服

勞心吐血 蓮心 糯米 研末酒調服 再服 天冬 遠志 黃耆 白芍 麥冬 藕節

阿膠 生地 當歸 人參 沒藥 薑煎服 勞力過傷吐血 蘇子降氣湯 人參 阿膠 仍以豬肝煮熟 蘸白芨末服

酒色飢飽勞吐血 枇杷葉 欵冬花 紫苑 杏仁 鹿茸 桑白 木通 大黃為末蜜丸含化

內損血出如泉 側柏 荆芥穗 人參 為末入細麪一錢涼水調如稀糊不拘時服

吐血一二口即止數日復發 黑神散 和小烏沉湯常服

吐血發渴 十全大補湯 黃耆 人參 五味子 地黃 麥冬 乾葛 枇杷葉 酌虛用

有因強嘔吐致傷胃吐血者 人參 白朮 茯苓 炮薑 炙草 川芎 扁豆

吐血頭暈寒熱 四物湯 蘇子降氣湯 阿膠 若單發熱 木香 蘇葉 乾葛 半夏 前

胡 茯苓 枳殼 桔梗 炙草 陳皮 生地 白芍 川芎 當歸

吐血後潮熱咳嗽脈洪大而數五至以上者不可治

一切吐血服即止 歸尾 赤芍 熟地 百合 貝母 炒梔 丹皮 桃仁 麥冬 生地

瓜薑湯

加味清胃

黃米

胃良丸

擦方

滋陰保肺湯

黃耆散

人參蛤蚧散

川芎分五

黑蒲黃

阿膠各五

薑皮

先惡心嘔鮮血成升因怒致之

瓜薑

當歸

生地

桔梗

通草

丹皮

諸失血

藕節燒灰存性

竹節燒灰存性

好墨炒斷

各等分

各為末

每服一二錢

童便黃酒送下

齒血備用諸方或從牙齦出血

牙疼出血口臭是胃熱

升麻

黃連

生地各一錢五分

丹皮

當歸各一錢

連翹

犀角各八分

外用 大黃油浸令軟

生地

各切細片

合定貼患處

不可說話

一夜愈

血暴出極多若其脈洪大有力

以大黃末一錢

枳殼煎湯

童便許少

下黑糞自愈

素腎虛者 六味地黃丸鹽湯下

仍以青鹽炒香

附黑擦之

因風熱者 清胃散加羌活

荊芥

防風

薄荷

齒血擦敷方 雄黃一分

麝香許少

銅錄

輕粉

黃丹炒

黃連各一分

血竭

枯礬各五

為末

咳嗽血

涎唾中有少血散漫者此相火炎上屬陰虛也

鹽柏

知母各七分

麥冬錢三

天冬錢一

枇杷葉一錢五分

當歸

白芍

生地

阿膠各一錢

五味子五十粒

橘紅

紫苑各一錢

桑皮半錢

甘草五分

咳痰中血如紅縷此肺受熱傷難治

亦用滋陰保肺湯

童便

竹瀝

止之

咳出淺血色似肉 為白血必死

嗽血久成勞或勞病成而嗽血虛火症悉具

黃耆一錢

黃芩

桑白

半夏

炙草

知母

赤芍

紫苑各五分

秦艽

茯苓

生地

柴胡

地骨各六分

肉桂

人參

桔梗各三分

鼈甲去裙兩分

天

冬錢各一

喘咳膿血面瘡身腫

蛤蚧一對

河水浸五日洗

杏仁五兩

炙草三兩

人參

茯苓

貝母

知母

扁豆散

麥冬湯

百花膏

扁豆散

麥冬湯

七珍散

白芷散

桑白各二 為末湯泡服

久嗽咯血或肺痿或吐白涎胸滿

扁豆

生薑各一

枇杷葉

人參

半夏

白朮各五

茅根分

半檳榔分

傷風寒後咳血胸滿

麥冬

桑白

生地各一

半夏

紫苑

桔梗

竹茹

麻黃各七

炙草各四 薑煎服

傷力吐血痰

黃藥子

白藥子各一

赤芍七分

知母

玄胡各五

黃金二分

當歸分五

山藥

乳香 沒藥

血竭各二

紅花

當歸

煎湯調末下

勞嗽血 鍾乳

桑白

麥冬各三

白石英

人參

五味子

款冬花

肉桂

紫苑各二

阿膠

白芨各一 薑煎服

經逆行或血腥吐血

服韭汁立效

久嗽損肺

冬花 百合各一

等分為末

煉蜜成膏

臨卧含化

或用香附

杏仁各便

炒梔

青黛

海粉

瓜蒌

訶肉

兜鈴各等

入礬砂少許

蜜丸含化

○咯血不嗽而咯出血

初得病

扁豆 生薑各一

枇杷葉

人參

白朮各五

茅根七分

檳榔分二

貝母分六

生地汁

藕節汁 好墨汁 調服

久者 童便錢一

青黛分六

當歸分八

川芎分四

生地錢一

白芍二錢

五味

熟地

知母各六

勞瘵咯血

人參 白朮

黃耆

山藥

茯苓

阿膠

當歸

蓮鬚

柏葉

沙參各六

勞瘵屈伸傷肺吐血

白芨錢一

枇杷葉

藕節各五

蓮鬚

柏葉

沙參各六

阿膠分八

生地

汁 磨好墨服