

欽定四庫全書

子部
仁端錄卷三



詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

仁端錄卷三

齊肅

明辨痘形

色者血之華形者氣之象

小大適中位置勿偏如過

受之弱過於小者非毒氣之深伏必邪火之浮游皆非

血和平陰陽調暢痘自

大者非發藥之多即稟

明 徐謙 撰

陳葵 刪定

痘之正形也故約言之不外氣血毒三者博求之則千態萬狀局局不同苟非閱歷之多考究之深籌策之熟鮮有不當局而迷者也

痘形正變 點粒者痘之形也故尖圓堅厚始出之形也飽滿充足成漿之形也斂束完固收靨之形也或平或陷者形之變也初出如蠶種薄如麤片密如針頭如熱之起痱寒之起粟者必不能起發而死若粘聚糊塗肌肉虛浮溶軟嫩薄皮膚潰爛者必不能收靨而死

痘形疎密 痘欲其疎疎則毒少不欲其密密則毒重
如頭面欲疎元首不可犯也頸項欲疎管籥不可塞也
胸背欲疎臟腑膈膜之所附也若手足則不嫌其密矣
謂之疎者非但稀少也鋪排磊落大小勻淨亦可以言
疎謂之密者非必盛多也攢聚粘連每多成片雖見數
處亦可以言密

疎而凶者 初出時纔見紅點兩三處大熱不解唇口
燥裂大小便閉煩躁不寧或身不熱但增煩渴者此由

毒盛鬱遏於中不能遽出日復漸出漸加稠密一也初
出一兩點頂尖焦黑或三四粒作一堆者僅見數處他
處無有喜睡不食煩渴二便秘澀加喘促妄言者此毒
伏於中不待起發而死即使起發必發癰毒二也有出
痘疎朗遂生玩忽以致不守禁忌雜施湯藥變生不測
者三也

密而吉者 痘出雖密分珠綻突內症和平是也

密而凶者 平塌脚軟色無神內症不和是也雖密而

凶治之得宜衛之甚嚴可以調致內症和平而亦獲全也

痘形諸名

粗珠痘 尖光圓澤根窠紅活順也若間有內傷外感症不易生發者須辨之

細珠痘 與粗珠痘同勿因其細小而妄發之致漿清痒塌潰爛

茱萸痘 四沿皺起形如茱萸乃元氣不足榮衛兩虛

中心陷落也九日當死若得根窠紅活者須內托氣足則漿滿而頂可充也內托散中去防風白芷頂中發黑點者用保元湯加川芎官桂身壯熱者加入酒炒黃芩

石屑茱萸痘 郭廓堅厚粿粒硬小乃氣血足表裡實順候也 又有薄殼茱萸痘瓦灰茱萸痘皆宜大補元氣為主或破而乾黑脚塌如圍碁子者不治

大痘 高大而飽滿者是也兒小漿空難足用保元湯

倍參芪芍朮漿足難收以白芍斂之然亦有過發以致
潤大者起脹時粉白色頂突無陷者是也

梅花痘 報點五六粒成叢或七八粒成叢百餘處者
是也至起脹連成一個平塌有贈痘光疎者生贈痘平
塌枯滯者凶

蟾窠痘 初出時不拘頭面身體但中間有一大粒為
主四圍附聚羣小一宗如蜘蛛新出之狀是也

蛛蛛痘 中無大粒但有一宗一宗小者是也 已上

二種乃氣血不調經絡凝滯故聚發一處各自一種布
於肌肉也若見山根年壽人中咽喉氣窩心窩上中下
胃腕口背脊骨手心脚底六脉寸口諸緊要處難治若
出於間處者初起時即用銀針挑刀割破四聖散油咽
脂調貼內服通暢飲 當歸 紅花 山查 青皮
通草 木香 廣皮 菖蒲 川芎 羌活 防風
連翹酒煎服

蚊迹蚤斑痘

點雖見而不起突此三陰經所發逆候

也

椒皮鐵葉痘 紅紫如椒黑而形枯瘁慘黯者皆毒傷

五臟內腐而外黑此毒之重者治之何益

蛇殼痘 內外皆空一連乾索漿水不灌形如蛇殼頭

面遍身皆腫無有空地全無光彩平爛而白色多屑者

是也

麤皮痘 片片枯瘁自落毫無滋潤者是也與蛇壳痘

皆毒入脾經之重症必乾枯不能作漿至十一二日必

死若間有補空之痘紅潤者可治或地白暈紅根脚起者可治急扶榮衛與蚯蚓丹可頃刻徧腫退不見其形亦不見漿竟可獲愈

壘黍痘 壘壘如黍米之細小或紫或白者是也

蠶布痘 細密如蠶子之排布見點稠密如瘡起脹糊塗無地與壘黍痘皆毒盛而無所制伏必不能成漿逆候也

圍棋痘 平塌脚散者是也乃正氣不足不能充頂必

致漿清破損倒靨而死若能食便調庶幾可治

象棋痘 頂平畧陷脚歛血附是也治同茱萸痘

饅頭痘 頂頰脚塌不尖不平乃脾胃氣虛用保元湯

加 白朮白芷為主

晃痘即嬌紅痘粗肥血附但嫩艷不能結實此係氣血虛弱

得脾胃堅固自然結實成痂否則有溏泄痒塌之患保

元湯調下參苓白朮散

蛀痘即針空痘起脹時痘頂有小孔不黑不白皆腠理不密

之故大泄元氣急宜補之令其孔一密而痘自起保元
湯倍黃芪再加丁桂芎歸鹿茸 若中孔色黑如髻者
難過七朝 若孔黑有核者疔也以疔法治之

漏瘡痘 初出瘡頂有孔如蛀痘後則膿水漏出堆聚
乾結其色如天泡瘡或清水非膿無故自破水去而黑
乾此皆癰氣所為不治

蟲痘 痘痒甚者不必夏月即寒月亦能生蛆此皆毒
留而肌膚熱腐日久所致

即腐草為螢朽木生蟲之意
有形化者蠅種所生也有氣

化者漿收後陰陽鬱蒸復潰而生也或如米粒或如細絲而長寸餘先哲云蛆痘不死以

其毒盡洩於外也又云濕生臭氣熱生蟲大命多敗速以香油收取盡花椒湯洗之或用嫩柳枝鋪下令兒卧於柳上則蛆自出或用簪挑之或以青布蘸鹽湯拭去又以清涼散斂之內服蟬花散若蛆在頭面用桑葉薄荷葉湯洗之外摻寒水石末

板黃痘

又名延日痘

起脹而痘肉齊平雖有黃漿根血紫滯

逆候也即使痘痂齊脫亦致日漸枯涸三七五七日而

卒

悶痘

又名閉痘

若驚厥即標者心經痘也紅潤細小易漿易

靨縱稠密亦不為害非閉痘也

若或悸而不標者皆

屬小腸惟小腸一經沉而不汎多致難標

若面如橘

皮毛竅森聳是標不出的係閉痘矣急與麻黃蘇桂湯

熱服避風微汗而提出之後乃隨症而治每藥要加知

母黃栢恐升提之後腎水上升火亦隨至決發水泡

當降腎水以免泡患也如狂煩七竅流血者不治

白悶痘 毒盛而氣血虛故報點白頭如瘡也漸乾枯
倒靨三四日而死 或因風寒壅塞腠理以致伏毒不
出宜辨之

紫悶痘 報點如丹漸乾焦紫黑五六日死 或因內
外傷而氣血凝滯以致伏毒不出宜辨之

緊悶痘 毒火燔熾煎熬臟腑壅塞氣道銷燬營衛故
伏而不出 若毒乘肺則喘脹衄血 毒乘肝則目血
毒入小腸則尿血 毒入大腸則便血 毒入腎則