

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷六十七



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

醫方類聚

明 王肯堂 撰

食所傷用六君加麥蘖

寒熱作嘔乃肝木侮脾

土用六君加柴胡生薑兼嘔吐腹痛手足逆冷乃寒水

侮土六君加薑桂不應用錢氏益黃散

見幼科脾臟

若元氣

下陷發熱作渴肢體倦怠用補中益氣湯

見雜病勞倦

若泄

瀉色黃乃脾土之真色用六君加木香肉蓯蓉若作嘔不

食腹痛惡寒乃脾土虛寒用六君加木香薑桂若瀉在

五更侵晨飲食少思乃脾腎虛弱五更服四神丸

見泄瀉

日間服白朮散如不應或愈而復作或飲食少思急用

八味丸

見雜病虛勞

補命門火以生脾土為善

邊太常側

室妊娠泄瀉自用枳朮黃連之類腹悶吐痰發熱惡寒
飲食到口即欲作吐強匙許即吞酸不快欲用祛痰理
氣余曰此因脾胃傷而痰滯中脘若治痰氣復傷脾胃
矣遂以參朮炮薑為末丸如黍米不時含嚥三五丸漸
加至三日後日進六君子湯而尋愈 進士王檄徵之
內懷妊泄瀉惡食作嘔余曰脾氣傷也其夫憂之強進
米飲余謂飲亦能傷胃且不必強俟脾胃醒宿滯自化
飲食自進不信別用人參養胃湯飲之吐水酸苦又欲

投降火寒藥余曰若然則胃氣益傷也經曰損其脾胃者調其飲食適其寒溫後不藥果愈

加味理中湯 人參 白朮 白芍藥 白茯苓 乾

薑 黃連 藿香葉 木香 訶子肉 肉蓯

甘草 各一錢

右呖咀用水二鍾薑三片大棗二枚煎一鍾飢時服
餘方並詳第二卷泄瀉及雜病泄瀉門

滯下

薛治痢之法當參前篇其下黃水乃脾土虧損真色下陷也當升補中氣若黃而兼青乃肝木尅脾土宜平肝補脾若黃而兼白乃子令母虛須補肺胃若黃而兼黑是水反侮土矣必溫補脾胃若黃而兼赤乃心母益子但補中益氣若腸胃虛弱風邪客之用胃風湯或胎氣不安急補脾胃而自安矣凡安胎之藥當臨病制宜不必拘用阿膠艾葉之類 地官胡成甫之內妊娠久痢自用消導理氣之劑腹內重墜胎氣不安又用阿膠艾

葉之類不應余曰腹重墜下元氣虛也胎動不安內熱盛也遂用補中益氣湯而安又用六君子湯全愈 壺仙翁治湯總兵夫人妊娠病痢不止翁診其脉虛而滑兩關若濇此由胎氣不和相火炎上而有熱似痢實非也乃用黃芩白朮以安胎四物生地黃以調血數劑而安

當歸芍藥湯

治妊娠下痢腸痛

即當歸芍藥散見前心腹痛

本治婦人胎前產後赤白痢

生薑

年少者百錢老者二百錢用自然汁鴨子一枚

右將鴨子打破傾入薑汁內攪勻煎八分入蒲黃三

錢再煎五七沸空心熱服立効

無妊娠下痢赤白絞刺疼痛

雞子

二枚烏雞者佳破孔傾出清留黃用之

黃丹

一錢入雞子殼內同黃攪勻以厚紙

糊牢鹽泥固濟火上煨焙乾為細末

右每服二錢米飲調下一服愈者是男二服愈者是

女

大治妊娠素弱頻併下痢腹痛羸瘦面色痿黃不進飲

食 厚朴

一兩半

白朮

熟地黄

川芎

芍藥

當歸

乾薑

人參

各一兩

訶子

三錢

甘草

一錢

右呔咀每服四錢薑三片水煎

又方 治妊娠下痢腹痛小便澀

當歸

黃芪

各一兩

糯米

一合

右細切和勻水煎分四服

羅大寧散

治妊娠下痢赤白灰色泄瀉疼痛垂死者

黑豆

三十粒

粟殼

二兩半生半炒

甘草

二兩半生半炒

右為粗末都作一服生薑三片同煎食前服

治妊娠挾熱下痢亦治男子常痢

黃連

黃蘗

各一兩

山梔仁

二十枚

右㕮咀每服五錢水二盞浸二時久煮十餘沸頓服

若嘔加陳皮

一兩半

生薑

三兩

黃連湯 治妊娠下痢赤白膿血不止

黃連

二兩

厚朴

薑製

阿膠

炙

當歸

各一兩

乾薑

各一兩

艾葉

黃蘗

各一兩

右為細末空心米飲調下方寸匕日三服

療妊娠白膿痢腹中冷

乾薑

四兩

赤石脂

六兩

粳米

一升炒黃

右用水七升煎取二升溫分三服

厚朴散

治妊娠下痢黃水不絕

厚朴

薑炙三兩

黃連

三兩

肉豆蔻

一枚連皮用

右為粗末水煎頓服

草菓飲 治妊娠臟氣本虛脾胃少弱臟腑虛滑腹臍

疼痛日夜無度

厚朴

薑製二兩

肉豆蔻

一箇麩裏煨

右咬咀每服三錢薑三片水同煎

大小便不通

大凡妊娠大小便不通由臟腑之熱所致若大腸熱則大便不通小腸熱則小便不利大小腸俱熱則大小便俱不通更推其因而藥之 薛前證若大腸血燥用四物湯加桃仁條芩大腸氣滯用紫蘇飲加杏仁條芩腸

胃氣虛用六君子加紫蘇杏仁肝脾蘊熱用龍膽瀉肝
湯心肝虛熱用加味道遙散加車前子 亞卿李蒲汀
側室妊娠大小便不利或用降火理氣之劑元氣反虛
肝脉弦急脾脉遲滯視其面色青黃不澤余曰此鬱怒
所致也用加味歸脾湯為主佐以加味道遙散而安

主政王天成之內妊娠痢疾愈後二便不通其家世醫
自用清熱之劑未効余診其脉浮大而濡此氣血虛也
朝用八珍湯加桃仁杏仁夕用加味道遙散加車前子

而瘥

小品療妊娠子淋大小便並不利氣急已服豬苓散不瘥宜服甘遂散下之

甘遂散方 用泰山赤皮甘遂二兩為末以白蜜二合和服

如豆大一粒覺心下煩得微下者日一服下之後還

服豬苓散不得下日兩服漸加至半錢以微利為度

經心錄同 此藥太峻不可輕用

豬苓散 療妊娠小便澀痛兼治胎水 豬苓五兩為

末白湯調方寸匕加至二七日三夜二不瘥宜轉下之服前藥

葵子湯

古今錄驗

治妊娠得病六七日以上身熱入臍大

小便不利安胎除熱

葵子

滑石

四兩碎

右以水五升煮至一升去滓盡服須臾當下便愈

又方

葵子

合朴硝

二兩

每服三錢水煎溫服

治妊娠大小便不通心腹脹滿妨悶不欲飲食手足煩

熱

檳榔

赤茯苓

大腹皮

木通

郁李仁

去皮

尖北五味子各一兩桑寄生甘草苦梗各半兩

右為粗末每服三錢水一盞煎至六分溫服

治妊娠大小便不通熱閉心膈腹脇脹悶妨害飲食

大黃木通檳榔各一兩枳殼七錢半大腹子三錢訶

子四箇去核半生半煨

右為細末以童便一盞蔥白二寸同煎至六分調下

二錢

當歸散治胎前諸疾或因怒中氣衝子臟或衝脬脉

腹急肚脹腰腹時疼不思飲食四肢浮腫氣急時喘
大便忽難小便忽澀產門忽腫

當歸一兩赤茯苓 枳殼 白芍藥 川芎各二兩 川

白薑炮木香煨粉草各半兩

右㕮咀每服三大錢水一盞半生薑三片煎至八分去

滓無時溫服 如稟受氣弱及南人枳殼減半如氣

實及北人於內加分兩服之或連日大便秘澀加蜜

同煎