

# 欽定四庫全書

子部

續名醫類案卷三十四至  
三十六



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

續名醫類案卷三十四

產難

錢塘魏之琇撰

薛立齋云荆婦孟冬分娩艱難勞傷元氣產子已死用

油紙燒燒斷臍帶藉其氣以暖之俄頃忽作聲此兒

後無傷食作瀉之症可見前法之功不誣世用刀斷

臍帶子母致危者竟不知其由矣且穩婆又喜平日

常施小惠得其用心兼以安懷慰母懷故無虞耳一  
穩婆云我止有一女正分娩時適當巡街御史行牌  
取我視其室分娩女因驚嚇未產而死后見御史更  
以威顏分付迨視產母胎難順而頭偏在一邊若以  
手入推正可保順生周畏其威不敢施手但回稟云  
此是天生天化非人力所能立俟其母子俱死

張子和治一婦人年二十餘臨產召穩婆三人其二嫗  
極拽婦之臂其一嫗頭抵婦之腹更以兩手扳其腰

極力為之胎死於腹良久乃下兒亦如血乃穩媼殺之也豈知瓜熟自落何必如此乎其婦因之經脉斷閉腹如刀刺大渴不止小便閼絕主病者禁水不與飲口舌枯燥牙齒齩黑臭不可聞飲食不下昏憤欲死張先以冰雪水恣意飲之約二升許病緩渴止近時

婦科及庸手遇產后一以燥熱溫補為事殺人如麻閱此宜稍知變通矣

次以舟車丸通

經散前后五六服下數十行食大進仍以桂苓甘露

飲六一散柴胡飲子等調之半月獲安

一婦人臨產召村嫗數人侍焉先產一臂出嫗不測輕重拽之臂為之斷子死腹中其母面青聲冷汗漿漿不絕時微喘張曰命在須臾針藥無極以壯繩以膏塗其鈎令其母分兩足向外偃坐左右各一人脚上立足次以鈎其死胎命一壯力婦倒身拽出死胎下敗血五七升其母昏困不省待少頃以冰水灌之漸嘔二日大醒食進次日四物湯調理數日方愈張常曰產后無他事因侍嫗非其人轉為害耳

凌漢章治吳江婦臨產胎不下者三日呼號求死凌針刺其心針出兒應手下主人大喜問故曰此抱心生也手針痛則舒取兒掌視之有針痕

明史

按此二案與宋史龐安時一案彷彿大抵醫既有名人益附會如近時吳門有享盛名者里人時向余道其神驗皆古人案中所載若以蟹治漆毒以土坑治香氣不一而足所謂俗語不實流為丹青者是也

函齋治前太僕卿張君季媳年輕體壯孕必八個月而  
生產必數日百苦而下兒生必週而天再孕再產再  
天皆同乃謂后當生宜相聞明年又八個月坐草三  
日不下忽憶前言飛輿相召中途逢驅車者云迎其  
父母作永決計比至已夜分矣診之脈未離經人餘  
殘喘穩婆在旁問之曰兒頭已抵產門不得出耳乃  
急令安卧且戒勿擾與安胎藥明晨主人出笑而不  
言問之曰好矣曰昨言兒頭已抵產門今若何曰不

見了大笑而別后過百二十日計十二足月生男今  
八歲矣始知前此皆生生取出以體壯年輕幸保母  
命耳

達生編

太學戴時濟弟媳一產三男母子俱殞一猶在腹今又  
婢孕其腹膨脹頗患之比產先令安卧與加味川芎  
湯每隔半日而產積日半生三子俱無恙

全上

陳氏婦產九日夜不下一息僅存聞有兔腦丸踵門求  
藥問之亦曰頭逼產門不得出諭令安卧再來取藥

強而后去斷與芎歸湯明日生下母子兩全按此皆產母用力逼令橫在腹中豈有人倒懸十日而尚得

生者乎

全上

一婦產兒手出不得入穩婆礪刀以須急令安卧與大劑芎歸湯徐徐托之手入明早生下母子兩全右臂

紫黑數月而后消

全上

孫文垣治姪元素內人難產夜半叩門起問何狀曰產已及門不能下用力則胸膈間有物上衝痛不可忍

思頃之曰此必雙胎胞以分為一上一下也及戶者在下欲出在上者以用力而上衝故胸膈痛也勢亦險矣治法必安上而下者乃可用力以產也即取益元散一兩與之令以紫蘇湯送下藥甫進胸膈痛止不逾時產二女母亦無恙或問曰益元散非產科急劑何能取效如是曰紫蘇安胎下氣滑石滑以利氣亦催生上品蓋醫者意也茲亦以意裁取之耳此法方

書無載記之以備採用

妊婦案中治竹匠婦常以此方安胎

馮楚瞻之媳向患吐血下熱之症自受妊以來八味丸

加牛膝五味日服勿間

此其孫所以百日内生癰症之由也案見小兒胎毒門

及臨盆胞水已下而數未產脈之洪數而帶堅象此陰道枯槁已極何能流通生育乎投以補養氣血催生以藥脈候如故知為羣藥攻力不專乃單以熟地三兩濃煎日進三次脈始洪緩而軟但坐蓐數日子母俱困胎氣毫無運動下達之意象疑胎死矣再以人參五錢煎湯一鐘細刮肉桂之最佳者錢許調服

之連進三劑乃生

一婦難產五日后精神已竭六脈沉微慙慙一息腹中  
毫不覺動下部腫極知母子俱困何能健運以出乃  
與參芪歸芍姜桂白朮牛膝溫暖調補氣血之劑下  
咽少頃腹中運動疼痛而產母子俱活

歛有神醫常路遇舁櫬者櫬中血流出醫曰此尚活可  
治也開視則彌月婦人顏色未改以針針其心遂產

一男手有針孔母子俱無恙其子至今尚存

張氏  
厄言

張所望治婦人產一子忽叫痛欲絕舉家驚愕莫措所望診之曰腹內尚存一子未下投一丹而子下母遂

甦

錢塘縣志

張丈仲治一婦一橫產先出手諸般符藥不捷乃以艾

灸其婦人右腳小指頭尖頭三壯炷如小麥大下火

立產

醫說

高道者不知何許人也得長桑君禁方當明初挾技遊銀陽一日值柩于途諮之乃孕婦喪也道者驗其遺

衣血曰此猶未死耳啟棺視之一針遂甦俗驚道者  
能起死人以比秦越人云

江西  
通志

陸祖愚治高濟亭室胎前惡阻或以清涼調治既而內  
傷飲食消導太過元氣甚弱胎動欲產臨盆三日夜  
方得分娩疲憊昏冒不知人事診之遍身冷汗口鼻  
之氣有出無入寸關無脈兩尺如絲不及服藥令壯  
盛婦女對口接其出入之氣俟其氣之入而呵之次  
用人參歸身熟地各一兩熟附四錢煎服加童便一

酒盃徐徐灌下四肢溫和人事清爽連三劑便能飲食此時若不先用接氣之法必俟藥熟不幾氣絕耶萬密齋治朱宅一婦女李氏常苦難產形頗壯性急少食此氣滯也與一方枳殼甘草香附為主當歸川芎白朮陳皮佐之至八九個月內每月服三帖后生子甚快

葉杏林治一婦人分娩甚易至四十外下血去多玉門不開與加味川芎湯一劑更以活水無憂散斤許煎

熟時時飲之以助其血而產

產婦坐草時取路傍舊草鞋一隻用鼻絡小耳繩燒灰溫

酒調服如得左足者男右足者女覆者兒死側者有

驚自然理也似非切要之藥催生極驗

得效方

王執中云貴人內子產后暴卒急呼其母為辦后事母  
至為灸會陰及三陰交各數壯而蘇母蓋名醫女也

資生

經

余素不信陰陽家言因名工華屋或謂年月不利不聽

時荆婦娠身已九月及產一穩婆甚青年見勢不順  
乃託故亟歸易其姑至視之曰此非可望生下欲全  
母命非嚮而出不可余亟令安卧勿怖以熟地四兩  
杞子二兩當歸一兩煎百餘沸先飲一鐘再煎再飲  
不及時許一女已死乃臍帶綰於項間所致幸母無  
恙穩婆詫異而去婦人良方云凡有孕婦之家不宜  
造次修治良有以也

凌表姪婦年二十餘暑月臨蓐自旦及暮不得產體素