

欽定四庫全書

子部
普濟方卷一百三十四



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

華溪方卷一百二十四

傷寒門

傷寒發熱頭汗論

凡傷寒熱毒大盛多發於瘡者以病人裏實表虛故也
 裏實則毒氣不能內消表虛故聚虛發於肌肉而成瘡
 之其病大則瘡大其色或白或赤若頭作瘰癧漿戴

周王朱楠撰

瘡之根根在肌肉裏者其毒

則重甚者周匝徧身五內七竅皆有也夫表虛裏實熱毒內盛攻於臟腑餘氣留於肌肉遂於皮膚毛孔之中結成此瘡重者匝遍其身狀如火瘡若根赤頭白則毒輕若色紫黑則毒重其瘡形如豌豆亦名豌豆瘡脉洪數者是其候也

方

黃連飲子 治傷寒毒氣未散發豌豆瘡

黃連一兩糯米一合寒水石三兩
去鬚

右搗篩以水二大盞煎至一盞半去滓不計時分溫服

大青散 治傷寒壯熱頭痛發瘡如豌豆偏身

大青 梔子仁 川大黃

剉碎
微炒

犀角屑

川升麻 甘草

炙微赤剉以
上各一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓溫服

不計時

治傷寒熱毒未解欲生豌豆瘡發熱疼痛宜服解肌出

汗方

葛根一兩 石膏一兩 麻黃一兩 黃芩半兩
剉 兩 根節 去

赤芍藥半兩 桂心半兩 甘草半兩
兩 兩 炙 剉

右搗為細散每服不計時以煖酒調下二錢併三服

衣蓋取汗

治傷寒病發豌豆瘡未成膿初覺宜服出聖惠方

黃連一兩
去鬚

右搗碎以水一大盞煎至六分去滓不計時候溫服

便消不成膿也

又方

出聖惠方

用好蜜徧磨瘡上亦可以蜜煎升麻摩之并數數服之

又方

出聖惠方

木香

半兩

右搗碎以水一大盞煎至六分去滓頓服之

治傷寒發豌豆瘡欲出宜服

甘草

一兩炙
微赤剉

右搗碎以水一大盞煎至六分去滓任食前後細細服之以防瘡出如已出即不服

又方

出聖
惠方

用清油一小盞服之即不生

又方

出聖
惠方

牛乳

四兩
酥一兩

右先煖乳令微沸即下酥酥消盡便服空心頻頻溫

服即不生

治傷寒病壯熱頭痛發瘡徧身如豌豆

獾猪膽

一枚

右以醋半小盞合膽汁煎一沸放溫為一服不計時

治傷寒白頭瘡四邊赤腫欲發豌豆瘡

出聖惠方

麻黃

一兩去根節

川大黃

一兩剉碎微炒

右剉和勻每服半兩水一大盞煎至五分去滓不計

時溫服

治傷寒發豌豆瘡未作膿方一名青黛一物湯

出聖惠方

用青黛一兩細研以新汲水調下一錢不計時

石膏湯

出聖濟總錄

治傷寒天行壯熱頭痛發瘡如豌豆

石膏

碎二兩

柴胡

去苗

虎杖

各一兩

知母

焙半兩

芍藥

一兩

山梔子仁

三分

右搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

參麻湯

出聖濟總錄

治傷寒熱病生豌豆并皰瘡煩渴昏迷

元參

一兩

升麻

三分

犀角

鎊半兩

乾藍葉

一兩

甘草

炙剉三分

右搗篩每服五錢水一盞半入葱白三寸豉一百粒

同煎至一盞去滓溫服日二

二黃湯

出聖濟總錄

治傷寒天行熱病毒氣稍盛生豌豆并

炮瘡煩躁昏迷

大黃

剉炒半兩黃芩

去黑心

麥門冬

焙去心

芍藥

各一兩

甘草

炙三分剉

大青

半兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

治傷寒發豌豆瘡四邊赤腫方

出聖濟總錄

胡荽握一生地黄一兩

右細切搗絞汁空心頓服一盞許

升麻湯

出聖濟總錄

治傷寒熱毒氣盛發瘡如豌豆

升麻

半兩大黃

剉碎微炒一兩

黃連

去鬚

甘草

炙剉各三兩

山梔子仁一兩

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服日二

犀角湯

出聖濟總錄

治傷寒熱毒氣盛發瘡如豌豆

犀角

鎊二兩

麻黃

去根節

黃連

去鬚各半兩

木香

一兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

大青湯

出聖濟總錄

治傷寒天行壯熱頭痛發瘡如豌豆偏

身

大青

一兩

山梔子仁

犀角

各半兩

右搗篩每服三錢水一盞入豉一百粒煎至七分去

滓溫服

牡丹湯

出聖濟總錄

治傷寒熱毒發瘡如豌豆

牡丹皮

山梔子仁

黃芩

去黑心

大黃

剉炒

木香 麻黃去根節

右等分判如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去

滓溫服良

化毒湯

出聖濟總錄

治傷寒發斑豆瘡欲出

甘草

微炙一兩

黃連

去鬚微炒一兩

右判如麻豆大每服五錢水一盞半去滓溫服不計

時

內消散

出聖濟總錄

治傷寒熱病欲生豌豆瘡毒未出今不

成

用墨一分以酒二合磨令頓服之

紫草飲

出聖濟總錄

治傷寒熱病生皴瘡煩躁迷悶

用紫草并根細剉二兩搗篩每服三錢水一盞煎

至七分不計時溫服

竹葉湯

治傷寒時氣發瘡如豌豆煩悶

苦竹葉

切小麥

各二兩

石膏

碎三兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不

計時

龍腦丸

出聖濟總錄

治傷寒時疾發豌豆瘡及赤瘡子未透

心煩狂躁氣喘妄語或見神鬼

用龍腦一錢細研旋滴猪心血和丸如雞頭實大

每服一九紫草湯化下少時心神便定得睡瘡復

發透依常將息安

黑散子

出聖濟總錄

治傷寒熱病初出豌豆瘡三五箇便服

此令瘡不出

用臘月猪糞以新砂瓶子盛瓦盖口炭火燒令通
赤取出安地上出火毒入乳鉢研細每服一錢空
心新汲水調下

紫草湯出聖濟總錄治傷寒發斑疹豆瘡

紫草 荊芥 惡實等分

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

晉中書令王珉傷寒身驗方

用樺皮濃煮汁冷飲主傷寒時行熱毒瘡特良今

之豌豆瘡也

治傷寒發豌豆未成膿

出千金方

用芒硝以猪膽相和塗瘡上立效

痂落無痕仍用黃土抹上良

木香散

出活人書

治瘡煩痛者

青木香

一兩

薰陸香

礬石

丁香

各一兩

麝香

半兩

右呖咀以水四升煮取一升半分兩服熱毒盛者加

犀角一兩無犀角以升麻代病輕者去礬石神驗

治豌豆瘡初發覺欲作者方

出千金方