

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷七十



北京中醫藥大學圖書館版權所

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷七十

編輯外科心法要訣目錄

股部

附骨疽

咬骨疽

股陰疽

橫痃疽

陰疽

伏兔疽

股陽疽

環跳疽

肚門癰

箕門癰

腿遊風

青腿牙疳

膝部

膝癰

疔疽

膝眼風

鶴膝風

下石疽

緩疽

委中毒

上水魚

人面瘡

御纂醫宗金鑑卷七十目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷之十

無賴外科心法要訣

附

目

疳

圖

疳積

附目疳在大腿夕側注
兩腿同



欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑

一

咬骨疽圖

咬骨疽在大腿裏側漫腫兩腿同



股部

附骨疽 咬骨疽

附骨大腿外側生在腿裏側咬骨名體虛寒濕乘虛入寒熱往來不炊紅痛甚徹骨難屈轉寒濕化熱腫胖形赤灸起炮無炮逆潰後最忌敗漿膿

註此二證生於大腿裏外外側屬足三陽經裏側屬

足三陰經附骨疽生於大腿外側咬骨疽生於大腿裏側由體虛之人露卧風冷浴後乘涼寒濕侵

襲或房慾之後蓋覆單薄寒邪乘虛入裏遂成斯
疾初覺寒熱往來如同感冒風邪隨後筋骨疼痛
不熱不紅甚則痛如錐刺筋骨不能屈伸動轉經
久陰極生陽寒鬱為熱熱甚腐肉為膿外形腫胖
無頭皮色如常漸透紅亮一點內膿已成凡治此
證初起寒熱往來覺痛時輕者即服萬靈丹重者
服五積散加牛膝紅花痛處用雷火鍼鍼之發汗
散寒通行經絡膿成開之潰後餘治俱按潰瘍門

又有漫腫疼痛發於尻臀部位者宜服內托羌活湯又有發於腿之裏側近膝者屬足太陰脾足厥陰肝二經部位宜服內托黃耆湯又有發於腿外側者屬足少陽膽經部位宜服內托酒煎湯又有發於腿之正面者屬陽明胃經部位頭目昏眩嘔吐不食胸膈不利心煩熱悶者宜服茯苓佐經湯又有發於腿之裏側屬太陰脾經部位骨節炊痛四肢拘急自汗短氣小水不利手足浮腫者宜服

附子六物湯又有發於腿之後面屬足太陽膀胱經部位腿足攣痺關節重痛憎寒發熱無汗惡寒或兼惡風頭痛者宜服麻黃佐經湯又有三陰不足外邪過盛大腿通腫皮色不變疼痛日增不消不潰者此屬虛寒骨冷急服大防風湯補虛逐寒日久消之不應者勢欲作膿外用隔蒜片灸之起炮艾爆有聲為吉灸之無炮骨中不覺熱者屬逆灸後宜服十全大補湯加牛膝羌活防已或八珍

湯加附子補托之膿成股痛鍼之出黏白膿為順
若出白漿水或豆汁者俱為敗漿終屬險候數證
潰後內外治法亦俱按癰疽潰瘍門以上之證皆
由沉寒痼冷中來外敷內服不可用苦寒損脾泄
氣等藥犯之必至氣血冰凝內肉瘀腐日久化為
污水不治之證也按準繩等書云傷寒汗後餘邪
成流注流注之壞證成附骨疽夫汗後流注易愈
惟失治乃為壞證不能復生似不能變成附骨疽

況附骨疽係調治可愈之證若果數變之後則壞而又壞矣又豈能復有成功乎是流注壞證變成附骨之說存而不論可也

雷火神鍼

蘄艾 三錢

丁香 五分

麝香 二分

藥與艾揉和用夾紙一張將藥平鋪紙上用力實捲如指粗大收貯臨用以紙七層平放患處將鍼

點着一頭對患向紙捺實待不痛方起鍼病甚者
再鍼一次七日後火瘡大發其功甚效

方歌雷火神鍼攻寒濕附骨疽痛鍼之宜丁麝二香共

蘄艾燃鍼痛處功效奇

內托黃耆湯

黃耆

鹽水拌炒

當歸

木瓜

連翹

去心

柴胡

各一錢

羌活

肉桂

生地

黃蘗

各五分

酒水各一鍾煎一鍾空心熱服

方歌

內托黃耆歸木瓜羌柴翹桂地蘗加疸生膝股肝

脾位酒水煎之服最佳

內托酒煎湯

當歸

黃耆

各二錢

柴胡

一錢五分

大力子

連翹

去心

肉桂 各一錢

升麻

黃蘗

甘草

各五分

酒水各一鍾煎一鍾食前服

方歌

內托酒煎寒濕凝腿外少陽附骨生歸耆大力柴

翹桂升蘗甘加酒水靈

茯苓佐經湯

白茯苓

蒼朮

米泔水炒