

# 欽定四庫全書

子部

證治準繩卷一百十三



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣舒依

編修臣倉聖脈覆勘

問答

王肯堂 撰

其狀大癰不急治之百

其狀不大初從小指發急

治去之其狀黑者不可消輒益不治百日死 薛脚發  
之證屬足三陰經精血虧損或足三陽經濕熱下注若  
色赤腫痛而潰膿者屬濕熱下注為可治若色微赤微  
腫而膿清者屬精血虧損為難治若黑黯不腫痛不潰  
膿煩熱作渴小便淋瀝者陰敗未傳惡證也為不治其  
法濕熱下注者先用隔蒜灸活命飲以解壅毒次服益  
氣湯六味丸以補精氣若色黯不痛者着肉灸桑枝灸  
以行壅滯助陽氣更用十全大補湯八味丸壯脾胃滋

化源多有復生者若專治其瘡復傷元氣吾未見其生者 閣老靳介菴脚指縫作痒出水腫焮脚面數止痒之藥不應服除濕之劑益甚余以為陰虛濕熱下注用六味地黃丸補中益氣湯愈 大叅李北溪左足赤腫作痛此足三陽經濕熱下注先用隔蒜灸活命飲一劑其痛頓止灸患處出水赤腫頓消次用托裏消毒散四劑灸患處出膿而愈 儒者楊舉元患此微腫痛微赤焮此足三陽經陰虛濕熱下注用隔蒜灸托裏散而起

發用十全大補湯而膿成又與加減八味丸料百劑而  
歛一儒者患此腫硬色白兩月餘矣此足三陰經虧  
損為外寒所侵用大防風湯及十全大補兼服而消後  
場屋不利飲食勞倦前症復作盜汗內熱飲食不化便  
滑肌瘦此脾土虛寒而命門火不能相生用八味丸益  
氣湯百餘劑喜其年壯得愈一男子腳心發熱作渴  
引飲或用四物芩連黃蘗知母葷腹痛作嘔煩熱大渴  
此足三陰虧損前藥復傷脾胃也先用六君加炮薑數

劑而脾胃醒再用補中益氣加茯苓半夏而脾胃健乃以加減八味丸兼服半載而愈 一儒者脚心發熱作

痒以滾湯浸漬潰而出水肌體骨立作渴吐痰此脾腎虛而水泛為痰也服益氣湯六味丸年餘元氣復而諸證愈 少宗伯顧東江面黧作渴余曰此腎經虧損當滋化源以杜後患彼雖然之而終不服次年九月內左足面患疽色黯不痛脚腿沉重用隔蒜灸三十餘壯足腿即輕瘡出血水數日而消瘡色仍黯時公將北行賀

祝萬壽余診之曰脾脉衰憊陽氣虛極不宜遠行公曰  
余得夢屢驗向夢羣仙待我此壽徵也至河間驛聚仙  
堂病篤歎曰立齋豈能留我果卒於此亦異數也

### 脫疽

靈樞云發於足指名曰脫癰其狀赤黑者死不治不赤  
黑者不死治之不哀急斬之否則死矣 鬼遺云瘡敦  
疽發兩足指五日不冗死四日可刺其色發黑癰者不  
堪未過節者可治 足指生疔重者潰而自脫故曰脫

疽或曰惟足大指患之為脫疽其餘足指患之曰敦疽  
易治惟脫疽難治 初發結毒焮赤腫痛者以五神散

及以紫河車金線釣葫蘆金雞舌金腦香搥爛敷及以  
汁塗傳又以萬病解毒丸磨醋煖塗之 未成焮痛者

除濕攻毒更以隔蒜灸之至不痛用十二經消毒散加  
引經藥若腫勢盛未得緊急者宜作蛇傷治之及作瘡  
氣治之効 未成焮痛或不痛或大痛者宜隔蒜灸更  
用解毒以消毒萬全湯臨證加減 未成若色黑急割

去速服補劑庶可救若黑涎上不可治 未成若色赤  
焮痛者托裏消毒更兼灸以人參敗毒散去桔梗加赤  
牛膝銀花白芷大黃痛止次以十宣散加天花粉金銀  
花赤牛膝 未成欲成若色紫不痛隔蒜灸五十壯尚  
不知痛又明灸之 活命飲次以托裏散潰脫而愈

未成欲成大痛色赤而腫隔蒜灸至痛止以加味荆芥  
敗毒散加赤牛膝銀花白芷大黃次以活命飲 薛脫  
疽因醇酒炙燂膏粱傷脾或房勞損腎故有先渴而後

患者有先患而後渴者若色赤作痛自潰者可治色黑  
不潰者不治色赤作痛者元氣虛而濕毒壅盛也先用  
隔蒜灸活命飲托裏散再用十全大補湯加減八味丸  
色黯不痛者腎氣敗而虛火盛也隔蒜灸桑枝灸亦用  
十全大補湯加減八味丸則毒氣不致上侵元氣不致  
虧損庶可保生亦有因修手足口咬等傷而致者若元  
氣虛弱或犯房事外塗寒涼內服剋伐損傷脾胃患處  
不潰若黑黯上延亦多致死重者須當以腳刀轉解周

界輕拽去之則筋隨骨出而毒得洩亦不痛否則毒筋  
內斷雖去而仍潰且偏僻之處氣血罕到藥難導達况  
攻毒之劑先傷脾胃不若灸法為良重者須解去為善  
故孫真人云在肉則割在指則截蓋親之遺體雖不忍  
傷而遂至天歿則尤傷矣况解法無痛患者知之一  
人足指患此焮痛色赤發熱隔蒜灸之更以人參敗毒  
散去桔梗加金銀花白芷大黃二劑痛止又十宣散去  
桔梗官桂加天花粉數劑而平 一人年踰四十左足

大指赤腫焮痛此腎經積毒下注而然名曰脫疽喜色  
赤而腫以人參敗毒散去人參桔梗加金銀花白芷大  
黃二劑更以金銀花甘草節瓜蒌四劑頓退再以十宣  
散去桔梗桂加金銀花防已數劑愈一人患此色紫  
赤不痛隔蒜灸五十餘壯尚不痛又明灸百壯方知乃  
以敗毒散加金銀花白芷數劑而愈一膏梁年踰五  
十亦患此色紫黑脚焮痛孫真人曰脫疽之證急斬之  
去毒延腹必不治色黑不痛者亦不治喜其飲食如故

動息自寧為瘡善證遂以連翹敗毒散六劑更以金銀  
花甘草節瓜蒌二十餘劑患指潰脫更以芎歸生芩連  
翹金銀花白芷二十餘劑而愈次年忽發渴服生津等  
藥愈甚服八味丸而止 大抵此症皆由膏粱厚味或  
房勞太過丹石補藥所致其發于指微赤而痛可治治  
之不愈急斬去之庶可保否則不治色紫黑或發于脚  
背亦不治或先渴而後發或先發而後渴色紫赤不痛  
此精氣已竭決不可治 一芻蕘左足指患一泡麻木

色赤次日指黑五日連足黑冷不知疼痛脉沉細此脾胃受毒所致進飛龍奪命丹一服翌日令割去足上死黑肉割後骨始痛可救治以十全大補湯而愈蓋死肉乃毒氣盛拒截榮氣所致况至陰之下血氣難達經云風淫末疾是也向若攻伐之則邪氣乘虛上侵必不救矣一人足指患之大痛色赤而腫隔蒜灸之痛止以人參敗毒散去桔梗加金銀花白芷大黃而潰更以仙方活命飲而痊一人足指患之色黑不痛令明灸三

十餘壯而痛喜飲食如常予謂急割去之速服補劑彼不信果延上遂致不救 一人足指患之色紫不痛隔蒜灸五十餘壯尚不知痛又明灸百壯始痛更投仙方活命飲四劑乃以托裏藥潰脫而愈 一人足指患之色赤焮痛作渴隔蒜灸數壯以仙方活命飲三劑而潰更服托裏藥及加減八味丸潰脫而愈若早用前法不至於此 一膏梁之人先作渴足熱後足大指赤痛六脉洪數而無力左尺為甚余謂此足三陰虛當滋化源

為主固服除濕敗毒等藥元氣益虛色黯延足余乃朝  
用補中益氣湯夕用補陰八珍湯各三十餘劑及桑枝  
灸潰而膿清作渴不止遂朝以前湯送加減八味丸夕  
用十全大補湯三十餘劑而痊是時同患此證服敗毒  
之藥者俱不救

### 附方

五神散 搽一切瘡毒蛇傷蝎螫大効

金線釣葫蘆

紫河車

各二錢

續隨子

去殼

雄黃

各一錢

麝