

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷三十三



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷三十三

刪補名醫方論卷八目錄

小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡桂枝湯

黃芩湯

黃連湯

黃連阿膠湯

理中湯丸

乾薑附子湯

茯苓四逆湯

附子湯

四逆湯

通脈四逆湯

白通湯

白通加豬膽汁湯

真武湯

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

吳茱萸湯

烏梅丸

赤石脂禹餘糧湯

白頭翁湯

御纂醫宗金鑑卷三十三目錄

欽定四庫全書

醫纂醫宗全錄卷二十三

則補名醫方論卷八

柴胡湯

治傷寒五六日寒熱往來

煩渴口苦耳聾目赤

證宜此湯以和解之

脇苦滿嘿嘿不欲飲食
者此是少陽經半表半

人參 三兩

半夏 半升

甘草

炙 三兩

生薑

切 三兩

大棗

十二枚 擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

若胸中煩而不嘔去半夏人參加枳實

若渴者去半夏加人參栝蒌根

若腹中痛去黃芩加芍藥

若脇下痞鞭去大棗加牡蠣

若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓

若不渴外有微熱者去人參加桂枝溫覆取微似汗愈

若欬者去人參大棗生薑加五味子乾薑

集註程應旂曰方以小柴胡名者取配乎少陽之義也

至於制方之旨及加減法則所云上焦得通津液得下胃氣因和盡之矣何則少陽脈循脇肋在腹

陽背陰兩歧間在表之邪欲入裏為裏氣所拒故
寒往而熱來表裏相拒而留於歧分故胸脇苦滿
神識以拒而昏困故嘿嘿木受邪則妨土故不欲
食膽為陽木而居清道為邪所鬱火無從泄逼炎
心分故心煩清氣鬱而濁則成痰滯故喜嘔嘔則
木火兩舒故喜之也此則少陽定有之證其餘或
之云者以少陽在人身為遊部凡表裏經絡之罅
皆能隨其虛而見之不定之邪也據證俱是太陽

經中所有者特以五六日上見故屬之少陽半表
半裏兼而有之方是小柴胡證方中以柴胡疏木
使半表之邪得從外宣黃芩清火使半裏之邪得
從內徹半夏豁痰飲降裏氣之逆人參補久虛助
生發之氣甘草佐柴芩調和內外薑棗佐參夏通
達榮衛相須相濟使邪無內向而外解也至若煩
而不嘔者火成燥實而逼胸故去人參半夏加枳
蒡實也渴者燥已耗液而逼肺故去半夏加枯薑

根也腹中痛木氣散入土中胃陽受困故去黃芩以安土加芍藥以戢木也脇下痞鞭者邪既留則木氣實故去大棗之甘而泥加牡蠣之鹹而栗也心下悸小便不利者水邪侵乎心矣故去黃芩之苦而伐加茯苓之淡而滲也不渴身有微熱者半表之寒尚滯於肌故去人參加桂枝以解之也欬者半表之寒湊入於肺故去人參棗加五味子易生薑為乾薑以溫之雖肺寒不減黃芩恐乾薑助熱

也總之邪在少陽是表寒裏熱兩鬱不得升之故
小柴胡之治所謂升降浮沉則順之也

大柴胡湯

治熱結在內心下急嘔不止鬱鬱微煩柴胡證仍在者與大柴胡湯下之

柴胡

半觔

黃芩

三兩

半夏

半升

芍藥

三兩

枳實

四枚

大黃

二兩

生薑

五兩

大棗

十二枚

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服

一升日三服

註

柴胡證在又復有裏熱故立少陽兩解法也以小柴胡湯加枳實芍藥者仍解其外以和其內也去參草者以裏不虛少加大黃以瀉結熱倍生薑者因嘔不止也斯方也柴胡得生薑之倍解半表之功捷枳芍得大黃之少攻半裏之効徐雖云下之亦下中之和劑也

柴胡桂枝湯

傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結
此太陽少陽併病也柴胡桂枝湯主之

柴胡 四兩

桂枝 一兩半

人參 一兩半

甘草 一兩

半夏 二合半洗

黃芩 一兩半

芍藥 一兩半

大棗 六枚擘

生薑 一兩半切