




曰通身部

通身流注



流注

流者行也。注者住也。或結塊或慢腫。皆因素有癰火。或外感風寒。和氣流行至其癰注之處。乃榮。或內傷鬱怒。以致癰火驟榮。內傷房室陰虛。陽氣湊聚。逆于肉理。乃成。或內傷勞役。飲食搏動。乃榮。或跌撲閃挫。一時氣逆。血凝。乃成。或產后惡露未盡。後被感傷。凝注。多生四肢。或胸腹腰臂關節之處。

初起宜用葱熨法。甚者用癰核內十六味流氣飲。虛者大劑風內亡毒。少湯加羌歸。或癰疽因補中益氣湯加木香枳殼選用。令其自消自消。若清久不斂者。縱有表邪。只托裏為主。以癰癰內八味丸。八物湯加芪桂。或癰疽類托裏益氣湯。更佐以豆豉。

出于外腎亦死原因感受惡風入于脉理或烟瘡地面傷寒瘡後

及感蛇毒所致二十已後四十以前皆積傷之毒入胃壅聚乃

成四十已後六十以前乃血閉不壅熱積血得之

治宜宣毒行血用瓜蒌根酒煎入乳香沒藥五靈脂皂刺等分

以土其毒次用清心行血之劑如係蛇毒赤豆蜈蚣最妙雄黃

白芷次之或蠟礬丸冷酒入射香送下外用荆芥白芷川椒葱

白煎湯入鹽俟湯溫自手臂上塗下。一日三次其瘡疽毒氣走

腫所至處宜紫繫之自手紫者毒走至心。自足紫者毒走至腎

不散。各有小紅筋尋其筋之住處灸三炷即瘡。經云在指則截。

在肉則割。恐毒氣入心入腹令人煩燥嘔噎昏悶。或瘡出清水

穢汁者腎虛極也。久人至速。此瘡極虛引風。癰疽開一寸。則一寸引風。非必風入于其中。風邪襲虛則肉爛透骨。惡血橫流。宜南星半夏白芷稍。最能去風。可以頻敷。其諸療理。推廣癰疽法度行之。

癰發

凡瘡氣血相搏。有頭有面。風邪內作。無頭無面。若癰無頭面。瞰裏開瘡。低貼肌肉。走注牽連。生於手足。或掌心。或腰腿。或臂下伸縮之處。初起渾身壯熱。手足不遂。增寒頭痛。虛渴多汗。嘔逆四肢沉重。較之諸瘡煩渴為甚。或腫毒已平。數月後復於他處大發。但作肉色微帶淡紅。終不能救。大要培養內氣。以防滑瀉。如瘡出米泔

汁者必死。

治與癰疽類推

癰毒

癰毒之症。多內因飲食熱毒。外感寒氣暑氣而成。治者亦宜詳因而施。

癰毒內消。治宜以當歸尾

赤芍稍

白芷稍

防丰肉

石乳香

真沒藥

川山甲

炒成珠

連喬酒煎服。如癰毒在上。加升麻或

以黃栢

半一錢

五倍子

五錢

共為末。醋調敷。留口。

如癰毒生于脚腿肚上。俱有者。宜用川牛膝

薏苡仁

川菴活

川厚朴

杭白芍

尖旗郎

官桂

蒼朮

海桐皮

陳蘗梗

南木香 大甘草酒煎服七八服乃愈

如暑月胃弱小兒滿頭生瘡 治宜用香茹 扁豆 白芷粉

厚朴 黃連 羌活 防風 連翹 煎服四五服或外用木

槌花搗爛敷之

如瘡甚痛腫不用針力。只以新鷺生的卵壳燒灰存性醋調塗自

破出血

如瘡甚膿收出不出。宜以敷鹽柴根老鴉葛二味收水煙口上。即

出膿

如瘡甚膿不乾宜用薤菜打爛同蜂蜜調敷四弦

瘡毒外治總方。用芙蓉葉白馬屎白芷山枇杷葉松木皮共為末

水調敷

軟癰 用陳早占穀存性為極細末有水乾攤無水麻油調搗不
過五六次即愈

又方 用鮫魚牙燒灰。麻油調搗或猪子肥皂去子入鹽子內
火燒過為末麻油調搗

又方 用篩過石灰炒赤與枯元及糯米飯搗爛搗上
如多年不愈者用猪鬃上毛貓鬃^上毛各一握燒存性。鼠屎一粒
乾粉少許共為末調油調敷

癰疽 即癰疽又名大麻瘋

是症受天地間肅殺風氣酷烈暴悍。最為可畏。一因風毒。或汗出

解衣入水。或酒後受風。二因濕毒。或坐卧濕地。或冒雨露。三因傳
染。或未必皆由外也。內傷飲食。熱毒過甚。大寒大熱。腐苔穢污。以
致大動血熱。更加外感風寒。冷濕。乃者。初起身上虛痒。或起白屑
紫雲。如癰風狀。或發紫疱。宛瘡流膿。上先見者。氣分受病。上先見
多下先見者。血分受病。下傳必多。上下俱見者。氣血俱病。從上而
下者。為順風。從下而上者。為逆風。但從上從下。以漸來者。可治。頓
發者。難愈。治失其法。以致皮死麻木不仁。脉死血清。成膿肉死。割
切不痛。筋死手足緩縱。骨死鼻梁崩塌。口失眉落。眼昏唇靨。舌嚙
甚則齧傷眼目。或腐爛之莖。拳肢伸屈。至于此。天刑難解。
左圖製治大風。初起先用烏蘘葉搗爛炒熱。遍身久熨。又用苦

練根杉木根茶葉樟葉茅萸葉土烏藥葉各煎水遍洗便愈
減一半只服後藥

防風肉

荆芥穗

淨連翹

白蘇荊

金銀花

海桐皮

白蘇皮

何首烏

真青藤

蔓荊子

威靈仙

皂角刺

石菖蒲

土牛膝

宣木瓜

薏苡仁

大楓子

川續斷

土苦參

胡麻仁

老婦尾

白芷枹

川黃連

赤芍梢

川椒活

北柴胡

大耳草

渴加天花粉

耳草

少下余均合

不記數每茶醇酒同收多服切忌鹽併各毒物若有瘡口用

蒼木荷葉同為末塗上自愈

如虛元傳治屬風症眉毛脫落鼻樑倒塌遍身生癩者治宜

聖化丹

川芎

防風

荊芥

羌活

獨活

各一兩

胡麻

炒

苦參

去皮

金毛狗

去毛

牙皂

各一兩

黃芩

各二兩

蟬退

姜黃

炒

全蝎

去尾

何首烏

去皮

桑白皮

各一兩

白芷

和

蒼耳草

炒

各五錢

右為細末

大楓子

去壳

搗爛

如泥

同藥

和勻

將陳米飯

打糊

為丸

如梧子大

每服四十至五十丸

如病人牙上浮腫

眉上

痒不止

或患風氣

攀睛

手足拘攣

先服此藥

一料

用清茶送

下日進四服

或婦人四肢麻痺

手刺痛

腿膝生瘡

先服奪命

丹一料

後服此聖化丹

服藥後十日

在鋒面上放血

次于臍

上放血

後于腿脚放血

如遇天氣清明

五六日放一次

量病

上放血

後于腿脚放血

如遇天氣清明

五六日放一次

量病

輕重不可亂放血差婦人多破血无妨

祖傳用木剝子炒泡草烏炒老公鬚炒川烏泡細辛青木香

大黃肉桂各一常歸酒炒雄黃三蜈蚣一條青竹蛇一條右

為細末酒打糊為丸如梧實大每服五十九日陽送下

王氏傳用川芎生地常歸赤芍白芷羌活威靈仙

姜茶炭利煇退天麻炒黃柏烏藥荆芥川山甲

防丰炒胡麻子炒石菖蒲金銀花五靈脂各五

川烏煇皂刺炒草烏炒金帽大楓子蜈蚣一條

蒼耳子各白花蛇一條右為細末老米打糊為丸如梧實

大每服五十九酒送下

姜氏換肌散 一治癩風年深不愈以致眉髮脫落鼻塌崩潰者

方可服之

烏梢蛇酒 白花蛇酒 各三

天麻

細辛

白芷

蔓荆

古降

苦參

甘菊花

荆芥

威靈仙

川木賊

紫參

沙參

甘草炙

不灰木

天門冬

赤芍藥

川芎

胡麻

定風草

何首烏

紫苑炭 荆

石菖蒲

蒼朮

木剝

草烏 各一

共各製過為末每以

五錢數溫酒調服

梅瘡

楊梅瘡症多由肝腎脾內風濕挑之毒。間有天行溫毒傳染。但形

如楊梅瘰癧紅濕爛瘡痛屬心多生乳脇形如鼓釘黃豆者屬脾多
生滿面謂之大風豆形如綿花屬肺多生毛髮形如紫葡萄按之
緊痛者屬肝腎多叢生脈臂及肋骨之處如瘰癧于鬢額口鼻鼓通
邊者屬陽明及少陽太陽如瘰癧于臍陰莖脇肋者屬肝腎及太
陰大抵上先是者氣分受病上作必多下先是者血分受病下作
必多上下俱見者氣血俱病

初起即服方括內防風通聖散一貼去麻黃用硝黃以去內毒
待胃氣稍定再以一貼去硝黃用麻黃紫汗以去外毒已後用

歸尾

小芎

牙皂

荆芥

銀花

木通

牛膝

薑以仁

蘇皮

羌活

獨活

木瓜

防風

甘草

各等

土茯苓

半

分作六貼。酒水同煎服。外用輕粉二錢油。包置銀硃一錢。

包置菜豆粉。內收鉛粉五分。置傾銀小鍋內煨至黃色。膽礬三分。杏仁。

二十箇搗去皮火。共為末。或麻油。或猪膽汁調搽。

應圖製治梅瘡神效方用。紅花。防丰。天花粉。金銀花。每貼土茯

苓。四。西。全。煎。空心服。外用。杏仁。半。夏。各一錢。輕粉二錢。為末。

猪膽汁調搽。

如生在玉莖上爛而痛者。仍先服下藥二貼。後服川萆薢三兩。

金銀花二錢。山慈姑二錢。紅花。紫草各一錢。烏梅四箇。共分作

四貼。每貼用燈心全煎。服外用杏仁去皮。龍牙即龍骨也。如

輕粉錢各一。冰片七厘。共為末。濕則攪。乾則用猪脚上火筒骨髓。

調搽

如瘡似靴釘及掩蓋厚者。用人言一錢為末。以小紅棗去核搗爛。包人言入炭火內煨過為末。猪膽調搽。

如虛兒傳水火丹。

牙硝

青礬

白礬

淮鹽各一兩

水銀

五錢

朱砂

硼砂

各半

冰片

半分

苦研如泥。

不見水。

銀星為度。

用銀

鋪砂窩一箇。

燒紅。

入前藥。

將砂窩覆于碗內。

以火布作條。

塞四圍。

用瓦打破。

取三角。

四圍

排佈周密。

以炭填四圍。

堆通砂窩。

又用脚盆注水。

將大碗置盆

內。

水淺大碗半寸許。

即葦火扇紅。

俟盆內水熱住火。

俟砂窩冷。

取去砂窩。

起火碗上丹砂收貯。

每用三分。

搗飯為丸七粒。

每日