

大頭腫

大頭腫。又名雷頭風。此症乃濕在高巔之上。故頭面痛腫。疙癢甚。則咽噎堵塞。害人最速。冬溫後。多病此症。有似傷寒。熱身痛。治宜分表裏三陽。

病大頭腫。如脉浮表症。多者宜清表陽。或方括歌內。荆防敗毒散治之。

清表陽

升麻

蒼木

各一兩

蓮葉

一皮

水煎

服

脉沉裏症見者宜羌黃湯為主

羌黃湯

羌活

酒炒

黃芩

酒炒

大黃

酒蒸

如連兩目鼻面腫者陽明也。宜羌黃湯加乾葛升麻芍藥石膏。

如發耳前後并額角者。少陽也。宜羌黃湯加瓜蒌仁牛蒡子。
如腮後項下腫起者。太陽也。宜羌黃湯加防牛荊芥俱水煎時。
呷之。取大便和氣去則止。甚者加芒硝。

如咽喉腫痛者。姜棗一兩。大黃二兩。蜜丸如彈子大。井水化服。
如表裏俱解。腫不消者。礞鋒去血。外用通園散細辛牙皂信羊躑

躑及藜蘆少許。搗鼻嚏以泄其毒。

如久不食欲作膿者。內服方括散。內托裏消毒散。

如清後腫赤不消膿清也。白者宜六君子湯加桔梗芎歸。

六君子湯 陳皮 半夏 人參 白朮 茯苓 甘草

如元氣素弱脉微者。用人參白朮高麗川芎陳皮柴胡升麻甘草。

等分。以升平陽氣。用牛蒡子玄參連翹括梗減半。以解熱毒。要
知腫赤。便屬純陽。脉微便屬純陰。慎之慎之。

頭瘋神方 翠鳥舌一個。以桐油浸晒乾。復浸。如此不計其數。要
舌硬如三稜針一般。方住。遇頭瘋發。將鳥舌於舌上亂針。即愈。
不過三五次。即如根。

邊頭疼風 一邊頭疼如破。可針。先用開門散。次用咽喉內地黃

散。令紫證散服。后用補藥。

開

明散

川芎

五錢

白芷

一兩

北辛

去莖

薄荷葉

五錢

為末。每服

二錢。食後用葱湯。或熱茶。或水調下。後服用茶葱煎熱水下。

醫疽

髮疽之瘡。迺肝胆怒火。或風熱腎虛。血燥脾勞所致也。方宜隨瘡治之。

如怒火風熱。宜柴胡清肝湯。腫痛甚者。急用腦癰內活命飲。

柴胡清肝湯 柴胡 小梔 炒 白芍 黃芩 人參 連翹

桔梗

如腎水不能生木。致肝胆火盛。血燥。髮及頭目腫痛者。或日晡潮熱。宜用芫花。以芍白芍。熟黃。柴胡。桔梗煎服。

如因勞役。腫痛。寒熱。喘渴。自汗者。宜補中益氣湯。去升麻。柴胡。加五味。麥門冬。炮姜煎服。

補中益氣湯 人參 黃芪 甘草 白朮 柴胡 芫花

升麻 陳皮 半夏

鬢發單方。用頭髮燒灰香油調搽。

耳瘡

耳瘡之瘡。遇三焦肝風熱。或血虛腎虛火動所致。不可不隨症而治之也。

耳瘡發熱。焮痛。屬三焦厥陰風熱。宜鬢疽內柴胡清肝湯。
內熱疼痛出膿。寒熱潮數。牽引胸脇脹痛。屬肝火血虛。宜八味逍
遙散。

高歸 白芍 茯苓 白朮 柴胡 車前 牡丹皮

枝子仁 甘草

耳中有膿。乃腎經氣實熱上冲耳。遂使津液壅滯為膿。或小便見沫。

浴水入耳中。停面搏於氣血。醒膿。或膿治。宜用黃龍散。枯白元。幾

龍骨

研一錢 黃丹 一錢

胆脂 一錢 射香 少許

為末。先以綿拭。子振

去耳中膿。方以藥摻入。內日。用之。勿令風入。

耳內出膿。臭熱癢痛。用饅頭草洗淨。入鹽少許。共搗爛。稍中濾汁。

滴入耳內。後用枯白元末。將筆管吹入其中。二三次。効。

耳邊眼。下赤爛濕癢。用黃丹煨赤色。白元 飛過 菜豆粉。各一錢。為

細末。乾摻瘡上。或噴調搽上可。

耳內忽火痛。如有虫在內奔走。或有血水。或乾痛不可忍。宜用

蛇退皮。燒存性。為末。以鴨管吹入耳中。

耳間疼痛。如刀割。出血流膿。久不能名。鴉屎夜明砂。吹入內。甚神。

耳濕用陳皮燒灰吹入耳中數次神効。

耳底用桑標標硝一個慢火炙八分熟存性入射一字為末每用半

字搽耳內如有膿先用綿拭去膿方搽。

聾耳神方 用蒼木削尖入耳孔內將艾火置蒼木頭上灸六七

壯即愈。

合架風 兩耳下生一舌核紅腫牙關緊閉口不得開剪刀微開

以竹筴入內灌地黃散令紫証散。右方俱見咽喉齧

皮株子風 兩耳隱腫生核者老人多有此疾直服咽喉內紫證

散化黃散及大頸腫內同同散。

百重入耳 用兩刀於耳邊相磨要作声即出或用麻油灌之即

出。

又方用桃葉按碎。塞耳自出。

又方用葱涕灌耳中。虫自出。

或用塞蒜敷自出。

蛇蟥入耳

用猫尿灌耳立出。

取猫尿用盆盛猫。以生姜擦耳。

蒼蠅入耳

用皂角子研爛。用生鱔魚血灌耳中。

蟻子入耳

用猪精肉一指。火炙令香。置耳孔邊即出。

蜈蚣入耳

用以姜汁。或韭汁灌耳自出。或以熟雞肉一塊。置耳

邊自出。

雜物入耳中不得出。以麻繩剪一頭散。溶牛膠在上。探入耳中。

使其物粘了。徐徐引出效。

水入耳中

用薄荷汁點了效。

黃豆入耳中。用鵝翎剪截長一二寸許。去其中膜。留少許於一頭。以有膜之頭入耳中。口氣吸。即出。

內疳

內疳之症。生于口上。腮邊。初發如蓮花。根蒂小。而下垂。延大。是。最。虛。多。元。氣。薄。也。

古方治法。以鉤刀決其根。燒。燒。烙。以止其血。次以雄黃輕粉。及。

霜。白芷。白欬。為末。敷之。以槐枝作枕。支其牙。矧。同。必使口含。一。二。時。許。瘡。癰。至。合。口。自。便。次。日。出。膿。以。生。肌。散。撒。之。

走馬牙疳。用紅棗。一個。去核。包。信。少。許。以。濕。布。裹。定。火。內。燒。并。

黃蘗。為。末。貼。牙。上。

小兒口中生瘡。用薄荷荊芥各一錢。柏葉三分半。甘草二分。共
為末。入朴硝青黛硃砂各三分。和勻。以絹帛拭去口中白。將前
藥少許點舌。或蜜調搽。如泄瀉。用乳調更妙。

口舌瘡

夫口舌為病。或為糜爛。或為重舌。木舌。原其因。未有不因
七情煩擾。五味過傷之所致也。

口瘡用綠袍散。黃柏一錢。青黛二錢。右為末。搽患處。含之。吐出涎
即愈。或單用白朮口含一二時。亦涎數次。如神。

又方。用黃連黃柏黃芩梔子細辛乾姜。右各等分。為細末。先用
米泔水漱口。後搽藥于患處。吐涎不拘神效。

上膈癰毒舌上生瘡咽喉腫痛用升麻赤芍人參桔梗乾葛各錢半甘草七分水煎徐徐服

口爛出涎用金化丸見症為荷寒水石各三分粉草炙芒硝各一錢白元便通二分蜜丸噙化

口舌痛生瘡用上清丸薄荷葉三兩礪砂五錢天花粉一兩天竺黃五錢風化硝百藥煎防丰孩兒茶甘草各一兩桔梗七錢右為細末煉蜜為丸如彈子大每用一丸噙化

口氣口乾口舌生瘡生礪砂二錢片腦麝香各一分馬牙硝四錢風化寒水石煨一右為末以甘草膏為丸如麻子大不拘時含一丸

凡口瘡用涼藥不愈者。乃中氣虛相火泛上無制。用干姜人參白
木煎服。從治之即愈。甚者加附子。或用官桂末搽之。或用乾姜
黃連等分。為末搽之。涎出立效。

舌上腫破。用百草霜海鹽為末。井花水調敷。

又方。用蒲黃末。搽舌上。內以黃連一味煎湯服之。以瀉心火。

舌長過寸。古方用冰片敷之。即收。

舌無故出血如泉。以槐花為末搽之。即止。

舌上忽脹出口外。俗云是蜈蚣毒。用雄鵝血一小鐘。浸之。即縮入。

生云蓮花風。以舌下浮腫生毒。可針兩邊尖片。切莫針中央。先

用他黃散。次用紫證散。後用三味薑藥。或用角藥。
右方俱見咽喉內

木舌風 舌尖角生毒。難以轉移。紅腫破。用針。次用地黄散。方見

搶食風 飲食中忽生血泡在腮。及舌根左右。隨食脹塞。不能吞。

用芒針破。內服地黄散。合紫澄散。方見咽喉

噤口風 下唇腫痛。可針。可薑。先宜地黄散。次紫澄散。同服。散。黃地

散紫澄散。方見咽喉。同國散。見大所腫肉。

唇紫爛。生瘡。宜撒攪。不拘多少。燒灰。豬脂和敷患處。

口舌乾裂。破成瘡。用蘆耳石。三錢。火煨。文蛤一兩。黃柏一兩。蒼木幾

陰年石外三味同炒赤色。共研極細。入片腦三分。再研。用臘油

調敷唇上。

冰茶 南京仍稱浦傳 上品細茶。去梗一斤。用甘草濃煎。取汁調兒。

茶末二兩冰片一錢拌透細茶一錢次日曬乾收貯香口清膈
明不可言

香齋餅

南京傳

用孩兒茶四兩桂枝二兩薄荷葉一兩礞砂五錢
冰片二分爲末用甘草煮汁熬膏作餅噙化嚥下能清上化痰
香口

牙齦

夫齒者腎之標。滑之陰也。足陽明胃之脉。骨結于齒上齦。手陽明
大腸之脉。骨結于齒下齦。其間有腫痛異烟者。皆由腸胃中有積
和。或濕熱乃生也。唯痛乃動搖者。多屬腎元虛耳。治宜瀉陽明
之濕熱。更以擦牙珠車之劑投之。

上下牙齒疼痛不可忍。牽引頭腦滿面發熱大痛。此是過食辛熱之物所致也。治宜用 當歸身 生地黄 黃連 牡丹皮 各

升麻 一兩

剉碎水煎稍冷服

如痛甚加石膏 二錢

細辛 三錢

黃芩 一錢

細辛 三錢

大黃 一錢

一錢加防風 荆芥 各一錢

牙齒疼痛。牙齒齦肉將脫。血不止。治宜神功丸

藿香 二錢

當歸 一錢

生地黄 酒洗 三錢

黃連 五錢

升麻 二錢

木香 一錢

砂仁 五錢

生甘草 三錢

蘭香葉 一錢

右為末湯浸蒸餅為丸如棗豆

大。每服一百丸。加至二百丸。食遠白湯下。

牙床上下腫爛作痛。或因楊梅瘡。多服輕粉。致筋骨疼痛。乃作牙

腫爛者。治宜

神燈照眼法

乳香

沒藥

自出銅

各一

水銀 唾研

錫花

川烏

草烏

錢各半 雄黃

銀硃

白芷

錢各一 硃砂 八分

右為末 綿紙裹作條子 香油透點燈 以尾

片盛置斗內 或桶內 將手掩其口鼻 以日現燈 先將被發其等

手 勿令透氣 即愈 或有汗尤明

走馬牙疳及遍口瘡 落唇穿治宜

婦人溺桶中白垢 五錢 枯白

礬

白霜梅

枯 存性

各二錢 為末 聽用 可先將韭根 陳茶 煎濃汁

以雞翎蘸熱汁 刷去腐肉 洗見鮮血 然後敷藥 一日三次 爛至

喉者 以竹管吹入 忌油膩 雜魚 如山根 發紅點者 難治

牙痛神方

用花椒 五分

射香 一分

紅豆 二個 巴豆 二個

去油

為末作丸 如梧桐子大 將綿包捲放處痛處 涎不宜吞 立効