

欽定四庫全書

子部

傷寒論注釋卷五

五四



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院八品吏目黃發

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

傷寒論注釋卷四



金成無已注

辨太陽病脉證并治法下第七

問曰病有結胃有藏結其狀何如答曰按之痛寸脉浮
關脉沈名曰結胃也何謂藏結答曰如結胃狀飲食如
故時時下利寸脉浮關脉小細沈緊名曰藏結舌上白

胎滑者難治結胃者邪結在胃藏結者邪結在藏二者
皆下後邪氣乘虛入裏所致下後邪氣入

欽定四庫全書

傷寒論注釋

一

裏與陽相結者為結胃以陽受氣於胃中故爾與陰相結者為藏結以陰受之則入五藏故爾氣宜通而塞故痛邪結陽分則陰氣不得上通邪結陰分則陽氣不得下通是二者皆心下鞭痛寸脉浮關脉沈知邪結在陽也寸脉浮關脉小細沈緊知邪結在陰也陰結而陽不結雖心下結痛飲食亦自如故陰氣乘腸虛而下故時時自下利陰得陽則解藏結得熱證多則易治

藏結無

舌上白胎滑邪氣著結胃中亦寒故云難治

陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也

結藏

於法當下無陽證為表元熱不往來寒熱為半表半裏無熱其人反靜為裏無熱經曰舌上如胎者以丹田有熱胃中有寒邪氣以表裏皆寒故不可攻病發於陽而反下之熱入因作結

胃病發於陰而反下之因作痞所以成結胃者以下之

大早故也

發熱惡寒者發於陽也而反下之則表中陽邪入裏結於胃中為結胃無熱惡寒者發於

陰也而反下之則表中陰邪入裏結於心下為痞

結胃者項亦強如柔瘕狀下

之則和宜大陷胃丸方

結胃病項強者為邪結胃中胃腸結滿心下緊實但能仰而不

能俛是項強亦如柔瘕之狀也與大陷胸丸下結泄滿

大陷胃丸方

大黃

半斤味苦寒

葶藶

半斤熬味苦寒

芒硝

半斤味鹹寒

杏仁

半升去皮尖熬黑味苦甘溫

大黃芒硝之苦鹹所以下熱葶藶杏仁之苦甘所以泄滿甘遂取其直達白蜜取其潤利皆以下泄滿實

也物

右肆味搗篩貳味內杏仁芒硝合研如脂和散取如
彈丸壹枚別搗甘遂末壹錢匕白蜜貳合水貳升煮
取壹升溫頓服之壹宿乃下如不下更服取下為効

禁如藥法

結胃證其脉浮大者不可下下之則死

結胃為邪結胃中屬上焦之分

得寸脉浮關脉沈者為在裏則可下若脉浮大心下雖
結是在表者猶多未全結也下之重虛邪氣復結則難
可制故云
結胃證悉具煩躁者亦死

結胃證悉具邪結已深也煩躁者正

下之則死

氣散亂也邪氣勝正病者必死

太陽病脉浮而動數浮則為風數則為

熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒

者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛

客氣動膈短氣躁煩心中懊懣陽氣內陷心下因鞭則

為結胃大陷胃湯主之若不結胃但頭汗出餘處無汗

劑頸而還小便不利身必發黃也

動數皆陽脉也當責邪在表睡而汗出者

謂之盜汗為邪氣在半表半裏則不惡寒此頭痛發熱微盜汗出反惡寒者表未解也當發其汗醫反下之虛其胃氣表邪乘虛則陷邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉邪氣內陷動數之脉所以變遲而浮脉獨不變者

以邪結胃中上焦陽結脉不得而沈也客氣者外邪乘胃中空虛入裏結於胃腸腸中拒痛者客氣動腸也金匱要畧曰短氣不足以息者實也短氣躁煩心中懊憹皆邪熱為實陽氣內陷氣不得通於腸壅於心下為鞭滿而痛成結胸也與大陷胃湯以下結熱若胃中空虛陽氣內陷不結於胃腸下入於胃中者遍身汗出則為熱越不能發黃若但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利者熱不得越必發黃也

大陷胃湯方

大黃

陸兩去皮苦寒

芒硝

壹升鹹寒

甘遂

壹錢七苦寒

大黃謂之將軍以苦蕩滌芒硝一名消石以其鹹能熨鞭夫間有遂以通水也甘遂若夫間之遂其氣可以直達透結胃陷三物為允

右參味以水陸升先煮大黃取貳升去滓內芒硝煮壹兩沸內甘遂末溫服壹升得快利止後服

傷寒六七日結胃熱實脉沈而緊心下痛按之石鞭者

大陷胃湯主之

病在表而下之熱入因作結胃此不云下後而云傷寒六七日則是傳裏之實

熱也沈為在裏緊為裏實以心下痛按之實鞭是以為結胃與大陷胃湯以下結熱

傷寒十餘日

熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胃無大熱

者此為水結在胃脇也但頭微汗出者大陷胃湯主之

傷寒十餘日熱結在裏是可下之證復往來寒熱為正邪分爭未全歛結與大柴胡湯下之但結胃無大熱者

非熱結也是水飲結於胃脇謂之水結胃周身汗出者是水飲外散則愈若但頭微汗出餘處無汗是水飲不得外泄停畜而不行也
與大陷胃湯以逐其水 太陽病重發汗而復下之不大

便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少

腹鞭滿而痛不可近者大陷胃湯主之

重發汗而復下之則內外重亡

津液而邪熱內結致不大便五六日舌上燥而渴也日晡潮熱者屬胃此日晡小有潮熱非但在胃從心下至少腹鞭滿而痛不可近者是一腹之中上下邪氣俱甚也與大陷胸湯以下其邪
小結胸病正

在心下按之則痛脉浮滑者小陷胃湯主之

心下鞭痛手不可近

者結胃也正在心下按之則痛是熱氣猶淺謂之小結胃結胃脉沈緊或寸浮關沈今脉浮滑知熱未深結與

小陷胃湯以除
胃腸上結熱也

小陷胃湯方

黃連

壹兩
苦寒

半夏

半升
洗
辛溫

括萎實

大者壹
箇苦寒

苦以泄之辛以收之黃連括萎實
之苦寒以泄熱半夏之辛以散結

右參味以水陸升先煮括萎取參升去滓內諸藥煮
取貳升去滓分溫參服

太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脉微弱者此
本有寒分也反下之若利止必作結胃未止者四日復

下之此作協熱利也

太陽病二三日邪在表也不能卧但欲起心下必結者以心下結滿卧則

氣壅而愈甚故不能卧而但欲起也心下結滿有水分有寒分有氣分今脉微弱知本有寒分驚見心下結而反下之則太陽表邪乘虛入裏利止則邪氣留結為結胃利不止至次日復如前下利不止者是邪熱下攻腸胃為挾熱利也太陽病下之其脉促不結胃者此為欲解也脉

浮者必結胃也脉緊者必咽痛脉弦者必兩脇拘急脉

細數者頭痛未止脉沈緊者必欲嘔脉沈滑者協熱利

脉浮滑者必下血

此太陽病下之後邪氣傳變其脉促者為陽盛下後脉促為陽勝陰也故

不作結胃為欲解下後脉浮為上焦陽邪結而為結胃也經曰結胃者寸脉浮關脉沈下後脉緊則太陽之邪

傳於少陰經曰脉緊者屬少陰內經曰邪客於少陰之絡令人噎痛不可內食所以脉緊者必咽痛脉弦則太陽之邪傳於少陽經曰尺寸俱弦者少陽受病也其脉循脇絡於耳所以脉弦者必兩脇拘急下後邪氣傳裏則頭痛當止脉細數為邪未傳裏而傷氣也細為氣少數為在表故頭痛未止脉沈緊則太陽之邪傳於陽明為裏實也沈為在裏緊為裏實陽明裏實故必欲嘔脉滑則太陽之邪傳於陽胃以滑為陰氣有餘知邪氣入裏干於下焦也沈為血勝氣虛是為協熱利浮為氣勝血虛是知必下血經曰不宜下而便攻之諸變不可勝數此之病在陽應以汗解之反以冷水濕之若灌之其謂也

熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胃無熱證者

與三物小陷胃湯白散亦可服

病在陽為邪在表也法當汗出而解反以冷水

濕之灌洗熱被寒水外不得出則反攻其裏彌更益煩肉上粟起者水寒之氣客於皮膚也意欲飲水者裏有熱也反不渴者寒在表也與文蛤散以散表中水寒之氣若不差是水熱相搏欲傳於裏與五苓散發汗以和之始熱在表因水寒制之不得外泄內攻於裏結於胃膈心下鞭痛本以水寒伏熱為實故謂之寒實結胃無熱證者外無熱而熱悉收斂於裏也與小陷胃湯以下逐之白散下熱故亦可攻

文蛤散方

文蛤

五兩味鹹寒

鹹走腎則可以勝水氣

右壹味為散以沸湯和壹升溫服湯用五合

白散方

桔梗

參分味辛苦微溫

芭豆

壹分去皮心熬黑研如脂辛溫

貝母

三分味辛苦平

辛散而苦泄桔梗貝母之苦辛用以下氣芭豆之辛用以散實

右件參味為散內芭豆更於臼中杵之以白飲和服

強人半錢七羸者減之病在膈上必吐在膈下必利

不利進熱粥壹杯利過不止進冷粥壹杯身熱皮粟

不解欲引衣自覆者若水以濕之洗之益令熱却不

得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥

參兩如上法

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胃心下痞
鞭者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則

譏語脉弦五六日譏語不止當刺期門

太陽之脉絡頭下項頭項強痛

者太陽表病也少陽之脉循胃絡脇如結胃心下痞鞭者少陽裏病也太陽少陽相併為病不純在表故頭項不但強痛而或眩冒亦未全入裏故時如結胃心下痞鞭此邪在半表半裏之間也刺大椎第一間肺俞以寫太陽之邪刺肝俞以寫少陽之邪邪在表則可發汗邪在半表半裏則不可發汗發汗則亡津液損動胃氣少

陽之邪因干於胃土為木刑必發譫語脉弦至五六日傳經盡邪熱去而譫語當止若復不止為少陽邪熱甚也刺期門以寫肝膽之氣婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八

日熱除而脉遲身涼胃脇下滿如結胃狀譫語者此為

熱入血室也當刺期門隨其實而寫之

中風發熱惡寒表病也若經水

不來表邪傳裏則入府而不入血室也因經水適來血室空虛至七八日邪氣傳裏之時更不入府乘虛而入於血室熱除脉遲身涼者邪氣內陷而表證罷也胃脇下滿如結胃狀譫語者熱入血室而裏實期門者肝之募肝主血刺期門者寫血室之熱婦人中風七八日續審看何經氣實更隨其實而寫之

得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必