

醫聖元戎

新安 吳中珩 校

傷寒不可汗不可下不可吐諸證

大發春宜吐夏宜汗秋宜下凡用藥汗及吐下湯劑皆中病卽止

若少陽病脈微不可發汗亡陽故也宜附子湯 若陽已虛尺中弱瀉

者復不可下之宜小柴胡湯 若動氣在左在右在上在下並不可發

汗宜柴胡桂枝湯 若少陰病脈細沉數病在裏不可發汗宜當歸四

逆湯 若少陽病不可發汗宜小柴胡湯 若咽中閉塞咽喉乾燥亡

血衄家淋家瘡家不可發汗已上六證並宜小柴胡湯 若下利清谷

不可發汗宜理中湯四逆湯之類 若四逆厥及虛家皆不可吐厥者

宜當歸四逆湯

虛宜附子湯

有熱人宜黃耆人參建中湯

若少

陰膈上寒乾嘔不可吐宜小半夏加橘皮湯溫中丸

若咽中有動氣

不可下咽中閉塞不可下宜烏扇湯

若外實者不可下諸四逆厥者

不可下虛家亦然厥宜當歸四逆湯

虛者宜附子湯

有熱宜黃耆

人參建中湯

本虛攻其熱必噦宜小柴胡湯

若脈浮而緊法當身

疼痛宜以汗解假令尺中遲者不可發汗榮氣不足血少故也宜小柴

胡湯

若脈濡而緊濡則衛氣弱緊則榮中寒陽微衛中風發熱而惡

寒榮緊衛氣冷微嘔心內煩此不可汗宜小柴胡湯

若濡而弱不可

發汗宜小柴胡湯

若浮而大浮爲氣實大爲血虛小便當赤而難胞

中當虛今反小便利而大汗出法應衛家微可與小建中湯

若反更

實津液四射榮竭血盡乾煩而不得眠此不可下宜與小柴胡湯 若

脈浮大應發汗宜柴胡桂枝湯 若脈浮而緊者不可下而反下之爲

大逆宜桂枝麻黃各半湯 若脈數不可下宜柴胡桂枝湯 若下之

必煩利不止宜葛根黃芩黃連湯 若脈濇弱浮數不可下宜小柴胡

湯 若濡弱微濇微則陽氣不足中風汗出而反煩躁濇則無血厥而

且寒不可下宜桂枝甘草牡蠣龍骨湯 若結胸脈浮大不可下下之

卽死宜小陷胸湯 若陽病多者熱下之則硬宜小柴胡湯 若太陽

發汗不徹轉屬陽明微汗出不惡寒若太陽證不罷不可下下之爲

逆宜桂枝麻黃湯 若太陽病有外證未解不可下下之爲逆宜桂枝

麻黃湯 若病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之

因作痞 結胃則有陷胃湯九三四痞則有瀉心湯五 若太陽與陽

明合病喘而胃滿不可下宜麻黃杏子甘草石膏湯 若太陽與少陽

合病心下硬頸項強而眩者不可下宜小柴胡湯 若病欲吐者不可

下宜小半夏加橘皮湯 太陰腹痛吐食自利腹痛下之必胃下結硬

厥陰病渴氣上衝心中熱飢不欲食食則吐衄下之則利不止

若少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐腹痛能吐始得之手足寒脈

弦遲者此胃中寒實不可下也宜溫中湯生薑汁半夏湯 若無陽陰

強大便硬者下之必清谷腹滿宜用蜜煎導法 若傷寒五六日不結

胃腹濡脈虛復厥者不可下此亡血也宜當歸四逆湯下之則死宜四

逆加人參湯 若藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不

可攻也謂下也宜用小柴胡湯 若傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

宜小柴胡湯 若陽明病身面色赤攻之必發熱宜調胃承氣湯 若

色黃者小便不利也宜五苓散 若陽明病心下硬滿者不可攻之宜

生薑瀉心湯 半夏瀉心湯 攻之利不止者死宜四逆湯

不可汗下吐三法利害非輕前人多列經後大抵醫之失只在先藥藥之

錯則變生若汗下不差則永無亡陽生黃畜血結胃痞氣及下痢瀉泄

脇熱痢瘕急勞等證生矣其如此故錄大禁忌於前使醫者當疾之初

不犯也

大陽證

桂枝一十四方麻黃
五方在後保命集內

傷寒六經所感形證合用汗下吐和解等湯九仲景活人雲岐子保命集

載之詳者此不復重錄數書中所無者並諸方對證加減今載于後

金匱黃耆建中湯治虛勞裏急諸不足宜此方主之

黃耆 桂枝 生薑切各三兩 芍藥六兩 炙甘草二兩 膠飴一升

大棗十二個擘

右七味咬咀以水七升先煮六味取三升去滓內膠飴令消溫服一升
日三若嘔者加生薑 若腹滿者去棗加茯苓四兩 若肺虛損不足
痞氣加半夏五兩

易簡建中加減法

若婦人血疼男子心腹疝痛并四肢拘急疼痛甚者加遠志半兩 若或
吐或瀉狀如霍亂及胃涉濕寒賊風入腹拘急切痛加附子七錢半

若疝氣發作當於附子建中湯煎時加蜜一匙頭許 若男子婦人諸
虛不足小腹急痛脇肋臃脹 下虛滿胃中煩悸面色痿黃唇口乾燥
少力身重短氣模背強痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲食或因勞傷過
度或因病後不復加黃耆一兩半 若婦人一切血氣虛損及產後勞
傷虛羸不足腹中疝痛吸吸少氣小腹拘急痛引腰背時自汗出不思
飲食加當歸二兩名當歸建中湯產後半月每日三服令人精壯
大建中湯治內虛寒急少氣手足厥逆少腹變急或腹滿弦急不能食起
卽微汗出陰縮或腹中寒痛不堪勞苦唇口舌乾精自出或手足作寒
作熱而煩苦酸痛不能當立此補中益氣

桂心 三錢

芍藥 黃耆 各二錢

甘草 炙

當歸 人參 各一錢

生薑半兩

附子五分

半夏二錢半

棗二枚

右咬咀水五盞煎至三盞去滓分三服

易簡杏子湯治欬嗽不問外感風寒內傷生冷及勞咯血痰飲停積悉

皆治療

人參

半夏

茯苓

細辛

減半

乾薑

減半

甘草

炙

官桂

減半

芍藥

五味子

右咬咀每服四錢水一盞半杏仁去皮尖剉五枚薑五片煎至六分去

滓服

若感冒得之加麻黃等分

若脾胃素實者用枳殼去筋膜碎剉以醋

淹炒等分加之每服加烏梅一枚煎服其效尤驗嘔逆惡心者不可用

此若久年欬嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻黃添芍藥加麻黃之數乾薑五味子各增一半名小青龍湯

大補十全湯

參耆朮茯苓 芍地桂當川 三五錢秤用 生薑棗水煎
婦人虛弱用 名真號十全

治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨痛拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃腳膝無力喘欬中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之

肉桂 芍藥 甘草 黃耆 當歸 川芎 人參 白朮 茯苓

熟地黃

名等分

右爲麤末每服二大錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分不拘時候
溫服桂芍藥甘草小建中湯也黃耆與此三物卽黃耆建中湯也人參
茯苓白朮甘草四君子湯也川芎芍藥當歸四物湯也以其氣血俱衰
陰陽並弱天得地之成數故名曰十全散

易簡胃風湯治大人小兒風冷乘虛入客腸 胃水穀不化泄瀉注下及
腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度

人參 茯苓 川芎 官桂 當歸 芍藥 白朮

各等分

右以咀每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去滓稍熱服空心
小兒量力減之

若加熱地黃黃耆甘草等分足爲十味名十補湯 若虛勞嗽加五味

子 若有痰加半夏 若發熱加柴胡 若有汗加牡蠣 若虛寒加

附子 若寒甚加乾薑皆依本方等分 若骨蒸發熱飲食自若者用

十補湯加柴胡二兩服之 若氣短加人參 若小便不利加茯苓

若脈弦濇加川芎 若惡寒加官桂 若脈濇加當歸 若腹痛加白

芍藥 若胃熱濕盛加白朮 若血瘀色紫者陳血也加熟地黃 若

血鮮色紅者新血也加生地黃 若寒熱者加柴胡 若肌熱者加地

骨皮 若脈洪實痛甚者加酒浸大黃

潔古云防風爲上使 黃連爲中使 地榆爲下使

千里漿一名水葫蘆

木瓜 紫蘇葉

官桂

名半兩

烏梅肉

赤茯苓

名兩

右爲細末鍊蜜爲丸如彈子大噉化一九嚥津

又方

百藥煎 烏梅肉 紫蘇葉 人參 甘草 麥門冬

右各等分爲細末鍊蜜丸噉化

荔芰湯

烏梅肉

甘草

各二兩

百藥煎

一兩

百芷

半兩

白檀

三錢

右爲細末湯點

蜜酒

好蜜

二觔

水一碗

細麴

一觔半

好乾酵

三兩

右先熬蜜水去花沫令絕冷下麴醱每日三攪三日熟

陽明證

葛根湯三方并麻湯大小青龍等湯在後保命集內承氣湯三方亦在

易老門冬飲于治老弱虛人大渴

人參

枸杞

白茯苓

甘草

各三錢

五味子

麥門冬

去心各半兩

右爲麤末生薑水煎

麥門冬湯治勞復欲死人氣欲絕者用之有效

麥門冬

一兩

甘草

二兩炙

粳米

半合

右門冬去心爲細末水一盞煎粳米令熟去米約湯一小盞半入藥五

錢七棗二枚去核新竹葉十五片同煎至一大盞去滓大溫服不能服

者綿滴口中後人治小兒不能灌注者宜用此綿滴法此方不用石

膏以其三焦無大熱也兼自欲死之人陽氣將絕者故不用石膏若加

人參大妙

海藏五飲湯一留飲心下二澀飲脇下三痰飲胃中四溢飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾

旋覆花 人參 陳皮 枳實 白朮 茯苓 厚朴 半夏

澤瀉 猪苓 前胡 桂心 芍藥 甘草

右等分剉每兩分四服水二盞生薑十片同煎至七分取清溫飲無時忌食肉生冷滋味等物因酒有飲加葛根花縮砂仁

海藏已寒丸此丸不僭上陽生於下

治陰證服四逆輩胃中發燥而渴者或數日大便秘小便澀赤服此丸上不躁大小便自利

肉桂

茯苓各半兩

良薑

烏頭炮各七錢

附子炮

乾薑炮

芍藥

茴香

炒各一兩

右等分爲細末糊爲丸桐子大溫酒下空腹食前五七十九八九十九亦得酒醋爲糊俱可

婦人血風證因大脫血崩漏或前後血因而枯燥其熱不除循衣撮空摸牀閉目不省擲手揚視搖動不甯錯語失神脈弦浮而虛內燥熱之極也氣麓鼻乾而不潤上下通燥此爲難治宜

生地黃黃連湯主之

川芎

生地黃

當歸各七錢

赤芍藥

枳實

黃連

黃芩各三錢

防風

后爲釐末每服三錢水二盞煎至七分取清飲無時徐徐與之 若脈實者加大黃下之

大承氣湯氣藥也自外而之內者用之 生地黃黃連湯血藥也自內

而之外者用之氣血合病循衣撮空證同 自氣而之血血而復之氣

大承氣湯下之自血而之氣氣而復之血地黃連湯主之也

二者俱不大便

增損理中丸王朝奉云大小陷胃湯丸不愈者宜與之

人參 白朮

括蕓

牡蠣

各二兩

甘草

炒三兩

乾薑

炒一兩半

枳實

炮二十個

黃芩

去枯一兩

右爲細末鍊蜜爲丸如彈子大湯一盞煎服不歇復與之不過五六胃

中豁然矣用藥神速未嘗見也渴者加括蕓根 汗者加牡蠣