

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷一百二十



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

醫治準繩卷之四

外科

損傷門

跌打損傷

治腰

經山今人服者或月月服中痛不可忍

明 王肯堂 撰

傷從高墜下留在太陽

欽定四庫全書

醫治準繩

一

地龍 官桂 蘇木 各九分 麻黃 七分 黃蘗 當歸梢

甘草

各一錢半

桃仁

九箇

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

戴復菴云癰撲傷疼酒調琥珀散極佳再有烏藥順氣散用以治之風腰疼尤宜有癰撲人服藥并熏洗搽貼藥皆不効自若或教以用白芍藥赤芍藥威靈仙乳香沒藥等分為末和勻酒調服隨即痛減其半

腹痛或大便不通按之痛甚瘀血在內也用加味承氣

湯下之既下而痛不止按之仍痛瘀血未盡也用加味
四物湯補而行之若腹痛按之不痛血氣傷也用四物
湯加參芪白朮補而和之若下而胸脇反痛肝血傷也
用四君芎歸補之既下而發熱陰血傷也用四物參朮
補之既下而惡寒陽氣傷也用十全大補湯補之既下
而惡寒發熱氣血俱傷也用八珍湯補之既下而欲嘔
胃氣傷也用六君當歸補之既下而泄瀉脾腎傷也用
六君肉果破故紙補之若下後手足俱冷昏憤出汗陽

氣虛寒也急用參附湯吐瀉手足俱冷指甲青者脾腎
虛寒之甚也急用大劑參附湯口噤手撒遺尿痰盛唇
青體冷者虛極之壞證也急投大劑參附湯多有得生
者 有一患者杖後服四物紅花桃仁大黃等劑以逐
瘀血腹反痛更服一劑痛益甚按其腹不痛薛曰此血
虛也故喜按而不痛宜溫補之劑遂以歸身白朮參芪
炙草二劑痛即止 有一患者仲秋夜歸墜馬腹內作
痛飲酒數杯翌早大便自下瘀血即安此元氣充實挾

酒勢而行散也 一男子跌傷腹痛作渴食梨子二枚
益甚大便不通血欲逆上用當歸承氣湯加桃仁瘀血
下而瘥此因元氣不足瘀血得寒而凝聚也故產婦金
瘡者不宜食此 一男子孟秋墜梯腹停瘀血用大黃
等藥其血不下反加胸膈脹痛喘促短氣薛用肉桂木
香末各二錢熱酒調服即下黑血及前所服之藥而甦
此因寒藥凝滯而不行故用辛溫之劑散之 陳侍御
墜馬腿痛作嘔服下藥一劑胸腹脹痛按之即止惟倦

怠少氣診其脈微細而濇予曰非瘀血也乃痛傷氣血
復因藥損脾氣而然耳投養脾胃生氣血之藥而愈
加味承氣湯 治瘀血內停胸腹脹痛或大便不通等
證

大黃 朴硝 各二錢 枳實 厚朴 當歸 紅花 各一

錢 甘草 五分

用酒水各一鍾煎至一鍾服仍量虛實加減病急不用
甘草

垣定痛乳香神應散 治從高墜下疼痛不可忍腹中疼痛

乳香 沒藥 雄黑豆 桑白皮 獨科栗子

當歸 各一兩 破故紙 炒二兩 水蛭 半兩

右為末每服五錢醋一盞砂石器內煎至六分入麝香少許溫服

小腹引陰莖作痛有一患者瘀血失砭脹痛煩渴縱飲冷童便渴脹頓止以蘿蔔細搗塗之瘀血漸散已而患

處作癢仍塗之癢止後口乾作渴小腹引陰莖作痛小便如淋時出白津此肝經鬱火也遂以小柴胡湯加大黃黃連山梔飲之諸證悉退再用養血等藥而安夫小腹引陰莖作痛等證往往誤認為寒證投以熱劑則諸竅出血或二便不通以及危殆輕亦損其目矣

肌肉間作痛營衛之氣滯也用復元通氣散筋骨作痛肝腎之氣傷也用六味地黃丸內傷下血作痛脾胃之氣虛也用補中益氣湯外傷出血作痛脾肺之氣虛也

用八珍湯大凡下血不止脾胃之氣脫也吐瀉不食脾胃之氣敗也苟預為調補脾胃則無此患矣

創口痛苦痛至四五日不減或至一二日方痛欲作膿也用托裏散若以指按下復起膿已成也刺去其膿痛自止若頭痛時作時止氣血虛也痛而兼眩屬痰也當生肝血補脾氣 有一患者患處脹痛悲哀忿怒此厥陰之火為七情激之而然耳遂砭去瘀血以小柴胡湯加山梔黃連桔梗而安後用生肝血養脾氣之藥瘡潰

而斂 戴給事墜馬腿腫痛而難忍食少倦怠此元氣
虛弱不能運散瘀血而然耳遂用補中益氣去升麻柴
胡加木瓜茯苓芍藥白朮治之而痊 儒者王清之跌
腰作痛用定痛等藥不愈氣血日衰面目黧色薛曰腰
為腎之府雖曰閃傷實腎經虛弱所致遂用杜仲補骨
脂五味山茱萸蓉山藥空心服又以六君當歸白朮神
麴各二錢食遠服不月而瘥 一三歲兒閃腰作痛服
流氣等藥半載不愈薛曰此稟腎氣不足不治之證也

後果歿

瘀血作痛有一患者腫痛發熱作渴汗出薛曰此陰血受傷也先砭去惡穢以通壅塞後用四物柴胡黃芩山梔丹皮骨碎補以清肝火而愈 有一患者傷處揉散惟腫痛不消薛曰此瘀血在內宜急砭之不從薛以蘿蔔自然汁調山梔末傅之破處以當歸膏貼之更服活血之劑而瘥數年之後但遇天陰仍作痒痛始知不砭之失 有一患者臀腿黑腫而皮不破但脹痛重墜皆

以為內無瘀血惟傳涼藥可以止痛薛診其尺脈濇而結此因體肥肉厚瘀血蓄深刺去即愈否則內潰有爛筋傷骨之患薛入針四寸漂黑血數尺腫痛遂止是日發熱惡寒煩渴頭痛此氣血俱虛而然也以十全大補之劑遂瘥 一男子閃傷右腿壅腫作痛薛謂急砭去滯血以補元氣庶無後患不信乃外傳大黃等藥內服流氣飲後湧出穢膿數碗許其膿不止乃復請治視其腿細而脈大作渴發熱辭不治後果歿 憲友王汝道

環跳穴處閃傷瘀血腫痛發熱作渴遂砭去瘀血知其
下焦素有虛火用八珍加黃蘗知母牛膝骨碎補四劑
頓止用十全大補湯少加黃蘗知母麥門五味三十餘
劑而斂

血虛作痛一婦人磕臂出血骨痛熱渴煩悶頭暈日晡
益甚此陰虛內熱之證用八珍加丹皮麥門五味骨碎
補肉桂及地黃丸治之悉愈却去桂加牛膝續斷二十
餘劑而瘡愈

骨傷作痛一小兒足傷作痛肉色不變傷在骨也頻用
炒葱慰之五更用和血定痛丸日間用健脾胃生氣血之
劑數日後服地黃丸三月餘而瘥一小兒臂骨出臼
接入腫痛發熱服流氣等藥益甚飲食少思薛以葱熨
之其痛即止以六君子黃芪柴胡桔梗續斷骨碎補
治之飲食進而腫痛消又用補中益氣加麥門五味治
之氣血和而熱退愈矣

沒藥丸 治打撲內損筋骨疼痛

沒藥 乳香 川芎 川椒 去目及合口者 芍藥 當歸

各半 自然銅 二錢半火燒醋淬七次

右為細末用黃蠟二兩鎔開入藥末不住手攪勻丸如彈子大每服一九用好酒一鍾化開煎至五分乘熱服之隨痛處卧連服二三丸立効

濕痰作痛大宗伯沈立齋孟冬閃腰作痛胸間痰氣不利以枳殼青皮柴胡升麻木香茴香當歸川芎赤芍神麴紅花四劑而瘥但飲食不甘微有潮熱以參芪白朮