

欽定四庫全書

子部

三因極一病証方論卷十二



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

因極一病詳論各州
張肅叙

經有鼓張大素作發長治
張滿之端六胃與五腸
為三陽為三陰或臟氣

宋 陳言 撰

雖詳而不論其所因原

明為二太陰之表大抵

平勝尅相乘相感相應

傷肝肝尅脾脾氣不正

欽定四庫全書

三因極一病証方論

一

必脹於胃名曰勝尅或怒乘肺肺氣不傳必脹於大腸
名曰乘尅憂思聚結本臟氣鬱或實或虛推其感涉表
裏言之皆內所因或冒寒暑風濕隨其經絡傳致陽明
致脹滿者屬外所因飲食飢飽生冷甜膩聚結不散或
作痞塊膨脹滿悶屬不內外因當知脹滿該涉三因須
以人迎氣口分其內外脉息虛實審其溫利詳而調之
無失機要不爾則為心腹痼疾坐受困踣不可不謹

脹滿証治

論云五積久而必心腹脹滿且五積以五臟氣不平肝為肥氣心為伏梁肺為息賁脾為痞氣腎為奔豚皆聚結痞塊隨所生所成之日分推而究之皆喜怒憂思乘尅勝尅相應相感如斯等類從五積法治之可也但內所因不待成積即為脹滿亦當隨其臟氣而平治之所謂虛實補瀉太過不及依經調治

大半夏湯 治肝氣不平勝尅於脾脾鬱不行結聚涎沫閉於臟氣腑氣不舒胃則脹滿其脉弦遲故知中

虛胃冷脹滿服此可下氣進食

半夏

肉桂

錢各五

附子

人參

炙草

厚朴

薑汁

炒

當歸

茯苓

枳殼

各三錢
麩炒

川椒

八十粒炒出
汗去合口者

每服四錢薑五片棗三枚煎服

千金溫胃湯

治憂思聚結脾肺氣凝陽不能正大腸

與胃氣不平脹滿衝咳食不得下脉虛而緊瀉

附子

當歸

厚朴

生用

人參

橘皮

白芍

炙

草

各一兩

乾薑

川椒

三分炒去汗
并去合口者

每服四錢煎服

附子粳米湯 治憂怒相乘神志不守思慮兼并擾亂
臟氣不主傳導使諸陽不舒反順為逆中寒氣脹腸
鳴切痛胸脇逆滿嘔吐不食

附子 粳米 各三錢 半夏 炙草 各一錢 乾薑 一分 千金方無此

右剉散每服四錢棗三枚煎溫服

七物厚朴湯 治腹滿發熱以陽并陰則陽實而陰虛
陽盛生外熱陰虛生內熱脉必浮數浮則為虛數則
為熱陰虛不能宣導飲食如故致脹滿者為熱脹

厚朴一兩
汁拌炒

炙草

大黃各三
分

枳實

五錢
麩炒

肉桂

一分

右為剉散每服四錢薑七片棗三枚嘔者加半夏一分利者去大黃寒多加薑十片

麝香綿灰散

治腹虛脹滿朝緩暮急服諸藥不痊惡

風不能宣泄膨悶鼓脹

寒蠶綿

五錢
燒灰

麝香

五分

研細

令勻

每服

一錢

濃煎薄

荷湯下酒服尤佳不以時 一法有乾漆炒青烟出

量虛實用之虛者不可用

溫中湯 治虛人老人飲啖生冷多致腹脹心下痞滿
有妨飲食或刺痛泄利氣痞滯悶

厚朴 甘草 生薑 清州棗各等分

右上一味搗令得所方入生薑再杵令勻取出同棗
焙令浥浥微燥却入鍋內慢火炒至紫色再焙乾為
細末每服一錢生薑少許點湯空心服以知為度氣
味殊異兼能愈疾又易修合

料簡

上件諸方如內因與不內外因皆可選用若外因傷風
傷寒傳致陽明經腹脹可以大承氣杏子湯等各見本
門濕脹朮附湯加苓桂暑脹黃龍丸皆良藥也更有脚
氣肢滿脾氣橫泄及石水婦人腸覃血膨或單腹脹之
証治之各見本門學者當詳審而治無致混濫失其機
要也

霍亂叙論

霍亂之病為卒病之最者以人起居無時揮霍之間便

至變亂悶絕不救甚為可畏臨深履危不足以喻有生之流不可不達其旨趣蓋其病因涉於內外不內外三種具備而讀傷寒論者見有本是霍亂今是傷寒之說便謂霍亂是傷寒殊不知因傷寒致霍亂只是外因一証耳況風水濕皆有此証殊不知喜怒思憂飲食飢飽皆能致霍亂之証故不得不脩論

霍亂諸証

霍亂者心腹卒痛嘔吐下利增寒發熱頭痛眩暈先心

痛則先吐先腹痛則先下心腹俱痛吐利並作甚則轉筋入腹則斃惡証之速無越於此蓋陰陽反戾清濁相干陽氣暴升陰氣頓墜陰陽痞隔上下奔逸扶救不先治之唯宜溫煖更詳別三因隨內外以調之不爾則坐視困踣也

霍亂外因証治

諸惡風惡寒有汗無汗重着煩毒皆外所因蓋傷風則惡風有汗傷寒則惡寒無汗冒濕則重着傷暑則熱煩

此雖常論揮霍之間倉卒之際不辨遂致錯悞亂經反
常為害不淺豈止本為霍亂今是傷寒而已哉當隨外
所因治之乃可

理中湯 治吐下脹滿食不消心腹痛

人參 炮薑 白朮 甘草

炙各
三兩

右為剉散每服四錢水一盞煎七分去滓食前服如
作散每服方寸匕酒調下服亦可 若轉筋加石膏

三兩煨 若臍上築者腎氣動也去朮加肉桂四兩腎

惡燥故去朮恐作奔豚故加桂 吐多者去朮加生薑
三兩不多者復用朮 悸者加茯苓二兩 渴欲得
水加朮合前成四兩半 腹滿者去朮加附子服藥
後食頃食粥一杯微自溫覆勿令揭衣被 噦則加
丁香吐利止身體痛不利者審其原因以和解之如
初因傷風用桂枝之類所謂治有本也

外因料簡

凡外所因必自經絡傳入臟腑須以脉証推其所因隨

經調之則盡善矣假如太陰經傷寒當用四逆湯少陰
經當用附子麻黃細辛湯厥陰經當用理中湯若在大
陽經還用麻黃湯陽明經葛根湯少陽經柴胡湯風暑
濕亦然風則桂枝湯暑則香茹飲五苓散濕則苓朮湯
滲濕湯皆可於諸門隨証檢用不復繁引

霍亂內因証治

大喜傷心則氣散大怒傷肝則氣激憂傷肺則氣聚思
傷脾則氣結恐傷腎則氣却驚傷胆則氣亂臟氣概鬱

結聚涎飲痞隔不通遂致滿悶隨其勝復必作吐利當從內所因治之

七氣湯 治喜怒憂思悲恐驚驚氣鬱發致五臟互相刑尅陽氣反戾揮霍之間變亂不測吐利交作寒熱眩暈痞滿咽塞

半夏

五兩

厚朴

肉桂

各三兩

茯苓

白芍

各四兩

蘇葉

橘皮

各一兩

人參

一兩

加生薑煎服

胃氣丸

治憂思過度脾肺氣閉結聚涎飲留滯腸胃

氣鬱於陰凝陽於寒陰陽反戾吐痢交作四肢厥冷
頭目眩暈或復發熱兼治老人胃寒大便反秘妊娠
惡阻全不納食

硫黃 不拘多少以猪臟縛兩頭以米泔酒童便
各一碗煮乾取出剖臟取洗淨穢氣乾稱十兩

半夏五兩茯苓 人參各一兩石膏一分為末生薑汁蒸

餅糊為丸空心米湯入少許薑汁下五十丸

真珠散 治喜怒不常憂思兼并致臟氣鬱結留積涎

飲胸腹滿悶或腹疔痛增寒發熱吐痢交作

附子

一生一炮
去皮臍

半夏

一兩五錢

滑石

煉成鍾乳

各五錢

辰砂

三錢

為末每服二錢薑七片藿香三葉蜜半匙煎七分食

前冷服小便不利加木香茅根煎

不內外因証治

諸飽食膾炙恣飡乳酪水陸珍品脯醢雜肴快飲寒漿
耽縱情慾不以胃為五臟海困脾氣以運行胃既臍脹