



国外市售成药介绍



国外市售成药介绍〈 8 〉

北京市医药情报所 编译

北京市药材公司印刷所 印

1982年12月（本书共八册）

目 录

皮肤科用药(续前册)

- 8. 角质层分离剂1
- 9. 皮肤保护剂.....3—6
- 10. 抗组胺药.....7—10
- 11. 镇痛及消炎药11—18
- 12. 止痒剂及其他皮肤用药19—32

其他类药物

- 1. 局部及全身麻醉药.....33—48
 - 2. 诊断用药及测试制剂.....49—68
 - 3. 癌症化疗药剂.....69—96
 - 4. 解毒剂和免疫制剂97—135
 - 5. 静注溶液.....137—162
 - 6. 杂类药物.....163—199
 - 总索引.....201—250
 - 《国外市售成药介绍》工作人员名单.....251
-

CALMURID

【中文名】(干皮利)

【剂 型】乳膏

【生产厂】Pharmacia

【成 分】尿素 10%，乳酸 5%，甜菜硷 4.3%。

【适应症】皮肤干燥和皮肤角化过度症状，尤其是普通鳞癣和伴性性鳞癣；特应性湿症中用作辅助治疗。

【用 法】每日 2 次于患处涂一厚层。擦去前使保留 3—5 分钟便于药物透入。

【包 装】50g m (4.00)。

CLOCREAM

【中文名】(乐皮乳)

【剂 型】乳膏

【生产厂】Upjohn

【成 分】二甲基硅油 2.5%，维生素 A·D.

【适应症】干裂性皮肤，肥皂皮炎。

【用 法】少量轻按擦入皮肤。

【包 装】50gm (3.30)。

RIKOSPRA^Y-~~Y~~ALSAM

【中文名】(利皮脂)

【剂 型】喷雾剂

【生产厂】Riker

【成 分】安息香 9%，苏合香脂 2.5%。

【适应症】局部保护剂，可用安息香酐治疗的症状都适用。

【禁忌症】明显感染部位禁用。不能吸入。

【用 法】需要时喷用。

【包 装】150gm (6.50)。

RIKOSPRAY-SILICONE

【中文名】(利皮酮)

【剂 型】喷雾剂

【生产厂】Riker

【成 分】二羟尿囊素铝0.5%，氯化1-十六烷基吡啶(西白林) 0.02%，硅酮至100%。

【适应症】尿布疹，褥疮，皮肤刺激。

【用 法】需要时喷用。

【包 装】6两(11.70)。

R. V. PAQUE

【中文名】(防晒油)

【剂 型】软膏

【生产厂】Paul B. Elder

【成 分】红凡士林，氧化锌，对甲氧基肉桂酸 2-乙氧基乙酯。

【适应症】完全遮断阳光(防晒)。

【用 法】在需要完全遮断阳光的部位均匀地涂上一薄层，若认为不需进一步保护时，可用肥皂和水轻易地洗除。

【包 装】1/2两(6.00， 1¹/₄两(7.30)。

R V P

【中文名】(防晒膏)

【剂 型】软膏

【生产厂】Paul B. Elder

【成 分】红凡士林, 对羟基苯甲酸酯

【适应症】屏蔽阳光。

【用 法】局部涂用防晒伤。

【包 装】2 呖(5.90)。

SIOPEL

【中文名】(湿恶避)

【剂 型】乳膏

【生产厂】ICI

【成 分】二甲基硅油 10%, 溴化十四烷基三甲基铵(溴烷铵)0.3%。

【适应症】一种驱水的, 以硅酮和防腐剂作屏障的乳膏; 用于职业性皮肤病, 在失禁病情中防止由体液引起的表皮脱落, 以及防止褥疮。

【禁忌症】切勿在急性炎症性或渗湿性的皮肤上, 或在皮肤清除污染的刺激物之前使用该药。

【用 法】在整个部位敷用少量并擦入皮肤。若需继续保护, 则在头 3—4 天中每日敷用 3—5 次, 然后每日 1—2 次。

【包 装】50g m (1.80)。

SPECTRABAN

【中文名】(晒伤避)

【剂 型】液体

【生产厂】Stiefel

【成 分】对-N, N—二甲基氨基苯甲酸异戊酯
2.5%

【适应症】避免日光性角化病和晒伤。

【用 法】敷用于暴露在日照下的部位。延长暴晒时可重复使用。

【包 装】65 ml (3.80)。

ANTHISAN

【中文名】(安息散)

【剂 型】乳膏

【生产厂】May & Baker

【成 分】新安替根 2%

【适应症】局部使用的速效抗组胺剂。

【用 法】按说明使用。

【包 装】25g m (1.70), 450g m (15.30)。

BENADRYL

【中文名】苯海拉明

【剂 型】乳膏

【生产厂】Parke Davis

【成 分】苯海拉明 2 %

【适应症】过敏性湿疹，特应性皮炎，荨麻疹。

【用 法】按说明使用。

【包 装】25g m (1.40)。

CALADRYL

【中文名】(克痒力)

【剂 型】乳膏, 洗剂

【生产厂】Parke Davis

【成 分】炉甘石, 苯海拉明 1%, 樟脑和酒精 2%。

【适应症】缓解由日晒、痱子、荨麻疹、虫咬、轻度毒葛刺激以及其它局部刺激引起的搔痒。

【用 法】只作外用。每日局部敷用 3—4 次。

【包 装】乳膏: 1.5 两(2.40)。

洗剂: 6 两(2.50), 125 ml (2.30)。

CALCISTIN

【中文名】(克疹定)

【剂 型】软膏

【生产厂】Boehringer Mannheim

【成 分】葡糖酸钙 3.37 %, N-苯基-N-2-吡咯 烷基-1'-乙基苄胺盐酸盐(吡咯二胺)2%。

【适应症】渗湿性过敏性湿疹和晒伤。

【禁忌症】有大面积皮肤疾病的婴儿和幼儿慎用。

【用 法】需要时敷用。

【包 装】25g m。

PARADRYL

【中文名】(痒疹敌)

【剂 型】软膏

【生产厂】Ferrosan

【成 分】溴化 β -一二苯基甲氧基乙基三甲铵 2g m/
100g m

【适应症】贝斯尼埃氏痒疹，神经性皮炎，湿疹，荨麻疹，虫咬。

【用 法】遵医嘱。

【包 装】20g m。

PHENERGAN

【中文名】非那根乳膏

【剂 型】乳膏

【生产厂】May & Baker

【成 分】异丙嗪 2%，1,3-双(4-脒基-2-溴苯氧基)丙烷(双溴丙脒)0.15%。

【适应症】过敏性疾病。

【用 法】于患处敷一薄层，用2—3天。

【包 装】25g m (1.90)。

SYSTRAL

【中文名】氯甲苯醇胺乳膏

【剂 型】乳膏

【生产厂】Astra-Werke

【成 分】氯甲苯醇胺 1.5%

【适应症】过敏性搔痒性皮肤病(荨麻疹, 湿疹)。一级烧伤, 晒伤, 虫咬, 冻疮。

【用 法】需要时敷用。

【包 装】20g m, 400g m。

ALGIPAN

【中文名】(抑痛平)

【剂 型】香脂

【生产厂】Wyeth

【成 分】烟酸甲酯 1%，水杨酸乙二酯 5%，组胺二盐酸盐 0.1%，辣椒素 0.1%。

【适应症】纤维织炎，肌肉痛，腰痛，神经炎，神经痛，坐骨神经痛。

【用 法】足量敷于患处，轻轻按摩直至全部透入。

【包 装】40g m (0.90)。

ANALGESIC

【中文名】(止痛香脂)

【剂 型】香脂

【生产厂】Parke Davis

【成 分】水杨酸甲酯，薄荷醇，玉树油，桉油精。

【适应症】疼痛症状，特别是神经痛或风湿痛。

【用 法】需要时只在未破碎的皮肤上用。

【包 装】1两(2.30)。

BUTADILAT

【中文名】(平炎痛)

【剂 型】乳膏

【生产厂】Medinova

【成 分】保泰松 5%，烟酸苄酯 1.25%。

【适应症】风湿性肌炎和其它肌病，劳损，挫伤，脱位，神经痛，类风湿性关节炎，腰痛，斜颈，外周循环障碍，腱鞘炎。

【用 法】按摩入有病部位。

【注 意】避免接触粘膜。

【包 装】30g m (1.90)

CAPSOLIN

【中文名】(克痛灵)

【剂 型】软膏

【生产厂】Parke Davis

【成 分】辣椒油树脂，樟脑，松节油，玉树油。

【适应症】缓解与神经痛、神经炎、关节痛、风湿病、腰痛、坐骨神经痛、扭伤等并发的痛感，或用于其它需用抗刺激剂的症状。

【禁忌症】应避免与粘膜或炎症皮肤接触。

【用 法】只用于未破损的皮肤。轻轻按擦。

【包 装】1/4 两 (2.30)。

COUNTERPAIN

【中文名】(敌痛膏)

【剂 型】乳膏

【生产厂】Squibb

【成 分】水杨酸甲酯，丁香油酚，薄荷醇。

【适应症】肌痛和关节痛。

【禁忌症】若关节痛依然存在十天以上或出现皮肤红肿则即停药。破损或受刺激的皮肤上切勿使用。应避免触及眼睛或粘膜。

【用 法】用量随意。彻底按擦。日用1—3次。

【包 装】1 啊(1.70)。

DROXARYL

【中文名】(炎息力)

【剂 型】乳膏

【生产厂】Continental Pharma

【成 分】2-对丁氧苯基乙酰氧肟酸(丁苯乙肟)

【适应症】外阴炎，乳腺病，浅表静脉炎和静脉周炎，痔，肛门搔痒，睑炎，眼睑湿疹。

【禁忌症】对本药过敏者禁用。

【用 法】每日敷用2—3次。

【包 装】20g m(3.00)。

ECHO

【中文名】(抑痛)

【剂 型】喷雾剂

【生产厂】Dainippon

【成 分】水杨酸甲酯 1.5g m, 薄荷醇 1.2g m, 樟脑 1.95g m, 麝香草酚 0.15g m, 苯海拉明 0.09g m。

【适应症】肩强直, 肌痛, 后背痛, 神经痛, 风湿病, 扭伤, 关节炎。

【用 法】每日喷用数次。

【包 装】50 ml。

EGODERM

【中文名】(炎可敌)

【剂 型】软膏

【生产厂】Ego

【成 分】鱼石脂 1 %, 二甲基硅油 1.6 %, 氧化锌 15 %, 以橄榄油—凡士林为基质。

【适应症】皮炎和湿疹时的亚急性炎症和搔痒, 外阴搔痒, 肛门搔痒, 单纯性疱疹。

【用 法】每日敷用 2—4 次。每日用“Pinetarsol”清洗以减轻炎症。

【包 装】30g m (2.70), 75g m (5.10), 500g m (21.00)。