

欽定四庫全書

子部

蘭臺軌範卷八



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院院使_臣張肇基

洗馬_臣王坦修覆勘

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

素貼

欽定四庫全書

吳江徐大椿撰

其言於世者大矣
死腹中論帝曰何以

身重毒之何如岐伯曰
其故岐伯曰大積大聚

欽定四庫全書

蘭臺軌範

一

知懷子之且生也岐伯曰身有病而無邪脈也 奇病
論黃帝問曰人有重身九月而瘖此何為也岐伯曰胞
之絡脈絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少
陰之脈貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰
無治也當十月復 平人氣象論婦人手少陰脈動甚
者妊子也

難經

妊之為病其內苦結女子為瘕聚 左者為腎右者為

命門命門者諸精神之所舍原氣之所繫也男子以藏精女子以繫胞

金匱

問曰新產婦人有三病一者病瘕二者病鬱冒三者大便難何謂也曰新產血虛多汗出喜中風故令病瘕亡血復汗寒多故多鬱冒亡津液胃燥故大便難產婦鬱冒其脈微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥

孤陽上出故頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽
氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食小柴胡
湯主之雖當汗出
不宜太過師曰產婦腹痛法當以枳實芍藥散
假令不愈者此為腹中有瘀血著臍下宜下瘀血湯主
之亦主經水不利

產後七八日無太陽証少腹堅痛此惡露不盡不大便
煩燥發熱切脈微實再倍發熱日晡時煩燥者不食食
則譫語至夜即愈宜大承氣湯主之熱在裏結在膀胱

也

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼
狀者此為熱入血室治之無犯胃氣及上二焦必自愈
婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲身

涼和胸脇滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺

期門隨其實而取之

期門二穴在乳頭直下四寸第
二肋端此等刺法最易學也

婦人之病因虛積冷結氣為諸經水斷絕至有歷年血
寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎唾久成肺癰

形體損分在中盤結繞臍寒疝或兩脇疼痛與臟相連
或結熱中痛在關元脈數無瘡肌若魚鱗時著男子非
止女身在下未多經候不勻令陰掣痛少腹惡寒或引
腰脊下根氣衝氣衝急痛膝脛疼煩奄忽眩冒狀如厥
顛或有憂慘悲傷多嗔此皆帶下非有鬼神久則羸瘦
脈虛多寒三十六病千變萬端審脈陰陽虛實緊弦行
其針藥治危得安其雖同病脈各異源子當辨記勿謂
不然

問曰婦人年五十所病下痢數十日不止暮即發熱小腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其証唇口乾燥故知之當以溫經湯主之

婦人陷經漏下黑不解膠薑湯主之

方無考校本云宜是膠艾湯

婦人懷娠六七月脈弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者少

腹如扇

形容惡寒之盛

所以然者子臟閉故也當附子湯溫之

方無考

婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰以下重如有水氣
狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺瀉勞宮關
元小便微利則愈

病源

妊娠數墮胎候 血氣虛損子臟為風冷所居則血氣
不足故不能養胎所以致胎數墮候妊娠而恒腰痛者

喜墮胎也

按墮胎皆
由於血熱

兩胎一死一生候 陽施陰化精盛有餘者則成兩胎

其兩胎而一死者候其胎上冷是胎已死也

妊娠過年不產 由挾寒冷宿血在胞而有胎則冷血相搏令胎不長產不以時若其胎在胞日月雖多其胎翳小轉動勞羸是挾於病必過時乃產

胞轉 臍下急痛小便不通是也其病由不同胞轉及胞落並致死

帶下三十六疾 諸方說三十六疾者是十二癥九痛七害五傷三固是也十二癥者是所下之物一如膏二

如青血三如紫汁四如赤皮五如膿痂六如豆汁七如
癸根羹八如凝血九如青血血似水十如米汁十一如
月浣十二經度不應期也九痛者一陰中傷痛二陰中
淋痛三小便即痛四寒冷痛五月水來腹痛六氣滿並
痛七汁出陰中如虫嚙痛八脇下皮痛九腰痛七害者
一害食二害氣三害冷四害勞五害房六害妊七害睡
五傷者一窮孔痛二中寒熱痛三小腹急牢痛四臟不
仁五子門不正引腎痛三固者一月水閉塞不通其餘

二固文缺不載

與鬼交 臟腑虛神守弱鬼氣得病之也其狀不欲見人獨言笑悲泣脈來遲伏或如鳥啄

惡阻 心中潰悶頭眩四肢煩疼懈惰不欲執作惡聞食氣欲噉食鹹酸果食多睡少起乃至三四月以上大劇者不能自勝舉也此由婦人元本虛羸血氣不足腎氣又弱兼當風食冷太過心下有痰氣挾之而有妊也子滿 此由脾胃虛弱有停水而挾以妊娠也水漬於

胞則令胎壞惟將產之月而脚微腫則其產易蓋胞藏水血多也初妊娠者則反壞胎

胎漏 此由衝任脈虛不能約制太陽少陰之經血也亦名胞阻漏血盡則人斃也

鬼胎 正虛則妖魅精入臟狀如懷娠

胎疸 其母臟氣熱熏蒸於胎

血分 是經血先斷而後成水病以其月水壅塞不通經血分而為水故曰血分

胞絡傷損 子臟虛冷氣下衝則陰挺出謂之下脫亦有因產用力偃氣而陰脫者

陰臭 由子臟有寒寒搏於津液蘊積氣衝於陰故變

臭也

此亦由內熱所致

子臟開 由子臟宿虛因產冷氣乘之血氣得冷不得相容故令開也

婦人方

桂枝茯苓圓

金匱

治婦人宿有癥病經斷未及三月而

得漏下不止胎動在臍上者為癥瘕害妊娠六月動者前三月經水利時胎也下血者後斷三月衄也所以血不止者其癥不去故也當下其癥此主之

桂枝

丹皮

茯苓

桃仁

去皮尖熬

芍藥

各等分

右五味末之煉蜜丸如兔屎大每日食前服一丸不知加至三九

當歸芍藥散

金匱

治婦人懷妊腹中疔痛

當歸

三兩

芍藥

一斤

茯苓

四兩

白朮

四兩

澤瀉

半斤

芎藭 三兩 杵為散取方寸匕酒和日三服

乾薑人參半夏丸 金匱 治妊娠嘔吐不止

乾薑 人參 各一兩 半夏 二兩

右三味末之生薑汁糊丸如梧子大飲服十丸日三

葵子茯苓散 金匱 治妊娠有水氣身重小便不利洒淅

惡寒起即頭眩

葵子 一斤 茯苓 三兩

右二味杵為散飲服方寸匕日三服小便利則愈