

性病自療大全

性病自療大全目次

男子部

遺精	一
有夢遺精之自療法	三
滑精之自療法	四
無夢遺精之自療法	六
手淫遺精之自療法	八
縱慾遺精之自療法	九
早婚遺精之自療法	一一
未婚遺精之自療法	一二
見色流精之自療法	一二
心病遺精之自療法	一三
肝病遺精之自療法	一五

肺病遺精之自療法	一五
脾病遺精之自療法	一六
腎病遺精之自療法	一七
勞心遺精之自療法	一八
勞力遺精之自療法	一九
少年遺精之自療法	二〇
老年遺精之自療法	二〇
鬼交遺精之自療法	二一
病後遺精之自療法	二一
戒鴉片癮後遺精之自療法	二二
梅毒	二二
梅毒經過之狀況	二三
梅毒之自療法	二五

(一) 西藥內服方	三〇
(二) 西藥外用方	三一
(三) 注射六〇六	三二
結毒之自療法	三二
下疳之自療法	三六
西藥消毒收口方	三八
西藥洗淨方	三八
橫痃之自療法	三九
西藥外治方	四一
西藥冷罨方	四二
西藥消毒方	四二
西藥洗淨方	四二
妬精瘡	四二
淋病	四三
氣淋之自療法	四四
血淋之自療法	四五

膏淋之自療法	四七
砂石淋之自療法	四八
勞淋之自療法	四八
寒淋之自療法	五〇
熱淋之自療法	五一
脾虛而淋之自療法	五二
腎虛而淋之自療法	五三
花柳毒淋之自療法	五四
淋病之經過	五五
淋病治療法	五六
淋病內服藥	五六
淋病外用藥	五七
濁症	五八
白濁之自療法	五八
白濁內服藥方	六〇
赤濁之自療法	六一

慢性白濁之自療法	六二
急性白濁之自療法	六四
新白濁之自療法	六五
老白濁之自療法	六六
精滑白濁之治療法	六七
精癆白濁之自療法	六八
氣虛白濁之自療法	六八
腎虛白濁之自療法	六八
生殖器	六九
1. 生殖器不發育之自療法	七〇
2. 生殖器萎而不舉之自療法	七〇
3. 生殖器易舉挺脹之自療法	七一
早泄之自療法	七二
性交脫陽之自療法	七四
囊癰之自療法	七五
陰虱之自療法	七七

陰囊腫大之自療法	七七
女子部	七八
月經病自療須知	七八
調經	八一
熱甚經行失期之自療法	八三
虛熱經行先期之自療法	八四
鬱悶經行先期之治療法	八五
忿怒經行先期之自療法	八六
氣弱經行先期之自療法	八七
血弱經行後期之自療法	八七
寒凝經行後期之自療法	八九
血熱經行後期之自療法	九〇
痰阻經行後期之自療法	九〇
經行錯亂之自療法	九一
經行後復行之自療法	九二

經數月一行之自療法	九三
血熱經水過多之自療法	九四
氣虛經水過多之自療法	九五
虛寒經水過少之自療法	九六
瘀熱經水過少之自療法	九七
經色淡白之自療法	九七
經色黃之自療法	九八
經色紫黑之自療法	九八
經前腹痛之自療法	九九
經行腹痛之自療法	一〇一
經後腹痛之自療法	一〇一
月經忽來忽斷時疼時止之自療法	一〇二
經前吐衄之自療法	一〇三
經前大便下血之自療法	一〇五
經前洩水之自療法	一〇五

經行嘔吐之自療法	一〇五
經行泄瀉之自療法	一〇六
經行發熱之自療法	一〇六
經行譫狂之自療法	一〇七
年老經水復行之自療法	一〇八
年未老經斷之自療法	一〇九
經閉	一一〇
室女經閉之自療法	一一一
血枯經閉之自療法	一一三
血瘀經閉之自療法	一一五
癥瘕經閉之自療法	一一八
痰阻經閉之自療法	一二一
驚恐經閉不行之自療法	一二三
行房經閉之自療法	一二四
腫脹經閉之自療法	一二五
肝傷經閉之自療法	一二六

脾虛經閉之自療法	一二八
癆瘵經閉之自療法	一二九
崩漏	一三二
虛脫崩漏之自療法	一三四
虛熱崩漏之自療法	一三七
虛寒崩漏之自療法	一三九
氣陷崩漏之自療法	一四〇
血瘀崩漏之自療法	一四二
昏暈血崩之治療法	一四四
鬱結血崩之自療法	一四五
跌傷血崩之自療法	一四七
性交時血崩之自療法	一四八
性交後血崩之自療法	一四九
小產血崩之自療法	一五一
老婦血崩之自療法	一五二
崩漏日久之自療法	一五三

帶下	一五五
生理的白帶	一五六
病理的白帶	一五七
白帶預防法	一五八
白帶之自療法	一五八
赤帶之自療法	一六〇
黃帶之自療法	一六一
青帶之自療法	一六二
黑帶之自療法	一六三
溼熱帶下之自療法	一六三
痰積帶下之自療法	一六六
虛損帶下之自療法	一六七
虛寒帶下之自療法	一七〇
滑脫帶下之自療法	一七二
風邪帶下之自療法	一七四
乳房	一七五

虛弱乳汁少之自療法	一七六	(一) 陰門	一九五
壅滯乳汁不行之自療法	一七八	(二) 尿道	一九六
乳汁自出之自療法	一八〇	(三) 陰道	一九六
吹乳之自療法	一八二	(四) 子宮	一九六
乳癰之自療法	一八四	(五) 治療	一九六
妬乳之自療法	一八八	陰戶	一九七
乳巖之自療法	一九〇	陰腫之自療法	一九九
乳懸之自療法	一九二	陰癢之自療法	二〇一
女子梅毒	一九二	陰蝕之自療法	二〇三
女子淋病	一九三	陰挺之自療法	二〇五
(一) 子宮內膜炎	一九四	陰冷之自療法	二〇八
(二) 卵巢炎	一九四	陰吹之自療法	二〇九
女子白濁	一九四	子腸不收之自療法	二一〇

性病自療大全

四明胡安邦著述

男子部

遺精

男子於青春發動期。睪丸中之細胞。分泌精液。此精液通過輸精管。而集於精囊。於射精時而排泄。射精云者。即謂精液以一定之速力。由尿道而迸出也。陰莖勃起已極。則生一種之快感。感覺若覺至於極度。則興奮射精中樞。射精神經傳之。而使精囊收縮。排出精液。至於尿道。同時尿道綿體及球海綿體筋。一齊收縮。精液即因之射出。睡中射精。由於身心虛弱。或別種刺激。使陰莖勃起。奮與射精中樞所至。此種現狀。即通常所謂遺精者是也。俗謂性慾久曠之人。或青年之康健者。遺時僅一二點。乃精滿而遺。生理之自然現象。不

足爲害。此言亦有不完全處。謂此種現象。即生理之遺精則可。若謂生理之遺精。即此現象。則不可以生理之遺精。不僅限於精之多少而已也。夫遺精之生理與病理之辨別。在遺精後倦怠與否。或有快感與不快感之別。如勞力過度。偶一遺泄。於身體毫無影響。不足爲病。如懷念愛人。求之於寤寐。則生理上遂生反應。遺精時滿足而有快感。此遺精之正規。亦不爲病。又因忍尿過多。膀胱充滿。發生遺精。醒後便溺。即能恢復原狀。雖無快感。不快之感。亦屬於生理之遺精。反之因後尿道。膀胱直腸等。與生殖器接近之部分。發生疾患。或因神經系統障礙之刺激而起。遺精則不但有快感。且多痛苦。此即病理之遺精也。惟遺精一證。以余經驗之所得。與方書所載。大有不同。論其原因。所

謂淫熱下流。及久服冷利等劑而致者。尙未多見。考其由來。多由手淫而起。少年發育未全。旦旦而伐。精道滑利。成爲習慣。偶有所感。精遂以遺。前賢所謂因於勞倦。勞心。以及中氣不足等說。並非真正原因。乃發動之機會而已。如夏日霍亂。人身雖有霍亂菌。體力強者。可以抵抗而消滅之。如偶有外感。或內傷飲食。微菌得大肆機會矣。或謂霍亂爲寒傷。食傷。或房室傷者。皆未道着真因。言其然而忘其所以然也。蓋食色天性。人所共然。自歐風東漸。物質文明。風俗奢靡。燈紅酒綠之地。歌聲舞影之場。足以惑人心。而奪人之志。加諸穢褻文字。及裸體畫片。到處發售。青年爲其所惑。慾念愈熾。縱淫無度。一發不可收拾。其無女伴者。慕少艾不得。則沉溺於手淫。舉動雖異。所以斷喪其精神。則一久而不已。遺精之證以起。上海風俗奢華。人心浮蕩。故患者尤多也。(節尤著關於遺精之種種)

凡患遺精者。每影響及神經。蓋神經一物。愈衰弱則愈興奮。性慾反見旺盛。譬諸早泄。原爲性神經衰弱之徵象。然有早泄之傾向者。性慾易於發動。往往見美色而起淫心。好作幻想。夢遺頻頻。以致精不內守。腎失其封藏之職。發生種種性病。神經因之愈衰弱矣。神經愈衰弱。則愈興奮。感情緊張。輾轉反覆。難以入寐。於是妄想幻境。心猿意馬。而又遺精矣。如此互相因果。而身心兩虧矣。張景岳以遺精之病。無由不本於心。(心指思想。實則思想乃腦神經方面事。安邦誌)心有所動。腎必應之。內經所謂厥氣客於陰器。卽夢接內是也。故凡以少年之人。多慾或心有妄思。或有妄遇。厥氣客之。而精隨以泄。初泄者。不以爲意。至再至三。浸而不已。精道滑利。有感則遺。欲遏不能止。蓋精雖藏於腎。主宰者實爲心。精之蓄泄。皆聽命於心。凡少年初省人事。精道未實者。欲保全其身。首先惜精。

欲惜其精先淨其心。（謂毋忘思亂想也。安邦附誌）聰明伶俐之人。其心好動。故多有此病。而田野愚魯之夫。心靈較呆。故少患此病。少年未病之先。首宜養心節慾。及其既病而求治。則尤當以持心爲先。然後隨證調理。使不知持心以求其本。徒恃藥石而揣其末。則亦何益之有哉。觀此遺精與神經衰弱關係之密切。有如是哉。

有夢遺精之自療法

「症狀」入夜睡時。夢幻顛倒。恍與婦女交媾。而致遺精。其遺精之時。大都在午夜睡後之後半夜。及天將微明時爲多。蓋天明之時。男子之陰莖大都挺舉。俗稱五更轉陽。如其人慾念旺者。則此時生殖器挺舉之際。適遭被褥之壓力。及刺擦之感動。在亂夢顛倒中。一若與女子交媾。遂精洩。莫能自禁也。雖強自掙扎而醒。切不可用

力。或用手強止之。以其精既離關。止之不出。則有轉爲敗精。而有成淋症之可能性也。

「原因」發生夢遺之原因。一由於體質虧弱。慾火旺盛。或因勞心。或因勞力。以致神經衰弱而起。二由於觀閱淫書淫畫。涉足平康舞場。受外界之誘引。日有所思。夜有所夢。胡思亂想。雲山巫雨。描摹幻境。神經興奮。而精遺矣。本病之患者。以發育後之青年爲最多。患者遺精既久。不知自療。漸成習慣。此後略受性慾衝動。便即遺精。若不早治。病症遂深。甚至不受性慾衝動。精亦流出。而成滑精之症。傷害身體。頗爲嚴重也。

「療法」第一注重攝身預防。次爲藥物之醫治。故患此者。不必求治醫生。自行治療可也。

大補陰丸 黃柏知母熱地龜板四藥配製而成。國藥鋪有現成出賣。每晨吞服三錢。淡鹽湯送下。

知柏地黃丸 黃柏。知母。熟地。山萸肉。山藥。澤瀉。丹皮。雲苓。八味配合而成。每晨晚吞服三錢。頗見神效。

龍胆瀉肝湯 龍胆。草四分。柴胡八分。山梔三錢。黃芩二錢。生地四錢。車前子三錢。木通八分。甘草八分。當歸三錢。澤瀉三錢。

清心蓮子飲 蓮子人參各三錢半。黃芪茯苓甘草各一錢。麥門冬。地骨皮。黃芩。車前子各錢半。燈心五根。薑三片。

加味歸脾湯 白朮。茯神。黃芪。龍眼肉。酸棗仁肉各一錢。人參。木香。各五分。甘草三分。加生薑大棗煎湯。再加山梔二錢半。柴胡八分。尤佳。

坎離既濟湯 生地一兩。黃柏五錢。知母鹽炒五錢。

封髓丹 黃柏一兩。砂仁七錢。甘草三錢。

內翰良方茯苓散 擇茯苓之堅白者。研末吞

服。按茯苓甘淡溫平。甘能助陽。淡能利竅。溫平能益脾逐水。兼能通心氣於腎。使熱從小便而出。小便結者能通。多者能止。遺精家以通便爲要法。蓋大小便之蓄積。皆能使精關受其刺激。以致夢遺。

附西法 注射「白利多命」及「愛斯法」等強壯藥。亦甚簡效。至於遺精之特效藥。尙付缺如也。

滑精之自療法

「症狀」滑精症較夢遺爲重。初起必由漸而成重症。或爲無夢而遺。或爲有夢而洩。初時僅在夜臥之時。生殖器舉起時。稍受細微刺激而遺精。但病若深進。略覺恍惚。亦致精液流出。或有遺時無夢。並無感覺。及至醒後。但見斑點遺痕。始知已遺。至於滑精次數。並無一定。甚者每晚一

次。或一次以上者。滑精時。生殖器物起稍強。滑後精神萎頓。身體疲勞。病至最重時。雖在日中。並不受任何刺激。精亦能滑出。而不能自禁。因之營養受其障礙。體力大衰。於是頭暈目眩。耳鳴心悸。腿軟肌瘦。怕冷乏力。精神萎頓等症。隨之蠶起。而成癆瘵。病至此。生命頗危也。

「原因」考其成病之初。原因多端。有因操勞思想過度者。有因縱慾濫淫過度者。有因初起夢遺。不自攝養。不知治療。遺精既久。遂成習慣。體質衰弱。以是無固攝精關之力。而成滑精者。而尤以犯手淫者爲最。蓋手淫爲不正當之發洩性慾行爲。其影響之所及。每致一生於疾病中過生活。甚致全身衰弱而死。其成滑精者。僅其一端耳。有爲之青年乎。毋手淫而自殺。以剝削一己之幸福也可。

「療法」固本攝精丸 南沙參二兩。大熟地二兩。

豬桂三錢。金櫻子一兩五錢。薏米仁二兩。硃茯神三兩。山萸肉三兩。生黃芪一兩五錢。杭白芍一兩五錢。黨參一兩五錢。菟絲子一兩五錢。生棗仁三兩。川連三錢。上藥粉末爲丸。晨夕吞服三錢。

玉鎖丹 文蛤八兩。白茯苓二兩。白龍骨一兩。上三味爲細末。米糊丸如梧子大。每服七十九。空心後鹽湯下。臨睡更進一服。極效。加蓮鬚或肉二兩。芡實二兩。兔絲子四兩。杜蠟一兩。山藥糊丸尤妙。

固真散 白龍骨一兩。韭子一合。右爲末。每服二錢七分。空心用酒調服。此二藥大能滋精。固真氣。緩下元。一方有白茯苓。兔絲子。醋和丸如桐子大。每服五十九。溫酒鹽湯下。名玉露丹。一方加天雄。鹿茸。牡蠣。酒糊丸。梧子大。每服五十九。酒下。日再服。名內固丸。

固精丸 牡蠣五錢。兔絲子三錢。韭子錢半。龍骨三錢。五味子七粒。桑螵蛸三錢。白石脂三錢。茯苓四錢。

金鎖玉關丸 芡實。蓮子。蓮鬚。藕節。茯苓。茯神。山藥等分爲末。另研山藥末六兩酒煮糊丸。米飲下。

附西法 內服「賜保命」藥片。與注射藥針「愛斯法」。「奧潑泰純」及「補爾神」等藥針均有效力。又因滑精過多。而引起攝護腺漏者。當注意運動。勤沐浴。至須注射「普施通」。每日注射一針。或間日一針。連注數盒。以強其身。又患遺精頻數者。並須內服鎮靜中樞神經之藥。以安其神。內服用鈉溴六，〇克。鉀溴六，〇克。研末混和。分爲十二包。爲四日之量。每日分三次服之。或因溴素樟腦。每次服〇，三克。其效相同。兼用電療。更易奏功。而尤須注

意攝身。避身心過勞。戒烟酒。去濃厚之刺激性食物。行適當之運動。勿於睡前飽食。禁絕手淫及夫婦間性交。禁絕觀淫書畫。聽猥褻語。臥時宜側眠。被褥勿過暖。多讀聖賢傳記。及修養書類。以除邪念。能如是留意。兼服藥物治療。則還我自由。恢復康健。固意中事也。

無夢遺精之自療法

「症狀」睡時遺精不覺。醒時祇見斑點遺痕。可謂之無夢遺精。實則有夢者未必遺。皆有夢。無夢者亦未必全不夢。遺。有此次無夢。而下次有夢遺者。亦有此次夢遺。而下次無夢遺者矣。故有夢與無夢。乃偶然之事。未可據爲定論也。尤學周在「糾正世俗無夢遺精觀念」一文中。謂遺精皆有夢。夢而不覺耳。緣精之遺泄必有所感。感則必夢。所以不覺者。射精以後不卽蘇醒。

以疲乏之故。重入睡鄉。祇見其所遺。而不復知有夢矣。蓋夢境易忘。醒後每不能記憶也。

「原因」無夢遺精者。不論其曾否有夢。而其遺後精神之疲勞。體力之萎軟。有斷然哉。故其病因當責之腎虧不固攝也。而其所以腎虧以致遺泄者。其原因不外色慾過度。發育時曾犯手淫。以致戕喪腎藏而起此症。或因勞動過度。操思過甚。以致心腎交虧。睡時怠倦殊甚。腎不能約束精關。則精自遺也。

「療法」桑螵蛸散 人參（黨參三錢代之亦可）

一錢。茯神四錢。遠志三錢。菖蒲八分。桑螵蛸三錢。龍骨三錢。龜板三錢。當歸三錢。

葛元真人百補交精丸。熟地黃酒浸一宿。切焙乾五兩。五味子六兩。山藥二兩。牛膝酒浸一宿。焙乾二兩。肉蓯蓉酒浸一宿。切碎焙乾二兩。杜仲去粗皮。鹽水炒斷絲三兩。澤瀉一兩。山萸

一兩。茯神一兩。遠志一兩。巴戟肉一兩。柏子仁微炒另研一兩。赤石脂一兩。右爲細末。煉蜜丸如梧子大。每服二十九。空心酒送下。一方有石膏一兩。

龍骨遠志丸。龍骨。遠志。茯苓。人參。茯神。菖蒲。等分蜜丸。硃砂爲衣。

濟川飲。熟地八錢。人參四錢。茯神。山藥。杜仲。枸杞。各三錢。棗仁二錢。五味子錢半。煨姜。燈心。少許。用金櫻膏沖服。

三白丸又名素丹。龍骨一兩。牡蠣一兩。鹿角霜二兩。右爲細末。滴水爲丸。如梧子大。以滑石爲衣。每服十丸。加至十五丸。鹽湯送下。空心服。加減地黃湯。熟地六兩。山萸肉。山藥各四兩。芡實。丹皮。雲苓各二兩。蓮鬚一兩。龍骨生研水飛淨三錢。魚鱉四兩。蛤粉炒成珠。共研末蜜爲丸。如梧子大。每日早晚吞服三四錢。一月卽止。

屢試如神。

又方 大熟地砂仁五分炒一兩。山藥五錢。丹皮二錢。知母二錢。茯苓三錢。澤瀉三錢。聚仁炒四錢。硃茯神二錢。升麻一錢。煎服。

「西法治療」內服賜保命藥片。注射「愛斯法」

手淫遺精之自療法

「病狀」過淫爲人生之大害。手淫則尤過之。蓋機械的刺激神經。排泄精液。其弊爲不自然。最足以戕賊神經。斷喪元氣。况犯手淫之病者。其自身無不知手淫之爲悖德。不過以沈溺其中而莫能悔改。故良心上之責備多。易使腦神經與脊髓神經疲乏。其結果遂爲神經衰弱症。惹起早泄陰萎。及發育不全等重患。而尤以遺精爲最。

「原因」青年情竇初開。渴慕女性。不得所歡。遂運

用心機。獨出縱擒妙法。自弄其生殖器官。以爲排遣。而呈一時之快。蓋手淫之舉。不須藉女性而發洩其性慾。且獨居無人處爲之。不防人口之可畏。此手淫家獨具之心理也。但手淫爲不正當之發洩性慾行爲。生理上一種變乎常態之要求。喜甫霍爾曰。一滴之精液。勝於四十滴之血液。又曰。不自然之情慾。使精液外放。其弊有二。一消耗血液中營養分。二浪費神經之勢力。神經衰弱。而生殖器官則愈形興奮。動輒勃起。慾念尤甚。此所以睡時易於遺精也。

「療法」桂枝龍骨牡蠣湯。桂枝八分。芍藥四錢。煨龍骨四錢。煨牡蠣六錢。甘草一錢。生薑三片。大棗四枚。

六味地黃丸。熟地八兩。砂仁酒拌。九蒸九晒。攪膏。山萸肉酒浸炒。山藥炒各四兩。牡丹皮酒洗微炒。白茯苓人乳汁製焙。澤瀉淡鹽酒拌炒。

各三兩。研細末。和地黃膏加煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服七八十九。食前淡鹽湯下。

益腎湯 熟地一兩。萸肉四錢。茯苓。茯神。當歸。

白芍各二錢。白朮。薏仁。生棗仁各五錢。北五味。

白芥子各一錢。肉桂。黃連各三分。水煎服。

保精湯 芡實一兩。蓮子五錢。山藥一兩。茯神。

二錢炒。棗仁三錢。黨參一錢。水煎服。先將藥湯。

飲之。後加白糖五錢。拌勻連渣同服。每日如此。

連服十日。有奇效。

尤須注意者。卽屏絕戒止手淫是。其未結婚者。

當速結婚。世未有任其婦人孤枕獨衾。而以手。

淫排泄精液爲樂者。故結婚爲防止手淫之唯。

一方法。此外如淫書淫畫。概不入目。淫曲褻語。

屏除不聞。一切烟酒咖啡等興奮之品。不令入。

口。衣服宜寬。臥時宜側。皆當實行以預防手淫。

發生者也。

附西法治療 內服「臭化鉀」鎮靜劑。然亦無甚功效。

縱慾遺精之自療法

「病狀」凡溺愛冶容而作色荒。謂之外感之慾。夜深枕上思得冶容。或成宵寐之變。謂之內生之慾。二者糾纏染着。則耗元氣損精神。增疾病。傷性命。蓋人之一身。神以御氣。氣以化精。精神充實。百骸強壯。足以有爲。若縱慾無度。貪色過甚。則慾竭氣耗。神不守精。腎水下涸。慾火上升。身心既因縱慾而受損。則腎自不能固攝精關。於是入睡鄉則遺精。因遺精而身心更虧。釀成癆瘵。其不致死於非命者。幾希矣。此少年所當猛省也。

「原因」色是少年第一關。此關打不過。任他高才絕學。總屬枉然。蓋萬事以身爲本。身乃以精爲。

寶。故精水不竭。則耳目聰明。肢體康健。如水之潤物。而百物皆毓。又如油之養燭。油不竭。則燭不滅。慾火焚燒。精神易竭。遂至窒其聰明。短其思慮。有用之人。不數年而廢爲無用。爲色念慾火傷身之病也。然因縱慾之過度。不特局部之神經。受其影響。全體之神經。皆蒙其害。蓋排泄過量之精液。保持與奮力之養分。爲之減少。身心兩方。感受無盡之疲勞。神經又安得而不衰弱。神經愈衰弱。則愈興奮。性慾反見旺盛。精關則愈不固。且因縱慾之結果。射精成爲習慣性。以致遺精流利。腎失其封藏之職矣。

「療法」清心丸 治經絡熱。夢漏。心恍惚。膈熱。縱慾過度之遺精。

川黃柏一兩。爲細末。生腦子一錢。同研勻。煉蜜爲丸。如梧子大。每服十丸。加至十五丸。濃煎麥門冬湯下。

豬苓丸一名半苓丸 治年壯氣盛。情慾衝動。所願不得意。以致遺精。

半夏一兩。破如豆。用木豬苓四兩。先將一半。炒半夏。予黃色。不令焦。出火毒。只取半夏爲末。糊丸。梧子大。候乾。更用前豬苓末一半。同炒微裂。入砂瓶內。養之。空心溫酒。或鹽湯下。三五十丸。蓋半夏有利勢。而豬苓導水。以導腎氣。使通之意。

桑螵蛸丸 治縱慾過度。以致下焦虛寒。怕冷。精滑不固。遺瀝不斷。

附子五味子。龍骨各半兩。桑螵蛸七個。切炒。爲末。純糯米糊丸。每服三十丸。空心鹽酒吞下。

加味四君子湯 治色慾過度而遺精者。

潞黨參三錢。白朮三錢。茯苓四錢。甘草一錢。黃芪三錢。山藥四錢。巴戟肉三錢。枸杞三錢。鹿茸八分。龜板三錢。遠志肉二錢半。五味子七分。煎