

欽定四庫全書

子部
證治準繩卷一百九



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣舒依

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

證治準繩

外科

疔毒

疔毒

疔毒

明 王肯堂 撰

其狀赤黑急治之此令

五日逆熇之 鬼遺云

丁疽發兩肩惡血留結內外榮衛不通發成疔疽五日
腫大令人口噤寒戰十二日可刺不治二十日死 陳
乾疽腫發起兩肩及兩大臂連脾骨二七日痛不息亦
不可動五十日身熱不赤六十日可刺刺之無血者死
或問肩上生疽何如曰此處手足三陽交會之所名
曰肩疽由風熱鬱結所致或因負重損傷而作服烏金
散勝金丹活命飲加柴胡桔梗壯實者一粒金丹下之
老弱者十全大補湯托之

肩脾疽

或問肩脾內痛漸至潰爛成瘡何如曰此名太陰疽即蓮子發屬手太陰肺經積熱所致宜活命飲加桔梗黃芪奪命丹勝金丹黃芪木香散選用壯實者八陣散一粒金丹下之赤色者可治青黑者不治喘嗽大渴面滿脉微者死

左右串

或問左右搭串何如曰左肩骨上生疽串於右者可治右肩骨上生疽串於左者難治古有此說愚謂不然攻

注左右者氣血不調陰陽交錯也宜勝金丹活命飲加
羌活桔梗壯實者八陣散一粒金丹下之七惡證少何
慮難痊元氣虛憊治之何補哉

缺盆疽

或問一人年六十肩前陷中生疽寒熱大作飲食少進
肩背拘急小水不利胸腹膨脹何如曰是名缺盆疽又
名鎖骨疽屬足陽明胃經手少陽三焦經宜隔蒜灸先
服紫金丹奪命丹而惡證退惟苦小水不利投以六一

散而利後服十全大補湯而安若治之稍緩必致潰爛
是經少血多氣瘡口不合危篤者多矣

肩後疽

或問肩膊後骨上生疽何如曰此名上鼠疽即上搭也
怒氣積鬱所致屬太陽兼少陽經初覺宜隔蒜灸活命
飲加羌活桔梗柴胡勝金丹紫金丹奪命丹選用既潰
十全大補湯黃芪木香散人參養榮湯

過肩疽

或問肩後夾脊兩邊腫硬疼痛何如曰此名筋疽亦名過肩疽初得寒熱似瘡但腫硬無頭急隔蒜灸服活命飲加羌活勝金丹奪命丹汗之壯實者一粒金丹萬病解毒丹選用

瘰癧癰

或問項腋兩乳旁結核或兩胯軟肉處生腫塊何如曰是名瘰癧癰屬手少陽三焦經其發緩慢是冷證非熱證也宜用回陽玉龍膏熱藥敷貼服內補十宣散何首

烏散勝金丹選用

腋發

靈樞云發于腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲細而長疎砭之塗以豕膏六日已勿裹之其癰堅而不潰者為馬刀挾癰急治之 鬼遺云內疚疽發兩腋下及臂并兩手掌中振寒熱血噤乾飲多即嘔煩心悁悁脉盛六七八日診如此可汗不汗死

夾肢癰

或問肩膊下隙内生疽何如曰是名夾肢癰屬手少陰
心經手厥陰心包絡風熱所致宜服內托黃芪柴胡湯
壯實者八陣散一粒金丹下之及紫金丹勝金丹選用
老弱者黃芪木香散人參養榮湯十全大補湯主之

臂部 七

臂癰

鬼遺云垂臂兩處發接骨下臂驚上起如雞鴨卵大皆
由榮衛不調所為也喜患實處而不透內亦宜急消或

發穴早療 兩臂肘起在接骨下引手至小骨之上發
癰癰此處雖實柰連大小筋骨舉動不便垂手多墜疼
如膿深沉徹骨即傷筋脉拳縮不舒搗撮宜急以緩慢
筋脉藥餌治之 玄機云在臂外為癰在臂內為魚肚
發在臂上節腫連肩髃為臂風毒宜活命飲加羌活獨
活桂枝桔梗水酒各半煎服及奪命丹紫金丹勝金丹
選用壯實有裏證者一粒金丹八陣散下之若漫腫無
頭服敗毒之藥不能消者宜十全大補湯加桂枝桔梗

托之有嘔吐而數日不食者潰出膿則愈

治驗一人年將六十五月患右臂膊腫盛上至肩下至手指色變皮膚涼六脉沉細而微此脉證俱寒乃附骨癰也開發已遲以燭針啓之膿清稀解次日肘下再開之加吃逆不絕與丁香柿蒂散兩服稍緩次日吃逆尤甚自利臍腹冷痛腹滿食減時發昏憤灸左乳下黑盡處二七壯又處托裏溫中湯一兩半與服或曰諸痛瘡瘍皆屬心火又時當盛暑而用薑附可乎予曰經云脉

細皮寒瀉利前後飲食不入是為五虛況吃逆胃中虛寒此證內外相反須當捨時從證遂投之諸證悉去飲食倍進瘡勢溫膿色正復用五香湯數服月餘而愈

機按

此證多屬虛寒此方專用辛熱以治其寒不用參朮以補其虛蓋因吃逆腹滿乃氣鬱壅也想必其人年雖老脉證雖虛而形體頗實非陰虛吃逆比

一揮使臂腫一塊不痛不赤脉

弱嬾食時嘔以六君子加藿香酒炒芍藥嘔止食進再以八珍湯二十餘劑膿成刺之又以十全大補湯而愈次年傷寒後臂復腫微痛乃傷寒餘毒也然無表證但

虛弱耳先用十宣散四劑取參芪芎歸扶助元氣防風
桔梗白芷厚朴行散腫結肉桂引經破血腫退三四再
用八珍湯膿潰而愈至冬臂復作痛因服祛風藥反筋
攣痛甚此血虛不能養筋筋虛不能束骨用加味十全
大補湯百貼而愈 一女臂患腫潰久不斂寒熱交作
五心煩熱飲食少思月水不通以逍遙散月餘少可更
服八珍湯加丹皮香附又月餘經通再加黃芪白斂兩
月餘而愈 一人臂腫患毒作痛服寒涼藥食少大便

不實予用理中丸二服更以六君子加砂仁藿香再以
托裏膿潰而愈 凡瘡痛甚者若稟厚有近五十左膊
外側紅腫如栗子曰勿輕視得獨參湯數斤乃佳數貼
而止旬餘值大風拔木瘡上起一紅線繞背抵右肋與
大料人參湯加芎朮補劑兩月而安 一婦臂痛筋攣
不能屈伸遇寒則劇脉緊細此良甫所謂肝氣虛為風
寒流于血脉經絡搏于筋筋不榮則乾急為痛先用舒
筋湯次用四物湯加牡丹皮澤蘭白朮而愈亦有臂痛

不能舉或轉左右作痛由中腕伏痰脾氣滯不行宜茯苓丸或控涎丹治之 一人手臂結核如粟延至頸項

狀似瘰癧此風濕流注用加減小續命湯及獨活寄生

湯更以托裏藥倍加參芪歸朮百貼而愈

機按此條有證無脉認作

風濕流注而治當時必有所見也後用補劑百貼而愈是終不離于虛也

一兒三歲臂患

毒焮痛服解毒丸搽神功散而消

此條證脉不詳當時必有所見 嘗治

臂毒便閉煩躁服五福化毒丹亦効若膿成急刺用紙

撚醯麻油絛瘡內以膏藥貼之若兒安靜不必服藥候

有膿取去仍用絛貼 一人臂患疽脉數飲槐花酒一

服勢頓退再與金銀花黃芪甘草十餘服而平

槐花治濕熱之

功最為神速胃寒不宜過劑

尹老家貧形志皆苦自幼頽疝孟冬

于手陽明大腸經分出癰第四日稠膿臂外皆腫痛在

手陽明左右經中其脉俱弦按之洪緩有力此得自八

風之變以脉斷之邪氣在表飲食如常大小便如故腹

中和口知味知不在裏也不惡風寒只熱躁脉不浮知

不在表也表裏既和邪在經脉之中故曰凝于血脉為