

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷六十五



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

薛氏醫案
 保嬰堂
 日書
 薛氏醫案
 保嬰堂
 日書

明薛已訂

曰云疔有十三種種各
 可救亦有不滿其數而
 染人發於頭面或遍身

者又非此類在小兒多因乳母食有毒之物或兒卒中飲食之毒或感四時不正之氣皆能致之其瘡多生頭面四肢形色不一或如小瘡或如水泡或痛或痒或麻木不仁外症寒熱嘔吐惡心肢體拘急大要當分邪之在表在裏急用隔蒜灸法并解毒之劑若不省人事牙關緊閉急以奪命丹為末熱酒調灌如食生冷之物或用凉水淋洗則輕者難愈重者不治其生於兩足者多有紅絲至臍生於兩手者多有紅絲至心生於唇口之內

者多有紅絲入喉急用針挑出惡血以泄其毒可保無虞其在偏僻之處藥難導達者惟灸法有回生之功若投峻厲之劑是促其危矣小兒肌肉脆嫩且不能言痛否灸法須將蒜切薄片著肉一面畧剝少空灼艾燃蒜先置大人臂上試其冷熱得宜然後移著瘡上又別灼蒜如前法試之以待相易勿令間歇

毗陵金文治子將週歲唇上患疔余用活命飲母子並服更欲隔蒜灸彼不從見腫勢益盛勉灸數壯余誠以

多灸為佳又為人所阻而止頭面益腫乃復灸五十餘壯腫勢漸消時與乳母服活命飲瘡出黃水翌日潰而得生

一小兒三歲手患紫疔二顆寒熱作痛用仙方活命飲半盃而愈數日後手臂俱腫乃用隔蒜灸服前藥而愈一小兒足患之嘔吐腹脹二日不食欲用護心散診氣口脈大審其大便所出皆酸穢余曰此飲食停滯耳非瘡毒內攻也若用護心等劑則誤矣急投保和丸二服

及隔蒜灸而愈其時同患是症用護心敗毒之劑者俱致不救

一小兒面上患之寒熱發搐此熱極而肝火動也用荆防敗毒散及隔蒜灸搐止熱退更服異功散加升麻柴胡桔梗而愈

一小兒患於胃外敷寒涼內服敗毒更欲嘔不食面色痿黃右關脈浮數按之微細此脾胃復傷所致也急用隔蒜灸服異功散倍加白朮半夏翌日又服活命飲而

愈

一小兒患前症服敗毒之藥作嘔不食余謂胃氣復傷不信另服護心散嘔甚神思沉困手足並冷脈微細如無急用五味異功散加乾薑二服嘔止食進去薑又四服而愈夫護心散皆寒涼之藥乃家人為服丹砂蓄熱發疽者而設胃氣有傷即當溫補多因此藥停於胃脘惟覺陰冷作嘔沉困者世人皆謂毒氣攻心而概用之鮮不敗事者矣

一小兒手背患此數服皆寒涼之劑腹脹痰喘瀉糞穢
臭余謂脾胃復傷而飲食停滯也不信仍服治瘡之藥
而殁

一小兒臂患之色赤腫起恪用化毒丹鐵箍散腫處頓
平肉色白陷再日色黯痰喘氣促余謂瘡毒反入於內
也辭不治果殁

飛龍奪命丹治瘡毒發背腦疽等症

真蟾酥乾者輕粉 枯白礬 寒水石 銅綠

乳香

沒藥

麝香

朱砂

各六錢

蝸牛

四十箇另研如無亦

可

右各為末入蟾酥蝸牛或加酒少許糊丸菜豆大每服一二丸溫酒或葱湯下重者外用隔蒜灸法

荊防敗毒散即人參敗毒散加荊芥防風

方見流注

仙方活命飲

方見熱毒瘡瘍

保和丸

方見發熱不止

五味異功散

方見敗毒之藥

時毒

頭面
赤腫

小兒時毒因感四時不正之氣致鼻面耳項或咽喉赤腫寒熱頭痛甚者恍惚不寧咽喉閉塞狀如傷寒五七日間亦能殺人脉浮數者邪在表脉沉濇者邪在裏在表用葛根牛蒡子湯在裏用梔子仁湯表裏俱病者犀角升麻湯甚則宜砭及用通氣散宣泄其毒旬日自消若不消而欲作膿者用托裏消毒散欲收斂者用托裏散若咽腫不能言頭腫不能食者必死

一小兒患此三日二便調和用葛根牛蒡子湯漫腫悉退惟頰間赤腫欲作膿用活命飲二服外用代針膏而膿出再用托裏消毒散而愈

一小兒腫赤焮痛此欲作膿也用托裏消毒散二劑膿成針之腫痛頓減又二劑漸愈却以柴胡梔子散加白芷升麻與母服之愈

一小兒腫焮作痛藥不能下咽先用通氣散連作嚏却用犀角升麻湯乳食少進腫痛漸消仍服數劑而膿血

漸少母服加味逍遙散而愈

一小兒患之咽喉作痛二便自調用葛根牛蒡子湯三劑甘桔湯四劑腫痛漸愈診乳母左關脉弦數用加味逍遙散母子並服而消

一小兒患之赤腫作渴外敷內服皆寒涼之藥余欲洗去敷藥急用發散表邪開通腠理之劑不信仍用前藥遂至不救

通氣散治時毒喉痛咽喉不利取嚏以泄其毒

玄胡索

猪牙皂角

川芎

各一錢

藜蘆

五分

羊躑躅花

三分

右為細末用紙撚蘸少許絛鼻內取嚏為效

甘桔湯治肺經壅熱胃隔不利咽喉腫痛痰涎壅盛

方見

時毒

犀角升麻湯治風熱口唇頰車連牙腫痛

犀角

錢二

升麻

防風

羌活

川芎

白芷

各五

錢

黃芩

甘草

各一錢

白附子

四分

右每服三五錢

梔子仁湯治時毒腫痛大便秘結

鬱金 枳殼炒 升麻 山梔仁 牛蒡子研碎炒

大黃炒各等分

右為細末每服二三錢蜜水調服

葛根牛蒡子湯治時毒腫痛消毒解熱

葛根 江西豆豉 貫仲 甘草 牛蒡子半生半炒

研碎各等分

右每服三五錢水煎

柴胡梔子散

方見
脇癰

托裏消毒散

代針膏

托裏散

仙方活命飲

四方並見
熱毒瘡瘍

加味逍遙散

方見發
熱不止

流注

小兒流注乃氣流而注血滯而凝元氣不足之症也或因閃跌墮傷或因肝火氣逆或因六淫內侵或因脾虛食積或因稟賦所致結於四肢節髀患於胃腹腰髻或結塊或漫腫或作痛悉用熨之之法須固元氣為主閃跌者和血定痛丸肝火者九味蘆薈丸食積者四味肥兒丸藥能對症未成自消已成自潰若膿成不潰者元氣虛也先補而針之庶使毒氣不致內攻氣血不致脫陷若膿出而反痛者氣血虧也用八珍湯作嘔少食者