

作者不詳

急救仙方

中國醫學大成續集

急救仙方提要

是書在宋志及諸家書目中均不載。惟焦竑國史經籍志。載有救急仙方十一卷。註見道藏亦不言作者爲誰。考白雲齋道藏目錄。太玄部側字一至十一號。即救急仙方。其卷一至卷五。論婦科調經胎前產後附雜症小兒方。首有金川徐守真序。其卷六七。乃仙授理傷續斷秘方。其序云。此方在唐會昌間。有一頭陀結草庵於宜春之鐘村。貌甚古。年一百四五十歲。買畝墾畲種粟以自給。珉有彭叟者。常往來其廬。顏情甚稔。或助之耕。一日彭之子升木伐條墜於地。折脛挫肱。呻吟不絕。彭訴於道人。道人請視之。命買數品藥。親製以餌。俄而痛定。數日已如平時。始知道人能醫。求者益衆。道人苦之。乃取方授彭。使自製以應求者。且誓之以無苟取。毋輕售。毋傳非人。由是四方求

治者日衆。率能藥到病除。據云彭叟初識道人年僅三十許。今老矣。然風采無異平時。問其姓名。曰蘭道。問其氏。曰長安人也。彭傳其治損諸方。因易其村曰掌道人。有書數篇。所授者爲最後一卷云。卷八、即疔瘡治法。卷九、爲秘傳五痔品。卷十、上清紫庭追勞仙方論法。卷十一、上清紫庭追勞仙方品。備列追勞湯丸針灸各法。各章俱詳證狀。與得病之原因。療治之方法。條分縷析。爲自來瘍科所未及。如疔瘡門內所立追疔奪命湯一方。又備詳加減之法。非精於是術者不易作也。學者苟能觸類旁通。是足以資博濟之用。雖雜瘡雜證諸門。稍有闕佚。然綱要具在。不足爲病也。

上海涵芬樓影印正統道藏本

急救仙方序

醫之療疾。莫難於婦人。婦人之疾。莫重於胎產。胎產之重者何。蓋以一身之疾。否繫乎母子之存亡。故千金方。部居獨以婦人。廁其首。此思邈孫真人之用心。不苟矣。世之胎產諸方。不爲不富。然其間多犯冗僻貴。冗則倉卒之際難備。僻則窮鄉下邑難得。貴則貧窶之家難求。是三者雖非君子用心之不周。而人之蒙其惠者。往往求什一於千百。今此方之編分爲三類。末附以雜病。雖不能如諸方之

廣載博該。要之不犯冗僻貴。而凡胎產危急之證。大略亦盡之矣。俾倉卒之際。窮鄉下邑。貧窶之家。皆得易而求之。雖一草一木。足以收效。豈若前三者之難爲功哉。苟有用者。始信其爲閨門之重寶云。金川徐守貞序。

急救僊方卷之一

側五

急救僊方卷之二

側四

急救僊方卷之三

側五

急救僊方卷之四

側四

急救僊方卷之五

側五

急救仙方卷之一

妊娠諸疾品

木苓湯。治婦人胎孕不安。

白朮

黃芩

各等分

右爲粗末。每服三錢。水二盞。當歸一根同

煎至一盞。稍溫服。

立效散。治胎動不安。如重物所墜。冷如冰。

川芎

當歸

各等分

右爲粗末。每服五錢。水煎。食前溫服。或下血。心腹痛。酒水相半煎服。

保安散。治妊娠因有所傷胎動。疼不可忍。及血崩不止。

連皮縮砂

不以多少。炒黑。去皮。

右爲細末。溫酒調下。覺腹中熱則胎已安矣。

治妊娠胎動不安。或腰痛。胞轉捨心。下血不止。

石菖蒲根

搗汁三升。飲之。

又方。艾葉如雞子大。以酒四升煮。取二升。分二服。良。

又方。檳榔一兩爲末。葱白湯調下。一錢匕。佳。
二黃散。治有孕胎漏下血。

生地黃

熟地黃

各等分

右爲細末。每服三錢。煎白朮。枳殼調下。
立聖散。治妊娠下血不止。

雞肝二具。用好酒一升煮熟。共酒食之。大
效。

枳芩散。治胎漏下血。或因事下血。

枳殼

去穢半兩。麝炒

黃芩

半兩

白朮

二兩

右爲粗末。每服五七錢。水煎。去滓。食前服。

治妊娠誤有失墜。或推築著。疼痛難忍。

當歸

兩一

新青竹茹

二合

右以好酒二升煮十數沸。分三服。

又方。以川芎爲末。每服二錢。溫酒調下。

治妊娠因頓跌。胎動不安。腰痛腹滿。或有所下。或胎上搶心。

熟地黃

兩二

白芍藥

艾葉

當歸

甘草

阿膠炒珠

黃耆

川芎

各一兩

右以咀。每服半兩。姜三片。棗一枚。水煎服。

火龍散。治妊娠心氣痛。

艾葉

半兩。鹽炒一半。

茴香

半兩。炒。

川練子

半兩。炒。

右爲細末。水煎。食前服。

通氣散。治妊娠腰痛。狀不可忍。此藥神妙。

破故紙。不以多少。瓦上炒香熟爲末。嚼。

胡桃肉一箇。空心。溫酒調下。三錢。

芎歸湯。治妊娠胎動。子死或不死。

川芎

當歸

各等分。

右㕮咀。每服三五錢。加紫蘇數葉。酒水合煎服。死者即下。未死者即安。

黃連湯。治妊娠兒在腹中啼。

黃連

錢二

生甘草

錢一

右濃煎汁。令母呷之。

又方。以多年空屋下鼠穴中土一塊。令母噉之。即止。

豬苓散。治妊娠從腳上腫至腹小。便微利。微渴。引飲。

豬苓

五兩

右爲末。以熟水服。方寸匕。日三。

葶藶散。治妊娠遍身洪腫。

葶藶_{二兩}

白朮_{五兩}

白茯苓

桑白皮

郁李仁_{各二兩}

右爲粗末。水六升。煮取二升。分三服。小便利。即差。

又方。澤瀉_{二兩}

葶藶_{二兩}

茯苓

枳殼_炒

白朮_{各六兩}

右爲細切。以水六升。煮取二升。分二服。防已湯。治妊娠脾虛。遍身浮腫。心腹脹滿。喘促。小便不利。

防已_{七錢半}

桑白皮

赤茯苓

紫蘇莖葉

各一兩

木香

二錢半

大便不通加枳殼檳榔。

右粗末。每服四錢。姜四片。水同煎。食前服。當歸為藥散。治妊娠腹中絞痛。心下急痛。

白芍藥

四兩

當歸

茯苓

各一兩

澤瀉

二兩

川芎

二兩

甘草

炙一兩

右為細末。每服三錢。食前溫酒調服。以蜜丸亦可。

人參散。治妊娠霍亂吐瀉。心煩腹痛。

人參

一兩

厚朴

姜製一兩

陳皮

一兩

當歸炒

甘草

半兩

乾生薑

一兩

嘔逆不止。加益智仁。煨草豆寇。

右吹咀。每服四錢。棗三箇。水煎服。

茯苓半夏湯。治妊娠惡阻。心中憤悶。頭目眩暈。四肢怠惰。百節煩疼。胃膈痰逆。嘔吐惡心。嫌聞食氣。好噉酸醎。多卧少起。全不進食。先服茯苓半夏湯。次服茯苓丸。

半夏

一兩二錢。湯洗七次。炒。

熟地黄

各七錢半

陳皮

赤茯苓

人參

旋覆花

芍藥

川芎

桔梗

各半兩

甘草

半兩

右爲粗末。每服五錢。姜三片。同煎。食前熱服。

茯苓丸

赤茯苓

人參

桂炒

半夏

湯洗

陳皮

乾姜

炮各五錢

白朮

葛根

各一兩

甘草

炙一兩

枳實

二兩

右爲細末。鍊蜜丸。桐子大。米飲下三五十丸。食前。