

痘疹定論卷之二目錄

面部先見報痘八卦方位之圖 并歌訣

斷氣血盈虧消長之理

辨虛實寒熱之異

起勢論

初發熱至痘報苗及出齊數日內調治法

痘出齊後起發灌膿數日內催漿足漿法

漿足回水至結痂還元數日內調治法

痘科備用緊要成方

炮製用藥之法

痘後痢疾論

似痢非痢論

神黃豆論

桑蟲論

地龍論

人牙論

人糞論

人中黃論

金汁論

痘疹避忌

痘疹定論卷之三目錄

終

痘疹定論卷之三

咸豐四年仲秋重校本

角山樓

豫章朱純嘏編輯

丹徒趙克宜小樓校訂

面部先見報痘八卦方位之圖

并歌訣

看痘先分部位。

乾宮出起定輕。

坎宮不美艮三

分。震上縱凶現定。

巽上先來必重。

離宮凶有

十分。

坤宮七數兌四分。

此訣急言人聽。

單粒報痘者稀疎。

雙粒出現者稠密。

熱退見苗

者順。

夾熱放苗者險。

痘已出透而熱不減者逆。

顆粒大而尖圓紅潤者吉。

顆粒大小不一微見尖

圓紅潤者半吉。

顆粒十之中有一分大則有二分

小不見尖圓紅潤者凶。

男從左起

女從右起



晰氣血盈虧消長之理

久○吾○聶○氏○曰○痘○瘡○全○憑○氣○血○以○成○功○而○氣○血○之○盈○虧○消○長○其○理○精○微○不○可○不○透○悟○也○蓋○氣○體○天○而○親○上○血○體○地○而○親○下○痘○之○出○也○其○高○起○之○泡○氣○之○位○也○上○也○氣○宜○充○焉○其○四○圍○根○腳○血○之○位○也○下○也○血○宜○附○焉○疱○尖○而○色○白○潤○是○氣○充○而○居○其○親○上○之○尊○也○四○圍○有○暈○而○色○紅○活○是○血○附○而○安○其○親○下○之○分○也○氣○居○其○尊○血○安○其○分○氣○血○和○順○而○載○毒○出○外○此○最○吉○之○痘○可○勿○藥○而○愈○也○頂○陷○則○氣○反○親○下○此○氣○虧○而○不○能○充○也○法○當○補○氣○四○圍○根○腳○無○紅○暈○此○血○虧○而○不○能○附○也○法○當○補○

氣而兼補血此其理猶易明也其有通頂紅色成血
泡者是血反觀上也此證最險必不能成漿至八九
日後則癢塌而死然此非血之獨盈乃由氣虧而失
其居尊之常故血得以妄行而僭居其位也急宜大
補其氣氣充則能統血血自不得泛溢妄行而庖轉
白矣世人不識此理見其庖紅則謬認爲血熱而用
涼血行血之劑致令氣愈虧而斃愈速也不亦悲乎
故氣血盈虧之理微妙而難識也至於調治痘瘡氣
血其氣獨虛者固宜專補氣而不宜補血蓋陽不能
從陰陰愈長則陽愈消也其有血虛者多由胃氣損

傷元氣不足所致蓋陰必從陽陽生則陰長也黃汝
言明醫雜著乃謂血虛而用參耆以補氣則陽旺而
陰血愈消甚矣其不明於陰陽消長之理而謬立此
言爲世大害也予每治便血之虛滑者婦人產後去
血過多而大發熱者婦人血虛崩漏而下血不止者
俱用參耆薑附爲主而佐以血藥與升提藥皆獲奇
效安在血病而不可補氣乎若痘瘡以胃氣爲主則
補血必先宜補氣也明矣故氣血消長之理不可不
深明也

辨虛實寒熱之異

久○吾○聶○氏○曰○凡○治○病○必○先○辨○虛○實○寒○熱○四○證○望○聞○問○切○無○非○辨○此○四○者○而○已○四○者○了○然○於○胸○中○則○用○藥○取○效○其○應○如○響○四○者○不○能○分○別○而○執○成○方○以○用○藥○鮮○有○不○誤○者○卽○或○中○病○而○愈○亦○幸○而○偶○中○也○至○於○痘○瘡○之○虛○實○寒○熱○尤○爲○緊○要○辨○之○不○明○用○之○多○致○敗○事○何○以○成○功○柰○何○歷○代○治○痘○之○家○著○論○立○方○互○相○同○異○至○於○虛○實○寒○熱○多○略○而○不○辨○或○辨○而○不○明○致○令○檢○方○者○漫○無○下○手○之○處○竟○不○知○某○證○屬○虛○屬○寒○當○用○某○方○用○某○藥○某○證○屬○實○属○熱○當○用○某○方○用○某○藥○則○雖○千○百○妙○方○千○百○妙○論○無○益○於○用○也○無○怪○乎○自○古○至○今○治○痘○者○之○

多迷途而慈幼之術疎也。且痘瘡之虛實寒熱與諸病之虛實寒熱其異同固自有辨。諸病有虛者元氣自虛也。宜補也。痘瘡有表虛有裏虛亦元氣自虛也。宜補也。此其相同者也。諸病有實者邪氣實也可瀉也。痘瘡有表實有裏實此則元氣完固而毒氣不能爲害不可瀉亦不必瀉也。此其不同者也。諸病有虛之甚者陰有餘陽不足則寒自虛生宜溫熱之劑補之也。痘瘡有虛之甚者亦陰有餘陽不足而寒自虛生亦宜溫熱之劑補之也。此其相同者也。諸病有寒自外入者外感是也。當其在表宜發散之久而入裏

痘疹定論

則鬱爲內熱宜清解之痘出而風寒外襲宜溫而散之或外寒入內而爲吐瀉諸證亦宜溫之而已外不可發汗內不可清解也諸病有虛熱者元氣虛津液竭而火從虛中起補之則熱自除也不必解熱也痘瘡亦有虛熱者元氣虛而毒氣肆也當以補元氣爲主而略兼解毒可也三者相同而亦有不同者也諸病有實熱者血氣未虧而邪氣壅盛單用寒涼瀉之可也痘瘡亦有實熱者稟氣強血氣盛而毒氣亦盛亦單用清涼解之可也此又其相同者也今自發熱之初以至還元之後俱皆辨證之虛實寒熱而遂立

方○於○其○後○令○人○細○心○審○證○而○後○用○藥○庶○不○至○於○虛○虛○
而○實○實○亦○不○至○於○損○不○足○而○補○有○餘○又○不○至○於○以○水○
益○寒○而○以○火○益○熱○也○然○痘○之○虛○實○寒○熱○較○之○他○證○猶○
顯○明○而○易○察○蓋○自○見○點○以○至○結○痂○其○形○其○色○既○昭○然○
可○觀○若○又○聽○其○聲○音○觀○其○靜○躁○視○其○飲○食○之○多○少○審○
其○大○小○便○之○利○澀○三○歲○以○上○者○診○其○脈○之○遲○數○洪○微○
其○辨○虛○實○寒○熱○當○如○黑○白○之○分○明○而○用○藥○取○效○易○易○
矣○

起勢論

此言起勢二字其生機有勃然奮發之義

看○痘○之○順○逆○更○有○精○微○之○理○又○不○拘○拘○於○稀○疎○稠○密○

中○論○也○此○在○心○思○之○巧○眼○法○之○高○看○痘○粒○之○逐○時○起○
發○長○大○早○辰○看○之○如○白○菜○子○樣○大○午○閒○看○之○如○糜○子○
粒○大○夜○來○看○之○則○有○高○糧○米○大○此○言○初○見○痘○苗○之○起○
勢○也○及○至○出○齊○雖○有○先○後○之○不○同○細○看○其○起○勢○其○起○
發○長○大○生○機○勃○然○總○屬○一○樣○至○於○長○漿○必○先○由○痘○粒○
之○暈○腳○起○長○開○盤○既○已○起○長○開○盤○便○見○痘○疱○之○內○漿○
即○隨○之○而○長○漿○既○長○矣○稠○膿○隨○之○而○上○三○日○灌○漿○之○
期○不○差○時○刻○而○膿○漿○已○充○滿○矣○夫○所○謂○起○者○起○發○之○
義○也○所○謂○勢○者○天○地○生○物○之○機○物○各○以○類○而○生○生○不○
已○其○機○不○停○滯○也○譬○如○果○木○春○月○開○花○夏○月○結○實○秋○

月成熟其生機總無停滯今言痘之起勢有以似之
稀疎者已稱順證卽稠密者亦歸之於順矣易曰雲
行雨施品物流形雲行雨施者氣之亨也品物流行
者物隨造化之氣以亨也欲學看痘者先要明起勢
之理細看起勢之形其中又有尖圓紅潤四者之分
別焉若證不順烏有此勃勃然起發之形像也

初發熱至痘報苗及出齊數日內調治法

久吾輩氏曰大凡調治痘瘡自發熱之初見點之時
卽須思及何如起發何如灌漿何如收結動手用藥
便要顧首顧尾慎其初以善其後然後次第調治可

保萬全也

一發熱之初。若身熱和緩。或熱或退。神清氣爽。飲食如常。則不必用藥發汗。但戒葷忌風。調護而已。蓋痘有順而不必治者。不輕治。即所以調治之也。其或增寒壯熱。頭痛咳嗽。鼻流清涕。多因外感。不可不發散也。當視兒強弱。而用藥發汗。體氣素壯實者。用加味升麻葛根湯。汗之。體氣素怯弱者。用加味參蘇飲。汗之。然不可出汗太多。恐發虛。其表後難起。脹灌膿也。

既經發汗。而身熱漸緩。兒頗安靜者。其痘出必稀少。

此爲順候。且勿服藥。以待其報苗。發汗之後。或身熱不退。而煩躁譫語。口渴。飲水宜用。敗毒和中散。清之。切不可過用寒涼。分兩急於峻攻。恐苓連性寒。冰伏其毒。始焉出之不快。繼焉灌漿。又難其中妙用。神而明之。存乎其人。或減苓連分兩。或用芩而不用連。或并苓連俱不用。是在用藥者臨時之權變。斟酌。倘大便秘澀。加酒蒸熟大黃一錢。微利之。倘外感風寒。此中去苓連。加羌活。白芷。蘇葉。各五分。發散而兼托痘。來日必報苗。則中自安也。服此煩躁少減。卽止。勿服。聽其痘外出。則煩悶躁渴。

譖語必減退安靜。

或有腰痛腹痛而煩悶者。此其毒氣誠重。然只當用此敗毒和中散主之。大便秘加酒蒸熟大黃微利之。聽其痘出外則內痛自止。然後看其痘或稠密或紅或紫或帶焦黑乾枯等色。急於此方內倍加芩連紫草茸以清血分之毒。火切不可純用寒涼并犀角生地以阻遏其毒出之勢。立致內攻。告變。世人不知此理。多用寒涼解毒。或用硝黃峻下。因而速斃。而卒不悟者多矣。

當時令眾人出痘時。小兒或有發熱稍緩。其熱或作