

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷四十五



南京中医药大学图书馆版权所有

證治準繩卷四十五

傷寒

少陰病

白芍湯

滿時痛吐利不渴者不陰

論見腹滿活人
云理中湯主之

病人

服陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰經當咽痛而

明 王肯堂 撰

復吐利

桂枝乾薑湯

少陰病吐利手足厥冷煩燥欲死者

吳茱萸湯主之

少陰病吐利手足不厥冷反發熱者

不死脈不至者灸少陰七壯

龐云在內踝後跟骨上動脈陷中陰熱論其身發熱

也余按少陰之絡非特一穴今日少陰而不指某穴者針法當隨四時隨運氣以取井榮俞經合不可執泥

也龐氏定以為太谿恐非仲景本旨

少陰病吐利煩燥四逆者死少

陰病下利欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之

論見下利

少陰病腹痛小便不利四肢重痛自下利或嘔者真

武去附子加生薑湯

溫見下利

少陰病下利脈微瀉嘔而

汗出者當溫其上灸之

論見欲寐溫其上謂下有寒氣當溫其上以助陽氣也

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈

微欲絕者四逆湯主之

王叔和霍亂篇

太陽與少陽合病頭痛脇痛往來寒熱自利而嘔者黃

芩加半夏生薑湯

論見合病

發熱汗出不解心中痞鞭嘔

吐下利者宜大柴胡湯

論見痞

發汗後水漿不得入口

者為逆若更發汗必吐下不止嘔吐而利者名曰霍

亂病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此名霍亂自吐下

又利止復更發熱也

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多飲

水者五苓散主之 寒多不飲水者宜理中湯

理中湯方

人參

乾薑

炮

甘草

炙各一兩

白朮

二兩

右判每服四錢水煎去滓溫服如寒甚者加乾薑一

兩半 渴欲得水者加白朮一兩半 臍上築者腎

氣動也去白朮加桂枝二兩 吐多者去白朮加生

薑四兩 下利多者倍用白朮 悸者加茯苓二兩

腹滿者去白朮加附子一枚服湯後如食頃飲熱

粥一升許自溫勿發揭衣被活人云或四肢拘急或轉筋者亦去朮加附子

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主

之吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯

惡寒脈微利止者四逆加人參湯方論見惡寒

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈

四逆湯加猪胆汁主之 甘草炙二兩 乾薑三兩 附子大者一枚

去皮破猪胆汁半合

右三味咬咀水三盞煎至二盞去滓納猪胆汁分作

溫服其脈即來

吐利發汗脈平不煩者以新虛不勝穀氣故也 乾嘔

而利兼脇痛而表解者宜十棗湯心下痞鞭而煩者宜

甘草瀉心湯兼厥逆脈微者通脈四逆湯白虎加豬胆

汁湯

詳見前
乾嘔門

診脈陰陽俱緊至於吐利其脈獨不解緊去人安為欲
解若脈遲至六七日不欲食此為晚發水停故也為未
解食自可者為欲解

霍亂證治已詳雜病茲不贅

下利

成自利者不因攻下而自泄瀉也有表邪傳裏裏協熱而利者有不因攻下而下之遂利者是皆協熱也又三陽合病皆作自利有發表攻裏和解之不同

太陽陽明合病為在

表故與葛根湯以汗之太陽少陽合病為在半表半裏故與黃芩湯以和解之陽明少陽合病為少陽邪氣入裏故與承氣湯下之且自利不渴者屬太陰藏寒故也下利欲飲

水者有熱故也故大便溏小便自可與夫發熱後重泄

色黃赤者皆為熱也自利小便色白少陰病形悉具與

夫惡寒脈微自利清穀者皆有寒也夫自利固多可溫

然腸胃有積結與下焦客邪又非溫劑所能止必也或

分利之或攻泄之乃可也

經曰理中者理中焦此利在下焦宜赤石脂禹餘糧湯不

差當利其小便是也少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥與夫下利三部皆平按之心下硬或脈沈而滑或不欲食而謔語成差後至年月復發此數者皆又腸胃有積結而須攻泄者也此則謂之通因通用

下利雖有表證不可發汗以下利為邪氣內攻走津液

而胃虛也經曰下利不可攻表汗出必腹滿是也蓋三

陰自利居多然自利家身涼脈靜為順身熱脈大為逆

大抵下利脫氣又為難治蓋邪盛正虛邪壅正氣下脫

多下利而死

經曰少陰病自利復煩燥不得臥寐者死直視譫語下利者死下利日十餘行脈反

實者死下利手足厥冷無脈灸之不溫脈不還者死發熱下利至甚厥不止者死此數者皆邪氣壅正氣下脫

故要略曰六府氣絕于外手足寒五藏氣絕于內利下

死不禁噫疾成而後藥雖神醫莫能為氣已脫矣孰能為

之六經俱有下利之病表裏寒熱治各不同學者宜審

太陽傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或

利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯 太陽

與陽明合病必自下利葛根湯 成傷寒有合病有併病

者謂之併病三經俱受邪相合病者與太陽少陽合病陽明少

邪氣甚也太陽陽明合病者以邪氣併於陰則陰寔而陽

陽合病皆言必自下利者以邪氣併於陰則陰寔而陽

虛邪氣併於陽則陽寔而陰虛寒邪氣甚客于二陽二

陽方外寔而不主裏則裏氣虛故必下利與

葛根湯以散經中甚邪其脈必浮而長也 太陽病

外證未除而數下之遂挾熱而利利不止心下痞鞭表

裏不解者桂枝人參湯 張或云仲景論中太陽病桂枝

證醫反下之利遂不止與葛根

黃連黃芩湯上條又與桂枝人參湯且二證俱係表不

解而下之成利者何故用藥有溫涼之異夫二證俱係

內虛熱入協熱遂利但脈證不同故用藥有殊耳經言脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃連黃芩湯主之夫脈促為陽盛喘而汗出為裏熱其陽盛裏熱與葛根黃連黃芩者理所宜也 太陽與少陽

合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯

下利而頭痛胃滿或口苦咽乾或往來寒熱其脈或大而弦是也

黃芩湯方 黃芩_{兩三}芍藥 甘草_{各二}大棗_{十二枚}

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜

一服

虛而不實者苦以堅之酸以收之黃芩芍藥之苦酸以堅斂腸胃之氣溺而不足者甘以補之甘草大棗

之甘以補固
腸胃之弱

黃芩加半夏生薑湯 黃芩湯內加半夏半升洗生薑

三兩切

太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞭下利不止水

漿不下其人心煩

生薑瀉心湯張凡合病皆下利各從外證

以別焉夫太陽病頭項痛腰脊強陽明病目疼鼻乾不
得以少陽病胃脇痛耳聾凡遇兩經病證齊見而下利

者曰合病也雖然但見一證便是不必悉具然仲景不
言脈證止言太陽與陽明合病者以前章所論包含已

上之證即此理也況各經
之證所見不一難為定論

太陽病桂枝證反下之利

遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃連湯

葛根黃芩黃連湯方

葛根半斤甘草炙

黃芩各二兩黃連

三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升去滓分溫再服

內經曰甘發散為陽表未解者散以葛根甘草之甘苦以堅裏氣弱者堅以黃芩黃連之苦

太陽病下之脈促不結胸者為欲解脈沈滑者協熱利

脈浮滑者必下血

黃芩湯

太陽病二三日不能臥但欲

起心下必結脈微弱者此本有寒分也反下之若利止

必作結胸未止者四日復下之此作協熱利也

黃芩湯

傷寒中風反下之利遂不止穀不化腹中雷鳴心下鞭

滿乾嘔心煩不安醫見其痞復下之痞益甚此非結熱

以胃中空虛客氣上逆故使鞭也甘草瀉心湯 傷寒

汗解後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹

中雷鳴下利者生薑瀉心湯 太陽中風下利嘔逆表

解者乃可攻之其人熱漿汗出發作有時頭痛心下痞
鞭引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和
也十棗湯 傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下
利者大柴胡湯 傷寒十三日不解過經譫語者以有
熱也當以湯下之若小便利者大便當鞭而反下利脈
調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脈當
微厥今反和者此為內實也調胃承氣湯 太陽病二
日反燥反熨其背而大汗出大熱入胃水竭燥煩必發

譫語十餘日振慄自下利者為欲解也 傷寒醫下之

續得下利清穀不止身痛者急當救裏四逆湯身痛清

便自調者急當救表桂枝湯

成傷寒下之續得下利清穀不止身痛急當救裏以

裏氣不足必先救之急與四逆湯得清便自調知裏氣已和然後急與桂枝湯以救表身痛者表邪也內經曰

病發而不足標而本之先治其標後治其本此以寒為本也

四逆湯方

甘草

炙二兩

乾薑

半一兩

附子

破一枚去皮

用一

附子去皮臍先將鹽水薑汁各半盞用砂礮煮七沸後入甘草黃連各半兩再加童便半盞再煮七沸住火良久撈起入磁器盛貯受地氣一晝夜取出晒乾以備後用庶無毒害頂圓修正一兩一枚者佳