

35

中西醫學報

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第一輯

上海辭書出版社

中國近代
中醫藥
期刊彙編

35

1994.12

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第一輯

35

中西醫學報

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目錄

中西醫學報	第八年第一期	1
中西醫學報	第八年第二期	71
中西醫學報	第八年第三期	145
中西醫學報	第八年第四期	215
中西醫學報	第八年第五期	283
中西醫學報	第八年第六期	351
中西醫學報	第八年第七期	427
中西醫學報	第八年第八期	497

中華民國六年八月出版

中西醫學報

第八年第一期

本期之目錄

- | | |
|------------|-----|
| 花柳病救護法序 | 陳邦賢 |
| 花柳病問答 | 葉蘊伯 |
| 中風病中西治療之大要 | 馬孟元 |
| 嬰兒養育法 | 葉蘊如 |
| 妊娠時之調養法 | 葉蘊如 |
| 分娩後之調養法 | 葉蘊如 |
| 自製補血藥方 | 孫祖烈 |
| 最新萬病土療法 | 許家慶 |
| 女子生育學校感言 | 梁紹浚 |
| 肉食中之牛馬鑑別法 | 劉超林 |
| 發疹瘰癧斯病原之發見 | 馬弘道 |
| 小兒看護法 | 孫祖基 |
- 本報全年十二冊本埠洋八角四分中國境內洋九角
六分日本臺灣洋一元零八分香港南洋各島洋一元
三角二分零售每冊洋一角上海英大馬路泥城橋西
龍飛馬車行西首間壁三十九號丁福保醫寓發行

商日 **仁壽堂大藥房廣告** ●醫療用各種藥品 ●醫療用各種器械 ●
工業用各種藥品 ●棉花綳帶材料 ●閨閣用各種化妝品 ●代售各售
靈藥

敬啓者本大藥房專向日本著名各大廠販運上等原封藥品並寄種
仁丹 日月水 中將湯 胃活 靈效丸等著名靈藥茲值交易伊
始**特廉價發售**以廣招徠賜顧者請認明牌號庶不致誤此佈

上海虹口吳淞路
字第一五〇號

仁壽堂大藥房謹啟

電話第四〇五七番

花柳病救護法序

陳邦賢 治愚

傳染病有二種。一曰急性傳染病。一曰慢性傳染病。慢性傳染病之最劇者。又有二種。一曰肺結核。一曰花柳病。據人間死亡數言之。死於慢性傳染病者。決不少於急性傳染病。而其爲害於人。急性者與慢性者。亦不同。彼百斯篤虎列刺。赤痢。能於一時奪幾萬人間之生命。實爲至危險之病。幸不時常流行。流行苟止。則其害亦無。然肺結核、花柳病。則非必即傷人命。惟次第損其健康。且其害不止在罹病者之一人。并延及子孫。毒及社會。至人種亦因以退化。故其禍實不讓急性傳染病。

今試舉一千八百九十九年急性與慢性傳染病德國之死亡統計。則知死亡總數爲七十二萬五千八百零一人。其中痘瘡死者十四人。霍亂死者四千四百零五人。猩紅熱死者一萬二千一百三十六人。合計一萬六千五百五十五人。然慢性傳染病。則肺結核患者已有六萬八千四百零八人。當急性傳染病全體之四倍。占死亡總數之十分之一。

花柳病救護法序

一

花柳病救護法序

二

爲花柳病而死者其統計雖甚難知然苟思慢性腦病、脊髓病、內臟諸病所斃之男子其原因皆爲梅毒感染之故又考方生即死及生無幾時而即死之小兒皆先天梅毒并爲婦人科病所死之婦人其原因皆爲淋病傳染之故則可以知花柳病者之死亡數亦不多讓於結核病之死亡數也

世間花柳病患者其數若干德國常調查之當千九百年四月三十日德國政府命全國醫師以其一日中所治療之花柳病患者數報告政府於是應其命而報告者爲醫師全體百分之五十二即爲半數有餘而患者之總數有四萬九千零二人寇氏又謂德國花柳病患者一日平均約十萬人即人口千人中有三人蓋實有以上統計之二倍數云德國素重衛生檢徽嚴密染花柳病者當如此之衆况吾國向無娼妓檢徽者乎

吾國花柳病繁衍之地以上海廣東等處爲最即以上海論娼妓約五千人以上恐此五千人中無一不染花柳毒者每人每日與一人交接則每日即有五人遊客染花柳毒者以一月統計之染花柳毒者則有十五萬人以三十人中一人染花柳重症而致死○者計之則每月當死亡五千人若以每十人中一人染淋病或梅毒而致盲目穿孔

殘疾等者計之則每月當有一萬五千人假使此十五萬人再傳播於其妻或遺傳於其子女因以流產或早殤或衰弱等若以其數計之則更不知增幾許倍矣
上海一隅染花柳毒者當如此之多況吾國地大物博數千倍於上海之地乎吾國警察既無檢微之說而吾國醫者又多不明其花柳病之真正原因以致染花柳病者愈染愈多愈趨愈劇即此一端已足亡吾國而有餘矣夫花柳病包括梅毒淋病軟性下疳三者之總稱也其病菌各不相同有一人同時感染此菌而又感染彼菌者無一人因一種菌而併發數病者更無以一種藥丸藥粉或藥水而能統治一切花柳病者故市僧所售之花柳藥率多欺詐非但無效而且有害試以染花柳病者損失之醫藥費約略計之每人至少數約十元若以一月十五萬人統計每月需損失一百五十萬元上海一隅每年需損失一千八百萬元若以全國染花柳病者損失之醫藥費集而與海軍整國防倡實業修內政亦何患國家不能與列強相抗衡耶
花柳病非全不能治愈之病也亦非全能治愈之病也惟視治之者之方法為何如耳軟性下疳除異常症治則必愈淋病梅毒治得其道則未有不愈者治不得其道雖即治愈恐亦不免有再發之虞故花柳病之治療救護關係於生命及殘疾者甚大吾國

花柳病救護法序

花柳病救護法序

四

既。乏。良。醫。更。鮮。花。柳。病。書。籍。此。邦。賢。之。所。以。編。纂。花。柳。病。救。護。法。也。
此。書。分。上。下。二。編。上。編。總。論。專。述。花。柳。病。之。慘。害。俾。未。染。者。讀。之。得。以。警。省。下。編。各。論。
分。述。軟。性。下。疳。淋。病。梅。毒。等。種。種。救。護。之。方。法。俾。已。染。者。讀。之。不。必。延。醫。僅。可。自。行。治。
療。按。法。施。治。必。獲。奇。效。即。當。世。醫。者。讀。之。亦。如。獲。臨。牀。之。寶。典。也。愿。海。內。同。志。一。嘗。試。
之。

花柳病問答

葉蘊伯

問何謂花柳病。

答因狎妓而傳染之惡疾。謂之花柳病。

問花柳病如何傳染而來。

答與有花柳病毒之妓女交接。或健康之婦女。與有花柳毒之男子交接。陰莖及陰部稍有微細之創傷。則病菌即乘之侵入體內。漸漸發展其勢力。而全體遂蒙其害。此外與患者接吻。及同用一切器具。（如手巾、便桶、被褥等類）亦能傳染本病。

問花柳病共分幾種。

答花柳病之種類甚繁。然普通大別之爲四種。即梅毒、淋病、下疳、橫痃。是也。梅毒即俗所謂楊梅瘡。淋病俗名白濁。下疳有軟性硬性之別。橫痃又名便毒。倘破潰即俗所謂魚口也。

梅毒篇

問梅毒症狀之深淺。可分爲幾期。

答可分爲三期。病勢初起爲第一期。病狀大顯爲第二期。病毒深入臟腑爲第

花柳病問答

花柳病問答

二

三期。

問第一期之症狀如何。

答病毒感染後。伏在人體內約一星期或三星期之久。然後始漸漸發出。起初男子則於龜頭。女子則於大陰唇間。發生無痛而微痒之小硬結。此即硬性下疳。過數日後。遂破潰流出膿汁。鼠蹊部淋巴腺亦腫起硬而且大之核。按之不甚疼痛。此即無痛性橫痃。爲梅毒漸蔓及全身之徵候也。

問第二期之症狀如何。

答經過第一期後。若不治斷根。則病勢漸移入第二期。此時硬性下疳及橫痃已愈後。三四十日。或一年以上。初覺周身疲倦。頭痛。男子則於龜頭頸圍近部。女子則於陰唇陰核等處。生灰白色。或微紅色之扁平贅肉。漸至顏面四肢亦發大如豌豆之紅疹。又或爲水泡及膿泡之疹。即俗所謂楊梅毒瘡是也。同時又惡寒發熱。骨節疼痛。喉痛（均於夜間爲甚）。頸部生瘰癧。陰門肛門等處潰爛。爪甲及齒牙變形等。此時如治不得法。則必陷於最危險之三期梅毒。

問第三期之症狀如何。

答經過第二期後。病勢再增進。則陷於三期。此時病毒漸漸破壞全體諸器官。於是全身皆生瘰癧。前額及腿頸骨起橡皮腫。不能屈伸。更進則疼痛化膿。或成瘻孔。眼睛耳聾。鼻梁陷沒。聲音嘶啞。於是全身組織。悉被破壞。而大命以傾。

問何謂惡性梅毒。

答梅毒往往於第一期中。突然發現二期症狀。又突然移行於第三期者。此爲惡性梅毒。其毒更爲猛烈。

問第一期梅毒之療法如何。

答初起時之硬性下疳。須以強烈之腐蝕藥腐蝕之。而裹以沃度仿綿紗。輕者約一星期即可治愈。惟仍宜急服全身驅微劑。

問第二三期之梅毒療法如何。

答宜施全身驅微療法。如汞劑及沃度劑等。或內服。或注射。或外塗。惟最特效者。莫妙於注射新六零六。NEOSALVARSAN收效確而且速。并能斷根。

問新六零六與舊六零六比較。孰優孰劣。

答舊六零六效力雖好。但副作用太多。新六零六又名九百十四。效力既極確實。又無

花柳病問答

三

花柳病問答

四

副作用。即體質虛弱者。注射亦無妨害。故患者寧用新六零六爲佳。

問六零六注射何處爲最宜。

答六零六注射法有三種。一爲皮下注射。一爲肌肉注射。一爲靜脈注射。三種中以靜脈注射效驗爲最確實。故近今醫生。已不甚賞用皮下及肌肉之注射法。而多行手腕靜脈之注射。但此種手術。尋常人斷不能行。非熟諳之醫生施行不可。

問六零六有無流弊。

答有心臟疾病。及血管疾病之人。不宜注射六零六。此外均無流弊。

下疳橫痃篇

問下疳有幾種。

答有兩種。即硬性下疳。軟性下疳是也。

問何謂硬性下疳。

答硬性下疳爲梅毒之起點。其症狀已詳載第一期梅毒中。

問何謂軟性下疳。

答軟性下疳者。男子則生在包皮內葉。或包皮外緣。包皮繫帶等處。女子則生在陰唇

腔口等處。係大如帽針或大如蠶豆之潰瘍。疼痛出膿。且蔓延性極廣。有多數之發生。甚至有陰莖全部皆潰爛者。

問軟性下疳有無併發症。

答常與急性橫痃併發。

問下疳之療法如何。

答硬性下疳初起時。當用濃厚石炭酸腐蝕之。或切除患部。如已潰爛。則用沃度仿謨撒布。或用甘汞、次硝蒼撒布。如呈硬結節者。則貼水銀硬膏。

軟性下疳。宜先以昇汞水、或石炭酸水、洗滌患部。而後以沃度仿謨、及次沒石子酸蒼鉛、或阿依洛芬、等撒布於潰瘍上。然後覆以綿紗或油紙。而終施繃帶。

問何謂橫痃。

答橫痃往往與梅毒、淋病、軟性下疳、等併發。生在鼠蹊部（即兩跨間）係硬而且大之核。紅腫疼痛。步行不便。急性者且發熱惡寒。病勢增劇。則化膿破潰。於是病毒由血管而入全身。

問橫痃之療法如何。

花柳病問答

花柳病問答

六

答塗搽沃度丁幾。或水銀軟膏。(惟二藥不可併用)如再不消散。則須施切除術。然非手術熟諳之醫師行之不可。

淋病篇

問淋病有幾種分別。

答有急性、慢性、前尿道淋、後尿道淋、之分。

問何謂急性淋病。

答初起時尿道口微癢。漸漸流出黏液。閉塞尿道口。時欲放尿而又困難。病勢再進。則

尿道化膿。含有極烈之膿菌。小便時異常疼痛。晚間就寢。陽物自然勃起。

問何謂慢性淋病。

答慢性淋病者。係由急性淋病未經治愈。以致釀成慢性症狀。放尿時有黃色之粘液物混於尿中。早起時被膿汁粘着尿道口。以致小便困難疼痛。

問何謂前尿道淋。後尿道淋。其診斷法如何。

答淋毒僅限於尿道之前部者。為前尿道淋。如兼侵及尿道後部者。即併發後尿道淋。其診斷法。先使患者一次放尿。分入二個玻璃盃。視兩盃所貯之尿。其色混濁如一

者。是有後尿道淋之併發症。如前盃混濁。後盃不混濁者。大抵無後尿道淋併發之徵矣。此外又有一診斷法。先以硼酸水洗清前尿道部。而後放尿。若其尿全無混濁及膿液者。則是無後尿道淋之確徵。反之則是有後淋之證也。

問淋病有無他種之併發症。

答淋病往往併發睪丸炎。副睪丸炎。尿道狹窄炎。攝護腺炎。關節炎。精囊炎。精系炎。

問試將以上種種併發症舉其大略。

答睪丸炎。副睪丸炎者。均係睪丸腫大。急性者甚至惡寒發熱。如兩睪丸均受淋毒。則失製造精液之機能。往往不能生育。此為淋病最易併發之症也。

尿道狹窄炎者。係尿道腫脹。放尿時非常困難。小便極細。如尿道蓄不潔之物過多。必致不能放尿。往往於陰莖外面或肛門周圍穿孔。此中放出之尿。常混膿汁。直為終身不治之症。凡患淋病久不治癒者。多有釀成此症。

攝護腺炎者。即會陰部腫脹。生如栗子大之硬結。(或大如雞卵)發熱惡寒。大便時疼痛。甚至化膿。結果頗危。

關節炎者。係淋毒侵入全身關節。致發腫脹疼痛。甚至發熱。手足不能伸屈。如係惡

花柳病問答

七