

醫統正脈全書



63年

黃帝素問宣明論方卷十

江陰朱氏校刊本

金河間劉完素著

燥門

消渴論

燥乾者金肺之本燥金受熱化以成燥澁也兼火熱致
金衰耗液而損血鬱而成燥者由風能勝濕熱能耗液
故經云風熱火同陽也寒濕燥同陰也又燥濕小異也
金燥雖屬秋陰而其性異於寒濕而反同於風熱火也
又加大便乾澁乃大腸受熱化成燥澁經云諸澁枯渴

又如癰瘰中風皆因火熱耗損血液玄腑閉塞不能浸

潤金受火鬱不能發聲

經云肺主聲

肢痛痠疾者風熱濕相

致而遂以偏枯語音澁手足不隨也然中寒吐瀉亡液

而成燥亦以鮮矣亦有寒濕相鬱榮衛不能開發貫注

多成偏枯經曰諸澁枯涸乾勁皴揭屬於燥也 又如

胃膈痺熱煩滿饑不欲食或痺成消中善食而瘦或燥

熱鬱甚而成消渴多飲而數小便或因熱病或恣酒飲

誤服熱藥以致脾胃眞陰陽損虛肝心衰弱也狂陽心

火燥其三焦腸胃燥澁怫鬱而水液不能宣行也則周

身不得潤澤故瘦悴黃黑也而燥熱消渴然雖多飲亦必水液不能浸潤於腸胃之外湯不能止而便注爲小便多出俗未明妄爲下焦虛冷誤人多矣 又如周身煩燥鬱故變爲雀目或內障癰疽瘡瘍上爲咳嗽喘下爲痔痢或停積而濕熱內甚不能傳化者變爲水腫濕成也世傳消渴病及消瘦弱或小便有脂液者爲消腎也此爲三消病也消渴消中消腎經意但皆熱之所致也

人參白朮湯

治胃膈痺熱煩滿饑不欲食痺成爲消

中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小便兼
療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩風中偏枯酒
過積毒一切腸胃燥澁倦悶壅塞瘡疥痿痺并傷寒
雜病產後煩渴氣液不得宣通

人參

白朮

當歸

芍藥

大黃

山梔子

荊芥穗

薄荷

桔梗

知母

澤瀉

茯苓

連翹

瓜蒌根

乾葛

甘草

藿香葉

青木香

官桂

石膏

各半兩

各一兩

各一分

去皮

二兩

四兩

寒水石二兩

滑石半斤

右爲細末每服抄五錢水一茶盞入盆硝半兩生薑

三片煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至十餘錢

得臟腑流利取効如常服以意加減兼服

消痞丸散以散腸胃

結滯濕熱內甚自利者去了大黃芒硝

絳雪散 治消渴飲水無度小便數者大有神効

漢防己

栝蒌實

黃芩

黃丹

各等分

右爲細末每服二錢湯漿水調下臨卧時併進三三

服卽止

人參散 治消腎善飲而食後數小便溺者

人參

錢三

白朮

澤瀉

瓜蒌

桔梗

梔子

連翹

各半兩

葛根

黃芩

大黃

薄荷

白茯苓

各一兩

兩

甘草

半兩

石膏

二兩

滑石

寒水石

各三兩

右爲末入宿砂仁三錢每服五錢水一盞煎至七分

入蜜少許再煎三二沸去滓食前食後服消痞丸

大黃甘草飲子

治男子婦人一切消渴不能上者

大豆

五升先煮三沸出淘苦水再煮

大黃

一兩半

甘草

大麓者四

兩長四指打碎

右三味用井水一桶將前藥同煮三五時如稠糲水少更於豆軟盛於盆中放冷令病人食豆渴食不論無時時食食後消渴如若不止再煮前藥不三

痢門

總論

夫痢者五臟窘毒而不散或感冷物或冒寒暑失饑不能開發久傷冷熱等食更或服暖藥過極鬱化成利自

宣明論卷一
古人三口白利爲寒赤利乃熱其三口悞也今人瘡節
初發刺開乃血多日成膿何爲先熱而後寒也

叔和云濕多成五泄腸走若雷奔愚醫不悟三口黃者
乃熱青利是寒太素曰五泄有溏泄驚泄飧泄濡泄滑
泄也此乃五泄五泄者青是感肝木之象其色青赤者
受心火之氣其色赤白者得西方金肺之氣其色白黃
者脾土之色蒼者土氣之下與水隨之其色蒼也三口
蒼曰寒黃赤熱其三口非也若下利熱極頻并窘痛或
久不愈諸藥不能止者須下之以開除濕熱痞閉積滯

而使氣液宣行者宜以逐之兼宣利積熱也

益元散 治身熱吐痢泄瀉腸癖下痢赤白癰閉淋痛

利小便偏主石淋

乃服金石熱藥多待爲砂石從小便淋出者也

腸胃中積

聚寒熱宣積氣通九竅六府生津液去留結消畜水

止渴寬中除煩熱心躁腹脹痛悶補益五藏大養脾

腎之氣

比腎水之藏非爲主之府也

理內傷陰痿安魂定魄補五

勞七傷一切虛損主癰瘰驚悸

悸驚動貌

健忘止煩滿短

氣藏傷咳嗽飲食不下肌肉疼痛并口瘡牙齒疳蝕

明耳目壯筋骨通經脈和血氣消水穀保元真解百

藥酒食邪毒耐勞役饑渴宣熱辟中外諸邪所傷久
服強志輕身注顏延壽及解中暑傷寒疫癘饑飽勞
損憂愁思慮恚怒驚恐傳染并汗後遺熱勞復諸疾
并解兩感傷寒能令遍身結滯宣通氣和而愈及婦
人下乳催生產後損益血衰陰虛熱甚一切熱證兼
吹妳乳癰此神驗之仙藥也惟孕婦不宜服滑胎也

桂府膩白滑石

六兩

甘草

一兩炙

右爲末每服三錢

蜜少許

溫水調下

無蜜亦得

日三服欲冷

飲者新汲水調下解利傷寒發汗煎

蔥白豆豉

湯下四錢

每服水一盞蔥白五寸豆豉五十粒煮取汁一盞調下併三服効爲度此藥是

寒涼解散鬱熱若病甚不解多服此藥無害但有益

而無損俗惡性寒兼易得之賤物而不明素問造化

之理故不取古人神驗之言而多不用焉若以隨證

驗之此熱症之仙藥也不可闕之傷寒當汗而不可汗

者且如誤服此藥則汗出自愈裏熱便得宣通而愈

或半在裏半在表可和解而不可發汗吐下者若服

吐藥多愈亦獲小効是解涼膈散和解爲佳或人不

散怫鬱邪熱甚者小加減蒼朮末三分同蔥豉煎湯調服滑石麻黃桂枝要發

甚良或孕婦不宜服卽甘草二兩同爲末每服四蔥白五豆豉五

枚同煎至六分去滓溫
服併三服取微汗為度
逼毒散非孕婦可服
太白散加麻

黃二兩去節如神白散或逼毒散與加麻黃蒼朮各等分濟

眾云青龍散或青龍散滑石與蒼朮二倍最為發汗之

妙藥也唯正可汗者即以此服大通毒散或解利兩

煎涼膈散調下益元散四錢或下乳用猪肉麴羹或酒

服宜食肉催產以產為度或死胎不下者煎三一

承氣湯一服調下五錢須臾更頻用溫油漿調服前

皆由風熱燥澁緊斂結滯不能舒緩是故產戶不得

自然開也其藥力至則熱結頓開而產矣慎不可溫

補而反生燥熱也俗未知產後日夜損血疼痛怖懼

以致神狂氣亂則陰氣損虛邪熱太甚而為諸證由

不明素問造化故不識證候陰陽反以妄為產後諸
虛百損便為虛冷而無熱也誤以熱藥溫補或見渴
甚者不令飲水本為善心為害多矣豈知治病之道
俱以臨時審其藏府六氣虛實明其標本如法治之
而已矣此藥之用常多而為効至大今以若黃丹令
俗以病異藥同將為妄行反招侮慢桃
仁色是紅玉散加若青黛令輕粉碧玉散加若薄荷葉末
以名之分同雞蘇散主療並同但以回避
研名愚俗之妄侮慢耳

玄青丸

治下痢勢惡頻并窘痛或久不愈諸藥不能

止須可下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣液宣行
者宜以逐之兼宣利積熱酒食積黃瘦中滿水腫腹
脹兼療小兒驚疳積熱乳癖諸證唯泄瀉者勿服

黃連

黃蘗

大黃

甘遂

芫花

醋拌炒

大戟

各半兩

牽牛

四兩取末二兩

已上同細

末

輕粉

二錢

青黛

一兩

右爲末勻水丸小豆大初服十丸每服加十丸空腹
日午臨卧三服以快利爲度後常服十五二十丸數
日後得食久病未痊除者再加取利利後却常服以
意消息病去爲度後隨證止之小兒丸如黍米或麻
子大退驚疳熱積不下者須常服十丸

阿膠梅連丸

治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸證

金井阿膠

淨草灰炒透明白別研不細者再炒研細

烏梅肉

去核

炒

黃蘗

炒坐

黃連

當歸

焙

赤芍藥

乾薑

炮

赤茯苓

半兩各等分

右爲末入阿膠研勻水丸桐子大溫米飲下十九食

前兼夜五六服小兒丸如菉豆忌油膩脂肥諸物也

牛黃神金丸

治大人小兒嘔吐瀉痢無問久新赤白

諸色或渴或不渴小便澁或不澁并小兒驚疳積熱

疰癖堅積腹滿硬痛作發往來亦能寬膈消食

輕粉

粉霜

礪砂

以上別研

雄黃

研

硃砂

信砒

巴豆

去皮各一錢

黃丹

蠟三錢

右先研粉霜次旋入硃砂研細下雄黃硃砂信砒再研下丹粉研勻別研芭豆爛爲油與前藥研勻近火上炙控熱別研蠟軟入藥勻搓作劑旋丸小豆大新水下丸小兒黍米麻子大或止吐瀉痢疾調甘露

散是桂苓甘露飲或益元散亦得

芍藥蘘皮丸

治一切濕熱惡痢頻年窘痛無問膿血

並宜服之