

欽定四庫全書

子部

醫門法律卷十二



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

醫門法律卷十二

律四條

南昌喻昌撰

凡肺癆病多不渴以其不渴漫然不用生津之藥任其
肺日枯燥醫之罪也以其不渴恣胆用燥熱之藥勢
必焮焮不救罪加等也

凡治肺癆病法法不振如魯東朝雖孔聖不討三家僭

竊但扶天常植人紀嘿維宗社耳故行峻法大驅涎沫圖速效返速斃醫之罪也

凡治肺癰病須與肺痿分頭異治肺癰為實肺痿為虛肺癰為陽實肺痿為陰虛陽實始宜散邪次宜下氣陰虛宜補胃津兼潤肺燥若不分辨而誤治醫殺之也

凡治肺癰病以清肺熱救肺氣俾其肺葉不致焦腐其生乃全故清一分肺熱即存一分肺氣而清熱必須

滌其壅塞分殺其勢於大腸令濁穢膿血日漸下移
為妙若但清解其上不引之下出醫之罪也甚有惡
其下利奔迫而急止之罪加等也

肺癰肺痿門金匱諸方

金匱甘草乾薑湯

甘草 四兩 乾薑 二兩
炙 炮

右㕮咀以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

金匱射干麻黃湯

射干

十三枚一
云三兩

麻黃

四兩

生薑

四兩

細辛

三兩

紫苑

三兩

款

冬花

三兩

五味子

半升

大棗

七枚

半夏

大者

八枚洗

一法半升

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫內諸

藥煮取三升分溫三服

金匱皂莢丸

皂莢

八兩刮去
皮用醋炙

右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三九日三

夜一服

金匱厚朴麻黃湯

厚朴

五兩

麻黃

四兩

石膏

如雞子大

杏仁

半升

半夏

半升

乾薑

二兩

細辛

二兩

小麥

一升

五味子

半升

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓內諸藥煮

取三升溫服一升日三服

金匱澤漆湯

半夏

半升

紫參

五兩一作紫苑

澤漆

三斤以東流水五斗煮取一斗五升

生薑

白前

五兩

甘草

五兩

黃芩

五兩

人參

五兩

桂枝

五兩

各三

兩

右九味呔咀內澤漆汁中煮取五升溫服五合至夜

盡

金匱麥門冬湯

麥門冬

七升

半夏

一升

人參

三兩

甘草

二兩

粳米

三合

大棗

十二枚

枚

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日三夜

一服

金匱葶藶大棗瀉肺湯

葶藶

熬令黃色搗丸如彈子大

大棗

十二枚

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮取一升

頓服

金匱桔梗湯

亦治

桔梗

一兩二兩

甘草

二兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服則吐膿血也

金匱越婢加半夏湯

麻黃

六兩

石膏

半斤

生薑

三兩

大棗

十五枚

甘草

二兩

半夏

半斤

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫三服

金匱小青龍加石膏湯

麻黃 芍藥 桂枝 細辛 甘草 乾薑
各三兩

五味子 半夏
各半斤 石膏
二兩

右九味以水一斗先煮麻黃去沫內諸藥煮取三升

強人服一升羸者減之日三服小兒服四合

外臺炙甘草湯 治肺痿咳唾多心中溫溫液液者

甘草

炙 四兩

桂枝

生薑

各三兩

麥門冬

半斤

麻仁

半斤

參

阿膠

各二兩

大棗

三十枚

生地黄

一斤

右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠消盡溫取一升日三服

按炙甘草湯仲景傷寒門治邪少虛多脈結代之聖方也一名復脈湯千金翼用之以治虛勞即名為千金翼炙甘草湯外臺用之以治肺痿即名為外臺炙甘草湯蓋以傷寒方中無治虛勞無治肺痿之條而

二書有之耳究竟本方所治亦何止于二病哉昌每用仲景諸方即為生心之化裁亦若是而已矣外臺所取在於益肺氣之虛潤肺金之燥無出是方至於桂枝辛熱似有不宜而不知桂枝能通榮衛致津液榮衛通津液致則肺氣轉輸濁沫以漸而下尤為要藥所以云治心中溫溫液液者

千金甘草湯

甘草

右一味以水三升煮減半分溫三服

按本方用甘草一味乃從長桑君以後相傳之神方也歷代內府御院莫不珍之蓋和其偏緩其急化其毒卓然奉之為先務然後以他藥匡輔其不逮可得收功敏捷耳今之用是方徒見諸家方中競誇神功及服之不過少殺其勢於三四日之間究不收其實效遂以為未必然耳因並傳其次第以為學者用方時重加細繹耳

千金生薑甘草湯 治肺痿咳涎沫不止咽燥而悶

生薑

五兩

人參

三兩

甘草

四兩

大棗

十五枚

右四味以水七升煮取三升分溫三服

按此方即從前甘草一味方中而廣其法以治肺痿

胃中津液上竭肺燥已極胸咽之間乾槁無耐之證

以生薑之辛潤上行為君合之人參大棗甘草入胃

而大生其津液於以回枯澤槁潤咽快膈真神方也

千金桂枝去芍藥加皂莢湯 治肺痿吐涎沫

桂枝

二兩

生薑

三兩

甘草

二兩

大棗

十枚

皂莢

二枚 去皮 炙黑

右五味以水七升微微火煮取三升分溫三服

按此方即桂枝湯本方去芍藥加皂莢也芍藥收陰
酸斂非此證所宜故去之皂莢入藥胸中如棘鍼四
射不令涎沫壅遏故加之此大治其榮衛之上著也
榮衛通則肺氣不壅矣

外臺桔梗白散 治欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴

時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰

桔梗 貝母

各三分

巴豆

一分去皮
熬研如脂

右三味為散強人飲服半錢匕羸者減之病在膈上者吐膿血膈下者瀉出若下多不止飲冷水一杯則定

按咳而胸滿七證乃肺癰之明徵用此方深入其阻開通其壅遏或上或下因勢利導誠先著也雖有葶藶大棗瀉肺湯一方但在氣分不能深入故用此方於其將成膿未成膿之時蚤為置力庶不犯膿成則

死之遲悞豈不超乎

千金葦莖湯 治欬有微熱煩滿胸中甲錯是為肺

癰

葦莖 二升 薏苡仁 半斤 桃仁 五十枚 瓜瓣 半升

右四味以水一斗先煮葦莖得五升去滓內諸藥煮取二升服一升再服當吐如膿

按此方不用巴豆其力差緩然以桃仁亟行其血不令成膿其意甚善合之葦莖薏苡仁瓜瓣清熱排膿

行濁消痰潤燥開痰收功于必勝亦堂堂正正有制之師也

總按肺為嬌藏肺氣素為形寒飲冷而受傷久久出汗過多而不瘥氣餒不振即為肺痿其風傷皮毛熱傷血脈風熱相搏氣血稽留遂為肺癰肺痿多涎沫乃至便下濁沫肺癰多膿血乃至便下膿積凡胃強能食而下傳者皆不死也夫血熱則肉敗榮衛不行必將為膿是以金匱以通行榮衛為第一義欲治其