

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷四十



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩卷四十

傷寒

總例下

可下

不可下

可吐

不可吐 愈解

死證

可下大法秋宜下凡可下者用湯勝丸散中病便止

不必盡劑也下利三部脈不平按之心下鞭者急下之

明 王肯堂 撰

下利脈遲而滑者內實也利未欲止當下之 少陰
病得之二三日口燥咽乾者急下之 少陰病六七日
腹滿不大便者急下之 陽明少陽合病必下利其脈
不負者為順也負者失也互相剋賊名為負也脈滑而數
者有宿食當下之 問曰人病有宿食何以別之師曰
寸口脈浮而大按之反濇尺中亦微而濇故知有宿食
當下之 下利不欲食者以有宿食故也當下之 下
利差至其年月日時復發者以病不盡故也當下之

下利脈反滑當有所去下乃愈 脈雙弦而遲者必心
下鞭脈大而緊者陽中有陰也可下之 陽明病譫語
有潮熱反不能食者胃中有燥屎五六枚也若能食者
但鞭耳 得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下
痞至四五日雖能食以承氣湯少少與微和之令小安
至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖
不大便但初頭鞭後必溼此未定成鞭也攻之必溼須
小便利屎定鞭乃可攻之 陽明病脈遲雖汗出不惡

寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可
攻裏也手足濇然汗出者此大便已鞭也 二陽併病
太陽證罷但發潮熱手足絳絳汗出大便難而譫語者
下之則愈 病人小便不利大便乍難乍易時有微熱
喘冒不能卧者有燥屎也 大下後六七日不大便煩
不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也
以上俱屬大承氣湯證

陽明病發熱汗多者急下之 傷寒後脈沈沈者內實

也下之解 太陽病未解脈陰陽相停必先振慄汗出而解但尺脈實者下之而解 病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之 傷寒發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐而下利者 傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者 以上俱屬大柴胡湯證

少陰病下利清水色純青心下必痛口乾燥者可下之 病腹中滿痛者此為實也當下之 腹滿不減減不足言當下之 傷寒六七日目中不了了睛不和無表

裏證大便難身微熱者此為實也急下之 汗出譫語者以有燥屎在胃中此為風也須下者過經乃可下之下之若早者語言必亂以表虛裏實故也下之愈 病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脈實者可下之 以上俱屬大柴胡大承氣證

下利譫語者有燥屎也 陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭則譫語 以上俱屬小承氣湯證 陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹

滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之若汗出多微發熱惡寒者外未解也桂枝湯主之其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者與小承氣湯微和胃氣勿令至大泄下陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必溏不可攻之攻之必

脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者大便
必復鞭而少也宜以小承氣湯和之不轉失氣者慎不
可攻也 陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯
主之因與承氣湯一升腹中轉氣者更服一升若不轉
氣者勿更與之明日又不大便脈反微濡者裏虛也為
難治不可更與承氣湯

陽明病不吐不下心煩者屬調胃承氣湯

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外

未解者尚未可攻當先解其外外解已但少腹急結者
乃可攻之宜桃核承氣湯太陽病六七日表證仍在脈
微而沈反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭
滿而小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀
熱在裏故也宜下之 太陽病身黃脈沉結少腹鞭滿
小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦
也 陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久
瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑 以上俱

抵當湯證 傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者
為有血也當下之宜抵當丸

陽明病發熱汗出者此為熱越不能發黃也但頭汗出
身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者以瘀熱在裏
身必發黃宜下之以茵陳蒿湯 傷寒七八日身黃如
橘子色小便不利腹微滿者亦屬茵陳蒿湯證

但結胸無大熱者以水結在胸脇也但頭微汗出者
傷寒六七日結胸熱實脈沈而緊心下痛按之石鞭者

俱屬大陷胸湯 結胸者項亦強如柔痙狀下之則

和
大陷
胸丸

太陽病中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗
出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔則短氣
汗出不惡寒者此表解裏未和也屬十棗湯

吳經言太陽病發熱汗出不解其人蒸蒸發熱者屬
胃也調胃承氣湯下之凡潮熱腹痛者大柴胡加厚
朴下之凡陽明病汗多胃中必燥大便必鞭鞭則譫

語小承氣湯若譫語脈滑而疾發潮熱者大柴胡湯
凡譫語有潮熱不食者胃中必有燥屎五六枚小承
氣湯若能食大便鞭者大承氣湯凡汗出譫語必有
燥屎調胃承氣湯凡潮熱手足絳絳然汗出大便難
而譫語者大承氣湯凡五六日不大便繞臍痛煩躁
發作有時者此有燥屎也調胃承氣湯凡曾經下後
又六七日不大便煩熱不解腹滿痛者此有燥屎也
大承氣湯病人小便不利大便乍難乍易時有微熱

喘滿不能卧者有燥屎也大承氣湯凡吐後腹脹滿者調胃承氣湯凡汗吐下後微煩小便數而大便鞭者小承氣湯凡腹滿不減者小承氣湯凡下利脈滑而數者有宿食也小承氣湯凡病腹中滿痛者有宿食也小承氣湯凡脈沈有力內實潮熱不解者大柴胡湯大抵下藥必切脈沈實或沈滑沈疾有力者可下也再以手按臍腹鞭者或叫痛不可按者則下之無疑也凡下後不解者再按臍腹有無鞭處如有手

不可按下未盡也復再下之若下後腹中虛軟脈無力者此為虛也以參胡三白湯和之若發熱或潮熱或往來寒熱不解者宜小柴胡湯增損和之若煩熱不得眠者宜竹葉石膏湯或十味溫膽湯

活傷寒裏證須看熱氣淺深故仲景有直下之者如大小承氣十棗大柴胡湯是也有微和其胃氣者如調胃承氣湯脾約丸少與小承氣微和之之類是也虛者十補勿一瀉強實者瀉之虛實等者雖瀉勿

大泄之此金匱語也故王叔和序傷寒有承氣之戒
垣藥用大承氣湯最緊小承氣次之調胃承氣又次
之大柴胡湯又次之

海大承氣湯治大實大滿滿則胸腹脹滿狀若合瓦

大實則不大便也痞滿燥實四證俱備則用之雜病

則進退用之

大黃

治大實

芒硝

治大燥此二味
治有形血藥也

厚

朴

治大滿

枳實

治痞此二味治
無形氣藥也

小承氣湯治痞實而微滿狀若飢人食飽飯腹中無

轉失氣即大承氣只去芒硝心下痞大便 通熱甚
須可下宜此方 調胃承氣湯治實而不滿者腹如
仰瓦腹中有轉失氣有燥糞不大便而譫語堅實之
證宜用之

右已上三法不可差差則無者生之有者遺之假令
調胃承氣證用大承氣下之則愈後元氣不復以其
氣藥犯之也若大承氣證用調胃承氣下之則愈後
神癡不清以其無氣藥也小承氣證若用芒硝下之